Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg

Band 26 1985



Dieser Band wurde gedruckt mit Unterstützung durch den BEZIRK UNTERFRANKEN UND DIE GEMEINDE SCHWEBHEIM



Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg e.V.

Herausgeber: Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg e. V. Redaktion: Dr. Gabriele Ritschel-Kandel

Abh.Naturw.Verein Würzburg Band 26 S.1-106 1985

Waldgesellschaften im Schweinfurter Becken

Winfried Türk

Würzburg 1987

Überarbeitete Fassung einer Diplomarbeit am Lehrstuhl Biogeographie der Universität Bayreuth (Prof. Dr. K. Müller-Hohenstein)

Anschrift des Verfassers: Dipl.-Biol. W. Türk, Imkerweg 22, 8501 Heroldsberg

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Seite
Vorwort	1
I. DAS ARBEITSGEBIET	2
1. Allgemeines	2
2. Lage und Einbindung in die Umgebung	2
3. Geologischer Aufbau und Enstehungssgeschichte der Landschaft	5
4. Überblick über die Böden	9
5. Klimatische Verhältnisse	11
6. Bemerkungen zur Pflanzengeographie	14
7. Überblick über die Besiedlungsgeschichte	15
8. Die Bewirtschaftungsweise der Wälder und deren	•
Einfluß auf die Artenzusammensetzung	15
9. Zusammenfassung des einleitenden Teils	17
,	•
II. METHODIK	17
1. Vegetationskundliche Untersuchungen	17
2. Bodenkundliche Untersuchungen	19
III. <u>DIE PFLANZENGESELLSCHAPTEN</u>	21
1. Übersicht der behandelten Pflanzengesellschaften	21
2. Waldgesellschaften	21
2.1. Querco-Fagetea, sommergrüne Laubwälder	21
2.1.1. Fagetalia sylvaticae, mesophile Laubmischwälder	22
2.1.1.1. Carpinion, Eichen-Hainbuchenwälder	22
2.1.1.1.1. Stellario-Carpinetum,	
Eschen-Stieleichen-Hainbuchenwald	23
2.1.1.1.2. Galio-Carpinetum,	
Winterlinden-Stieleichen-Hainbuchenwald	28
2.1.1.1.2.1. Galio-Carpinetum,	20
Subassoziationsgruppe von Asarum europaeum	29
2.1.1.1.2.2.	37
	41
Subassoziationsgruppe von Luzula luzuloides	48
2.1.1.2. Almo-Ulmion, Auenwälder	
2.1.1.2.1. Querco-Ulmetum, Hartholzauenwald	49
2.1.1.2.2. Pruno-Fraxinetum, Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald.	53
2.1.2. Quercetalia robori-petraeae, Eichen-Birkenwälder	58
2.1.2.1. Quercion robori-petraeae	58
2.1.2.1.1. Luzulo-Quercetum petraeae	58
2.1.3. Kiefernforstgesellschaften auf den Standorten des	,-
Carpinion und des Quercion roboris	62
2.1.4. Quercetalia pubescenti-petraeae,	-
Wärmeliebende Eichenmischwälder	63
2.1.4.1. Quercion pubescenti-petraeae	63
2.1.4.1.1. Clematido-Quercetum, Elsbeeren-Traubeneichenwald	63
2.2. <u>Alnetea glutinosae</u> , Bruchwälder und -gebüsche	64
2.2.1. Alnetalia glutinosae	64
2.2.1.1. Salicion cinereae	64
2.2.1.1.1 Salicetum cinereae, Grauweidengebüsch	64
2.2.1.2. Alnion glutinosae	65
2.2.1.2.1. Carici elongatae-Alnetum glutinosae,	
Walzenseggen-Erlenbruchwald	66
2.3. <u>Salicetea purpureae</u> , Weidengebüsche und -wälder	70
2.3.1. Salicetalia purpureae	70
2.3.1.1. Salicion albae, Weidenwälder	70
2.3.1.1.1. Salicetum albae. Silberweidenwald	70

3. Gehölzfreie Gesellschaften	71 71
Origanetalia, Atropetalia	72
IV. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG DER WALDGESELLSCHAFTEN	74
1. Stetigkeitstabelle	74 74 78 78 87
VI. GEDANKEN ZUM NATURSCHUTZ	87
VII. ZUSAMMENFASSUNG	89
VIII. <u>LITERATUR</u>	93
IX. <u>ANHANG</u>	104
i. Diste der in den waldadinanmen erscheinenden in den der	104 106
	nach Seit
Tabelle 6: Silberweidenreiche Gesellschaften	.71

Die Tabellen 1-5, sowie die Stetigkeitstabelle befinden sich im

Anhang!

Vorwort

Seit langem besitzt das Schweinfurter Becken, oft auch als "Schweinfurter Trockengebiet" bezeichnet, bei Botanikern einen guten Ruf. Vor allem sein Reichtum an kontinental verbreiteten Pflanzenarten und deren -gesellschaften machte den klimatisch recht extremen Naturraum weit über die Grenzen Frankens hinaus bekannt.

So verwundert es auch nicht, daß sich neben Floristen (Flora von EMMERT und SEGNITZ 1852) auch Pflanzensoziologen mit der Vegetation des Raumes auseinandergesetzt haben. Stellvertretend sind hier zu nennen die Arbeiten von PRITZEL (1917) und KAISER (1958) über die Grettstätter Wiesen; GAUCKLER (1957) arbeitete über die Steppenrasen, während KORNECK (1962a, b. 1963) die Extensivgrünlandgesellschaften und Hochstaudenfluren, ULLMANN und VÄTH (1978) Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften untersuchten.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Wald-Pflanzengesellschaften des Schweinfurter Beckens. Die hier erhaltenen Restwälder weisen eine naturnahe Artenkombination auf, Forste sind selten. Nach der Beschreibung der naturräumlichen Ausstattung wird eine Gliederung der Waldgesellschaften auf floristisch-soziologischer Grundlage gegeben. Einblicke in den Zusammenhang Pflanzengesellschaft - Standort sollen Bodenprofilbeschreibungen und die Ergebnisse physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungen ermöglichen. Geologisch - pedologisch - vegetationskundliche Transekte mögen eine Vorstellung von der Verteilung der Vegetationseinheiten im Gelände vermitteln.

Es ist mir ein ehrliches Bedürfnis an dieser Stelle all denjenigen zu danken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Herrn Prof. Dr. K. Müller-Hohenstein für die Überlassung des Themas als Diplomarbeit sowie Herrn Dr. A. Reif für die Betreuung, vor allem für seine Einführung in die EDV (und für den vielen Kaffee!), gilt mein ganz herzlicher Dank. Die freundschaftliche Hilfsbereitschaft, die mir als "Externem" am Lehrstuhl für Biogeographie an der Universität Bayreuth begegnete, trug maßgeblich zum Werden dieser Arbeit bei.

In die Vegetationskunde als geobotanischer Disziplin führte mich mein verehrter Lehrer Herr Prof. Dr. H. Zeidler (Würzburg) ein. Für die zahllosen Exkursionen, Gespräche und "Nachsitzungen", die ich bisher mit ihm erleben durfte, möchte ich ihm ganz besonders danken. Viele Anregungen erfuhr ich in Gesprächen und gemeinsamen Geländebegehungen mit den Herren Dr. U. Bohn (Bonn), Forstoberrat Dr. J. Draheim (Gerolzhofen), Dr. W. Hofmann (Schweinfurt), Prof. Dr. L. Meierott (Gerbrunn), Bürgermeister F. Roßteuscher (Schwebheim), Priv. Doz. Dr. A. Skowronek (Würzburg) sowie Forstrat U. Schweizer (Schweinfurt). Eine Einführung in die Faunistik des Gebietes verdanke ich Herrn Priv. Doz. Dr. G. Scholl (Schweinfurt) sowie H. Nickel (Gernach). Eine große Hilfe beim Photographieren der Bodenprofile war mir mein Bruder Thomas. Ihnen allen meinen aufrichtigen Dank!

Der herzlichste Dank aber gilt meiner Mutter, die mir das schöne, aber lange Studium der Biologie ermöglichte.

I. DAS ARBEITSGEBIET

1. Allgemeines

Seit den pollenanalytische Untersuchungen von ZEIDLER (1939) ist bekannt, daß die Rotbuche im Schweinfurter Becken in der Postglazialzeit nur gering vertreten war. Trocken-warmes Regionalklima, hohe Spätfrostgefährdung und schwere Tonböden mit ihrem unausgeglichenen Luft- und Wasserhaushalt erklären ihr fast vollständiges Fehlen.

Überall, wo Fagus sylvatica aus natürlichen oder anthropogenen Gründen zurücktritt, können sich in den warmen Tieflagen Eiche, Hainbuche, Linde und weitere Baumarten auf allen nicht übermäßig feuchten, trockenen oder basenarmen Standorten entfalten. Eichen-Hainbuchenwälder bilden deshalb im Schweinfurter Becken die Leitgesellschaft (SCHRETZENMAYR 1950, 1961), wo sie aus natürlichen Gründen auch die sogenannten "mittleren", d.h. frischen Böden besiedeln.

Klimatisch bedingten Eichen-Hainbuchenwäldern begegnet man in der Bundesrepublik sonst nur sehr kleinflächig; sie treten verbreitet erst wieder im Mitteldeutschen Trockengebiet (Magdeburger Börde und Thüringer Becken) auf. Zu diesem Raum bestehen deshalb stärkere floristische und soziologische Beziehungen.

Günstig für die Bewertung der eigenen Ergebnisse war, daß die umliegenden Naturräume teilweise waldvegetationskundlich untersucht worden sind. Den Bereich der "Mainfränkischen Platte" westlich des Arbeitsgebietes behandelte HOFMANN (1964/65), während WELSS (1985) den im Osten in einiger Entfernung ansteigenden "Nördlichen Steigerwald" untersuchte. Dem Schweinfurter Becken vergleichbare klimatische und geologische Bedingungen weisen auch die Untersuchungsgebiete von MEUSEL (1935: Grabfeld) sowie ZEIDLER und STRAUB (1959: Kitzinger Becken) auf.


Einige Vergleichsdaten finden sich bei ULLMANN (1977: Südliches Maindreieck), ULLMANN und BRUMM (1979: Südrhön), ULLMANN und RÖßNER (1983: Grabfeld). Die beiden im Arbeitsgebiet gelegenen Auenwaldreste "Elmuß" und "Garstädter Holz" waren Gegenstand einer Untersuchung von STÜRZENBERGER (1981).

2. Lage und Einbindung in die Umgebung

Das Arbeitsgebiet umfaßt die Südhälfte des Blattes 5927 "Schweinfurt" und die Nordhälfte des Blattes 6027 "Grettstadt" der Topographischen Karte 1:25000. Innerhalb der übergeordneten Einheit "Mainfränkische Platten" gelegen, gehört es zur naturräumlichen Haupteinheit "Schweinfurter Becken" (Abb. 1, 2).

Je nach Autor wird die Abgrenzung des Schweinfurter Beckens unterschiedlich vorgenommen. Hier kommt der Vorschlag im "Klimaatlas von Bayern" (KNOCH 1952) zur Darstellung.

Nach Meinung des Verfassers stellt jedoch die Mainlinie die ungefähre Begrenzung des Naturraums im Norden und Nordwesten dar. Nördlich des Flusses steigt das Gelände stetig an; auf den Hängen liegen mächtige Lößpolster. Kaltluft kann hier ab-



- Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland
 - 071 Obermainisches Hügelland
- Fränkische Alb
 - 080 Nördliche Frankenalb
- Fränkisches Keuper-Lias-Land 11
 - 112 Vorland der Nördlichen Frankenalb
 - 113 Mittelfränkisches Becken
 - 114 Frankenhöhe
 - 115 Steigerwald
 - 116 Haßberge
 - 117 Itz-Baunach-Hügelland
- Neckar- und Tauber-Gäuplatten
 - 127 Hohenloher-Haller-Ebene
 - 128 Bauland
 - 129 Tauberland
- 13 Mainfränkische Platten
 - 130 Ochsenfurter- und Gollachgau
 - 131 Windshelmer Bucht
 - 132 Marktheidenfelder Platte
 - 133 Mittleres Maintal
 - 134 Gäuplatten im Maindreieck
 - 135 Wern-Lauer-Platte

- 136 Schweinfurter Becken
- 137 Steigerwaldvorland 138 Grabfeld

60 70 80 90

40 50

30

- 139 Hesselbacher Waldland
- Odenwald, Spessart und Südrhön

100 km

- 140 Südrhön
- 141 Sandstein-Spessart
- 142 Vorderer Spessart
- 143 Büdinger Wald
- 144 Sandstein-Odenwald
- 23 Rhein-Main-Tiefland
 - 233 Ronneburger Hügelland
- 35 Osthessisches Bergland
 - 350 Unterer Vogelsberg
 - 351 Oberwald
 - 354 Rhön
 - 357 Fuldatal
- 39 Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge
 - 390 Südl. Thüringerwald-Vorland
 - 391 Nordwestl. Thüringer Wald
 - 392 Südöstl. Thüringer Wald
 - 393 Nordwestlicher Frankenwald

Abb. 1. Naturräumliche Gliederung (nach KNOCH 1952)

10 20




Abb.2. Topographie

--: Grenzen des AG

Im Text verwendete Waldnamen:

1.	Hellelohe	10.	Gehäu
2.	Spitalholz	11.	Riedholz
3.	Kapitelwald	12.	Eichig
4.	Kammerholz	13.	Schopfig
5.	Esbachholz	14.	Holzspitze
6.	Elmuß	15.	Drittelholz
7.	Garstädter Holz	16.	Kämmlingsberg
8.	"Auenrestgehölze"	17.	Ansbach
0	Flannhala	10	He have 1 d

fließen. Dem Becken fehlen Lößsedimente größerer Mächtigkeit; Kaltluftmassen bleiben liegen.

Untersucht wurden Waldvegetation und deren Standorte nur im südlich des Mains gelegenen Teil des Schweinfurter Beckens (= Arbeitsgebiet = AG), innerhalb des nördlichen Teils finden sich keine Wälder.

Die flache Mulde des Schweinfurter Beckens wird ringsum von höher gelegenen und damit niederschlagsreicheren Landschaften umgeben. Im Westen erfolgt der Übergang zur Lößäckerebene der "Gäuplatten im Maindreieck" und "Wern-Lauer-Platte" mal über einen Steilhang, mal sanft geböscht. Nördlich des Mainprallhangs erheben sich die buchenwaldbestandenen Muschelkalkhügel des "Hesselbacher Waldlandes", oft auch "Schweinfurter Rhön" genannt. Während im Osten mit dem Ausstrich des Gipskeupers der Anstieg zum "Steigerwaldvorland" begrenzend wirkt, bildet eine tektonische Schwelle (ebenfalls zum Steigerwaldvorland gehörend) im Süden den Beckenrand. Nur gegen Südosten hin scheint keine morphologisch-geologische Grenzziehung möglich, der Übergang zum "Herlheimer Becken" (Teilbereich des Steigerwaldvorlandes (SCHWENZER 1968)) erfolgt unmerklich, eine Abgrenzung erscheint willkürlich.

Von Westen nach Osten langsam von 200 m auf 230 m ansteigend, bietet sich das AG dem Auge als flachwellige Ackerlandschaft dar, die von einigen Wäldchen unterbrochen wird, welche oft die ungünstigen sandig-trockenen Böden der Kuppenlagen einnehmen. Meist sind die umgebenden Rahmenhöhen zu sehen; die Vorstellung, sich in einem Becken zu befinden, fällt nicht schwer.

Ein abwechslungsreicher geologischer Untergrund und warmes Regionalklima erklären die Vielzahl von Feldfrüchten, zu denen noch Sonderkulturen, wie Gemüse und der berühmte Heilpflanzenanbau von Schwebheim, kommen. Wein- und Obstbau fehlt dem AG wegen der häufigen Spätfröste; Wiesenflächen, einst in den moorigen Niederungen weit verbreitet, finden sich nach ihrer Entwässerung nur noch selten. Die zahlreichen Haufendörfer sind durch ein dichtes Straßennetz verbunden, dazu kommen noch zwei sich kreuzende Schnellstraßen.

3. Geologischer Aufbau und Entstehungsgeschichte der Landschaft

Die geologischen Verhältnisse einer Landschaft prägen ganz wesentlich deren Vegetationsbild. Sie haben einen wichtigen Einfluß auf die Entstehung der Geländeformen; die vorhandenen Gesteine spielen als Ausgangssubstrate für die Bodenbildung eine entscheidende Rolle.

Die anschließende Schilderung folgt dem geologischen Führer von RUTTE und WILCZEWSKI (1983) sowie den Erläuterungen zu den geologischen Karten 1:25000 "Schweinfurt" und "Grettstadt" (SCHWARZMEIER 1981,1982).

Über Schichtenfolge mit Mächtigkeitsangaben und Substratausbildung sowie über das Ausstreichen der Schichten im Gelände informieren die Abbildungen 3 und 4.

Im folgenden soll auf einige Zusammenhänge zwischen Geologie,

	Schichtenfolge					Substratausbildung
Pleistorän Holorän	Talfüllung Maintalholozän	5 m	f gh	}	f gh	Sande , schluffig , Lehme Sande , tonige Schluffe
. 5	Flugsand	2 m	,S,a	(: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	,S,a	Sande, schluffig
tos	Lößlehm	2 m	Lö	,,,,,	Lö	Schluff, tonig
Mei	Nieder-und MiHelterras	sen 6 m	9 P	0000	9 P	Sande, kiesig - schluffig Tonlinsen
	(Bleiglanzbank)	(20 cm)	Н		A	Steinmergelbank
Mittlerer Keuper	Untere Myophorienschichten	30 m	Kmu		kmu	Tonsteine, grau , grünrot- braun , riolett
	(Grundgipsschichten)	(6 m)	1		,	Gipssteine
	(Grenz dolomit)	(3 m)	\prod			Dolomit steine, gelbbraun
	(Oberer Sandstein)	(3 m)	Ī .			Sandstein, schluffreich,
Unterer Keuper	Oberer – Letten keuper	20 m	ku2		ku2	gelbgrün Tonsteine, grauschwarz, grau, z.T. dolomi- tisch
	(Werks and stein)	(5 m)			.)	Sandstein , schluffhaltig , grünlich grau
	Unterer - Lettenkeuper	25 m	kul		ku1	Tonsteine, grau, z.T. dolomitisch
Muschelkalk	Oberer Muschelkalk	-	mo) m	Kalksteine, grau, grau- blau, bankig Tonmergel steine, oliv-grau, blättrig

Abb.3. Schichtenfolge und Substratausbildung (Gestaltung in Anlehnung an HERRMANN 1984)





Abb.4. Geologische Karte (nach SCHWARZMEIER 1981,1982 vereinfacht)



Morphologie und der Entstehung des Landschaftsformen eingegangen werden. Die Geologie des AG wird von Ablagerungen dreier Zeitabschnitte geprägt: Keuper, Pleistozän, Holozän.

Nur gering vertreten ist der <u>Obere</u> <u>Muschelkalk</u> (= Hauptmuschelkalk). Er besitzt erst in den tektonischen Rahmenhöhen des AG eine größere Verbreitung (Schweinfurter Rhön). Seine Ton- Kalkstein- Wechselfolgen wurden in einem Flachmeer sedimentiert, das zur Zeit des <u>Unteren Keupers</u> (= Lettenkeuper) zunehmend verflachte. Die <u>Unteren und Oberen Tonstein-Gelbkalk-</u> Folgen (=Unterer und Oberer Lettenkeuper) sind in dieser Zeit entstanden. Meist unter pleistozänen Deckschichten verborgen, finden sich die Gesteine des Lettenkeupers großflächig im AG. Als Deltaschüttungen eines aus nördlichen Richtungen kommenden Flußsystems werden der Werksandstein und verschiedene andere Sandsteineinschaltungen im Lettenkeuper interpretiert, von denen der Obere Sandstein morphologisch als Härtling und Flächenbildner aus den weicheren Tonsteinen herauspräpariert Seine sandig-flachgründigen Böden überließ man meist dem Wald, während der übrige Lettenkeuper mit seinen fruchtbaren Lehmböden fast gänzlich unter Ackernutzung liegt. Das letztere gilt auch für das abschließende Glied des Lettenkeupers, den Grenzdolomit, der seine Entstehung einem kurzzeitigen Meeresvorstoß verdankt. Seinem Ausstrich begegnet man in Form weitgespannter flacher Rücken, die durch ehemals vermoorte Talmulden getrennt werden.

Zu Beginn des <u>Mittleren</u> <u>Keupers</u> (= Gipskeuper) dampfte ein Teil des Meerwassers ein, es lagerte sich Gips ab, der als <u>Grundgips</u>, oft Karsterscheinungen aufweisend, die Basis der <u>Unteren Myophorienschichten</u> bildet, die wiederum in einem vollmarinen Medium sedimentiert wurden. Im Gelände bilden die Tonsteine flache Kuppen; im SE steigen sie, den Rand des AG bildend, langsam zum Steigerwald hin an. Weisen sie einen lehmigen Oberboden auf (solifluidale Einarbeitung einer Lößkomponente während des Pleistozäns!), werden die Myophorienschichten beackert, ansonsten stockt auf den schweren Tonböden Wald. Den Abschluß dieses Schichtpaketes bildet eine Steinmergelbank, die <u>Bleiglanzbank</u>, die als Terrassenbildner am Ostrand des AG erscheint.

Die im Hangenden folgenden Schichten des Gips- und Sandsteinkeupers erreichen das AG nicht mehr.

Die vermutlich bis in den Dogger weitergehende Sedimentation wurde ab dem Malm unterbrochen. Die Herauswölbung der Mitteldeutschen Hauptschwelle machte auch Mainfranken zum Festland. In den feucht-heißen Perioden der Kreide und des unteren bis mittleren Tertiärs wurden über die Prozesse der Flächenspülung alle jüngeren Ablagerungen bis zum Gipskeuper entfernt. Man vermutet, daß flächenhafte Abtragung noch bis ins ausgehende Tertiär (Pliozän) andauerte.

Ins jüngere Tertiär fällt auch die Reaktivierung alter tektonischer Strukturen durch Kräfte, die von den aufsteigenden Alpen ausgingen. Großräumige Verbiegungen formten die "Schweinfurter Mulde", die von teils biege-, teils bruchtektonisch gehobenen Hochzonen umgeben wird. In dabei entstandene Spalten drangen miozäne Alkalibasalte ein, die als südlichste Vertreter der "Heldburger Gangschar" im AG zu finden sind.

In die Übergangszeit zwischen Tertiär und Pleistozän sind die ältesten Ablagerungen eines <u>Mainvorläufers</u> zu stellen. Rund hundert Meter über dem heutigen Mainniveau liegen fichtelgebirgsmaterialfreie Schotter eines Flusses, der möglicherweise im Thüringer Wald entsprang ("Ostheimer Nebenfluß"). Er mündete, ab Schweinfurt dem heutigen Ostschenkel des Maindreiecks folgend, bei Marktbreit in den "Wernfelder Fluß". Beide flossen dann über das heutige Altmühlsystem zur Urdonau. Erst im Ältestpleistozän bildete sich durch Flußanzapfungsvorgänge der heutige Mainlauf heraus.

Durch die Existenz der "Schweinfurter Mulde" bedingt, kamen die morphologisch weichen Tonsteine des Mittleren Keupers in eine für ihre Ausräumung durch den Main günstige Höhenlage.

Der mehrmalige Wechsel von kälteren und wärmeren Perioden während des <u>Pleistozäns</u> führte zur Herausbildung eines mehrgliedrigen <u>Flußterrassensystems</u>, dessen sandig-kiesige Böden teilweise unter Ackernutzung liegen, öfters aber Waldtragen. Während der Kaltzeiten durch westliche Winde ausgeblasenes, sandig-schluffiges Material wurde, je nach Entfernung vom Herkunftsgebiet, als <u>Flugsand-, Sandlöß-</u> oder - außerhalb des AG - <u>Lößdecke</u> wieder sedimentiert. Sommerliche Solifluktion im Bereich des Auftaubodens trat schon bei geringer Hangneigung auf, großflächig dort, wo wasserspeichernde Sandsteine von wasserstauenden Tonsteinen unterlagert wurden. Die Entstehung ausgedehnter <u>Fließerdedecken</u> war die Folge.

Im <u>Holozän</u> grub sich der Main wieder in seinen eiszeitlichen Talboden ein. Ausgelöst durch die mittelalterlichen Rodungen, wurden gewaltige Mengen Lößlehmmaterial ins Tal gespült, die fruchtbare <u>Auenlehmdecke</u> entstand. Sie liegt auf vorher abgelagerten Schottern. Aufgrund der geringen Reliefenergie im Becken vermoorten die sandigen <u>Talfüllungssedimente</u> der kleinen Mainzuflüsse, wobei teilweise ein Seenstadium mit <u>Seekreidebildung</u> voranging.

Durch <u>Grundwasserabsenkungen</u> sowie <u>Begradigung</u> und <u>Ausbau des</u> <u>Mains</u> hat der Mensch inzwischen Vermoorung und Überflutungen gestoppt.

4. Überblick über die Böden

Böden stellen wichtige Teilbereiche der Ökosysteme dar. Die "Schrift des Bodens" (TÜXEN) lesen und verstehen zu können, bedeutet Einblicke in die Zusammenhänge zwischen geologischem Untergrund, Relief, Klima, Vegetation und menschlicher Einflußnahme.

Hier wird nur ein Überblick über die pedologischen Verhältnisse im AG gegeben, der Zusammenhang Böden - Waldgesellschaften soll erst bei der Beschreibung der letzteren näher untersucht werden.

Kurze Hinweise auf die Böden im AG finden sich in den Erläuterungen zu den geologischen Karten, die hier gegebene Darstellung beruht auf eigenen Geländebefunden.

Außerhalb der seltenen Erosionssituationen spielte sich die

nacheiszeitliche Pedogenese in <u>pleistozänen Deckschichten</u> ab. Besitzen sie größere Mächtigkeit, entwickelten sich Böden mittlerer Basensättigung mit Moder als Humusform. Sommerliche Trockenperioden führen zu einer "Aufbasung" auch der oberen Bodenhorizonte durch kapillaren Aufstieg basenreichen Untergrundwassers. Die sonst auf diesen Substraten verbreiteten armen, oft podsolierten Böden fehlen dem AG fast vollständig, eine Folge des Trockenklimas.

Beteiligt sich die tonig-kalkige Fazies der Keupergesteine stärker an der Bodenbildung, besitzen die hieraus entstandenen Böden eine gute Basenversorgung und einen Mullhorizont. Auch die meisten im Grundwasserbereich befindlichen Standorte sind als eutroph anzusprechen.

Verbreitete Zweischichtprofile und sommerliche Trockenzeiten äußern sich in einer ausgeprägten <u>Wechselfeuchtigkeit</u>, die mitverantwortlich für die starke Vertretung des (sub-)kontinentalen Florenelements auf solchen Böden sein dürfte.

Wo die tonige Fazies des Lettenkeupers ohne Deckschicht auftritt, findet man Braunerde-Pelosole; häufige Flugsandschleier äußern sich in sandigeren Oberböden, Pelosol-Braunerden sind die Folge. Anstehender Oberer Sandstein trägt schluffig-sandige Ranker-Braunerden und Braunerden, die in ihrer Basenversorgung zwischen mittel und gut stehen. Der durch eiszeitlichen Frostwechsel aufbereitete Obere Sandstein ist in Form seines Frostschuttes Bestandteil ausgedehnter Fließerdedecken unterhalb seines Ausstrichs. Hier sind alle Übergänge zwischen Braunerden und Pseudogleyen entwickelt. Grenzdolomit und andere Gelbkalke treten fast immer mit Deckschicht auf, in denen sich - teilweise über begrabenem Rendzinaprofil - sandige bis lehmige Braunerden hoher Basensättigung entwickelt haben.

Die Tonsteine der **Myophorienschichten** weisen meist einen schluffigen Oberboden auf. Hier wurde solifluidal eine Löß-komponente eingearbeitet. Trotzdem bilden sich im Sommer tiefe Spalten, in die hinein nach Gewitterschauer oberflächlich ablaufendes Wasser humoses Material spült. Peloturbation führt zur Ausbildung Vertisolartiger Pelosole. Dolinen, im Ausstrichbereich des Grundgipses weit verbreitet, weisen eine Tonfüllung auf, in der sich Pelosol-Gleye und Anmoorgleye entwickelt haben.

Im Steilhangbereich unterhalb der Bleiglanzbank finden sich Pelosol-Ranker.

Die ausgedehnten Terrassensedimente tragen sandig-kiesige, oft tiefgründig entwickelte Braunerden mittlerer Basensättigung, eingeschaltete Tonlinsen geben Anlaß zu Pseudogleyen. Im Bereich mächtigerer Flugsande und flacher Dünen finden sich leicht podsolige Braunerden. Ein gewisser Schluffgehalt und geringe Basenauswaschung (Trockenklima!) erklären ihre mittlere Basenversorgung. Lediglich im Bereich höherer Dünen findet man oligotrophe Podsol-Braunerden, die durch Kiefernreinanbau mitbedingt sein dürften.

Mehrmalige Grundwasserabsenkung führte bei fast allen hydromorphen Böden zu einem deutlich weniger feuchten Wasserhaushalt. Die in der Bodengrube erkennbaren Gleymerkmale stellen deshalb meist Relikte dar. Die schneller auf die Veränderung reagierende Vegetation "paßt" dann oft nicht mehr zum Profilbild.

In den **Auenschluffen** im Maintal finden sich verbreitet Böden, die der <u>Vega</u> zuzuordnen sind. Sie werden heute kaum noch überflutet.

Die (schluffig)sandigen **Talfüllungen** der kleinen Mainzuflüsse waren früher regelmäßig vermoort. Nach der Entwässerung zutretender Luftsauerstoff förderte den Humusabbau, es kam zur "Vererdung". Diese heute ackerfähigen Standorte sind bodentypologisch als "Schwarzerdeähnliche Böden in Auenlage", als <u>Tschernitzen</u> zu bezeichnen. Kleinflächig findet man auch noch (vererdete) <u>Niedermoore</u> und erst durch menschliche Degradation (Streuentnahme, Waldweide) entstandene Podsol-Gleye.

5. Klimatische Verhältnisse

Das Großklima eines Raumes entscheidet maßgeblich über die Konkurrenzkraft der einzelnen Baumarten und damit über die natürliche Baumartenkombination.

Im nordbayerischen Raum begegnen sich ozeanische und kontinentale Klimaeinflüsse wobei letztere von NW nach SE zunehmen (MÜLLER-HOHENSTEIN 1971).

Stärkere Jahrestemperaturschwankungen, höherer Anteil der Sommerniederschläge bei insgesamt niedrigeren Jahressummen sind kennzeichnende Züge klimatisch kontinental getönter Räume.

Die Lage des Schweinfurter Beckens im Regenschatten von Spessart und Rhön sowie der immerhin 100 Meter höheren Fränkischen Platte führt zu geringen Jahresniederschlägen und hohen Sommertemperaturen (Abb.5). Innerhalb der Bundesrepublik weist nur das Oberrheingebiet noch etwas extremere Werte auf. Ähnliche Verhältnisse finden sich im Mitteldeutschen Trockengebiet.

Für die großklimatische Charakterisierung stehen Angaben im "Klimaatlas von Bayern" (KNOCH 1952) zur Verfügung (Periode: 1891-1930):

```
Mittlere wirkliche Lufttemperatur Januar:
                                                  -1°C
                                   Juli :
                                            17 -
          Jahresschwankung der Lufttemp.:
                                            18 - 18.5°C
          Niederschlagssumme Jahr:
                                            500-550 mm
                             Mai-Juli:
                                            160-180 mm
          Dauer eines Tagesmittels > 10°C:
                                            160-170 Tage
Mittlerer Trockenheitsindex Jahr:
                                            20-25(-30)
                            Mai-Juli:
                                            20-25(-30)
          Beginn der Apfelblüte
                    (Vollfrühlingsbeginn): 30.4-5.5
                    Winterroggen-Ernte
                     (Hochsommerende):
                                            19.7-24.7(-29.7)
```

Die oben gegebenen Zahlen unterscheiden sich von Autor zu Autor etwas. So liegen für die Periode 1931-1960 nach GIESS-NER (1982) die Jahresniederschläge im AG zwischen 550-600 mm; in derselben Periode betrug die mittlere Jahresschwankung



Abb. 5. Mittlere Niederschlagssummen (nach KNOCH 1952)



500-550 550-600 600-650 650-700 700-750



750-800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200

der Lufttemperatur nach SCHIRMER (1969) 19.4°C.

Wichtiger als die absolute Höhe der Niederschläge ist ihre jahreszeitliche Verteilung und die Dauer der Abstände zwischen zwei Regenereignissen. Für das AG gilt ein für (sub)kontinentale Gebiete charakteristischer Sommerregentypus mit Maximalwerten im Hochsommer (vgl. HOFMANN 1964/65), welche durch ergiebige Gewitterschauer mitbedingt werden. Länger andauernde niederschlagsfreie Perioden erzeugen bei den verbreiteten lehmigen und tonigen Böden im AG einen hohen Benetzungswiderstand des Oberbodens; auftreffendes Wasser fließt teilweise oberflächlich ab, ohne der Vegetation zu Gute zu kommen.

Nach SCHIRMER (1955) erklären sich die geringen Gesamtniederschläge durch die Existenz von "Schauerstraßen", Zonen überzufälliger Häufung von Regengüssen, die das AG nicht überqueren. ZEIDLER (1957) parallelisierte diese Erscheinung mit der Erhaltung kontinentaler Steppenrasen im Schweinfurter Becken (Abb.6).




Abb. 6. "Schauerstraßen" und niederschlagsabhängige Vegetation (aus ZEIDLER 1957)

Ein typischer Zug des Beckenklimas sind die häufigen Früh- und Spätfröste. Von den umgebenden Rahmenhöhen abfließende Kalt-luft bleibt hier liegen.

Zusammenfassend läßt sich das Groß- und Mesoklima des Schweinfurter Beckens als deutlich subkontinental getönt beschreiben, wofür der innerhalb der Bundesrepublik extreme Trockenheitsindex spricht.

6. Bemerkungen zur Pflanzengeographie

Nach WALTER und STRAKA (1970) befindet sich Mainfranken in der "Eumitteleuropäischen Florenregion", einem ausgesprochenen Mischungsraum sämtlicher eurasiatischer Geoelemente.

Gemäß dem im AG herrschenden subkontinentalen Klimazug treten Pflanzenarten mit ausgeprägt subozeanischer Verbreitung, wie Potentilla sterilis, Galium odoratum, Hedera helix, Melica uniflora, Rosa arvensis, Digitalis purpurea, Fagus sylvatica, Quercus petraea u.a. zurück oder fehlen sogar, während sie in den niederschlagsreicheren Gebieten der Umgebung (Fränkische Platte, Steigerwald) häufiger sind.

Andererseits finden sich (sub)kontinentale Arten recht häufig; hier sind beispielsweise Serratula tinctoria, Rosa gallica, Pulmonaria mollis, Potentilla alba, P. thuringiaca, Peucedanum officinale, Vicia cassubica, Melica picta, Digitalis grandiflora und Calamagrostis arundinacea zu nennen, die alle in lichteren Wäldern des AG auftreten.

Auch die kontinentale Kiefer (*Pinus sylvestris*) darf nach pollenanalytischen (ZEIDLER 1939) bzw. pflanzensoziologischen Untersuchungen (ZEIDLER und STRAUB 1959) als im AG autochthone Baumart angesehen werden.

Die gemäßigt kontinentale Winterlinde fehlt fast keinem Eichen-Hainbuchenwald im AG. Die Feldulme mit ähnlichem Verbreitungsschwerpunkt begegnet uns immer wieder in Carpinion-Gesellschaften basenreicher Böden. Nach Auskunft der Forstleute war die Baumart vor dem "Ulmensterben" noch häufiger. Neben den verbreiteten schweren Böden dürfte das Klima zum Vorherrschen der (subkontinentalen) Stieleiche über die (subatlantische) Traubeneiche beitragen. Am östlichen Beckenrand und im anschließenden klimatisch weniger extremen Steigerwaldvorland wird die letztere merklich häufiger. Die subatlantische Vogelkirsche zieht sich auf die ganzjährig frisch-feuchten Böden des Stellario-Carpinetum zurück (Regel der relativen Standortskonstanz!).

Sommerliche Trockenperioden in Verbindung mit verbreiteten sandigen, tonigen und zweischichtigen (wechselfeuchten) Böden dürften für das Hervortreten des (sub)kontinentalen Geoelements hauptverantwortlich sein.

Erwähnenswert scheint das Zurücktreten mancher submediterraner Pflanzenarten, wie Ligustrum vulgare und Geranium sanguineum. Viburnum lantana und Euphorbia amygdaloides wurde überhaupt nicht gefunden. Da ihr Wärmebedürfnis im Schweinfurter Becken sicher erfüllt ist, liegt die Erklärung möglicherweise neben der Sommertrockenheit bei den oben angesprochenen Spätfrösten, welche – ähnliches gilt für die Rotbuche – die frisch ausgetriebenen Blattorgane schädigen.

Deutlich gibt das Fehlen oder Vorkommen subatlantischer bzw. subkontinentaler Pflanzengesellschaften Auskunft über die chorologische Stellung unseres Raumes.

So tritt beispielsweise der subatlantische Silbergrasrasen, das Corynephoretum Tx. 28, nur sehr kleinflächig und artenarm ausgebildet auf, während das Sileno-Festucetum Libb. 33, ver-

schiedene Steppenrasen der Festucetalia vallesiacae Br.-Bl. et Tx. 43 sowie subkontinentale Pfeifengraswiesen (Violo-Cnidietum Walth. in Tx. 55 ex Phil. 60) im AG weit nach Westen vorgeschobene Vorposten besitzen.

Noch kurz angemerkt sei hier, daß das im benachbarten Steiger-waldvorland häufige Leberblümchen (*Hepatica nobilis*, myrme-cochore Pflanze!) in seiner nacheiszeitlichen Einwanderung gerade erst den Ostrand des Schweinfurter Beckens erreicht hat.

7. Überblick über die Besiedlungsgeschichte

Einen Überblick über Vor- und Frühgeschichte des Raumes geben PESCHECK, ROTH, BÖHME (1975), deren Darstellung hier gefolgt wird.

Bedingt durch klimatische Gunst, günstige Bodenverhältnisse und geeignete Wandermöglichkeiten stellte das AG seit der **Altsteinzeit** immer Aufenthalts- und Siedlungsraum des Menschen dar. Ab dem **Neolithikum** (ab 3000 v.Chr.) dürfte er die Wälder seiner Umgebung stärker beeinflußt haben.

Zahlreiche Grabhügel aus der Bronze- und Eisenzeit deuten auf eine kontinuierliche Besiedlung hin. In der Völkerwanderungszeit nahmen germanische Stämme den Raum in Besitz. Alamannen und Thüringer werden ab dem 5. Jahrh. v. Chr. in das fränkische Großreich einbezogen.

Während Mittelalter und Neuzeit lag der Waldbesitz hauptsächlich in Händen der Kirche. Die Betriebsform Mittelwald lieferte Brenn- und Bauholz, daneben spielten Vieheintrieb, Gerbstoffgewinnung (Eichenrinde!) und Zeidelei eine größere Rolle (vgl. RABL 1982). Nach der Einführung der Sommerstallhaltung des Viehs wurden dem Waldboden große Mengen Streu entzogen, was im 18. und 19. Jahrhundert zur Degradation besonders der basenärmeren Böden führte. Mit der Säkularisation übernahm der Bayerische Staat alle Waldungen, die sich im Kirchenbesitz befanden, später tauschte er sie gegen Regale verschiedener Adliger ein.

Während hier schon bald die Überführung zum Hochwaldbetrieb eingeleitet wurde, lebte die alte Betriebsform in den kleinen Gemeindewäldern bis in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg fort. Heute befinden sich auch diese Wälder in Überführung, oft ist gerade bei ihnen die ehemalige Mittelwaldstruktur aber noch deutlich zu erkennen.

8. Die Bewirtschaftungsweise der Wälder $\underline{\text{im}}$ AG und deren Einfluß auf die Artenzusammensetzung

Fast alle Waldungen des AG stellen ehemalige <u>Mittelwälder</u> dar. Für die Brennholzgewinnung setzte man alle 15-25 Jahre ("Untriebsperiode") die niedrige Baumschicht "auf den Stock", d.h. man entfernte alle seit dem letzten Schlag nachgewachsenen Stockausschläge. Besser gewachsene Vertreter, vor allem aber aus Samen stammende, teilweise auch gepflanzte Gehölze ("Kernwüchse") ließ man als "Laßreidel" weiterwachsen. Dadurch wuchsen mit der Zeit mächtigere Stämme heran, die als Bauholz benötigt wurden. Je nach Bodengüte begegnen uns Stieleiche,

Hainbuche, Esche, seltener Winterlinde als "Überhälter" in der höheren Baumschicht. Ausschlagsfreudige Arten, wie Hainbuche, Winterlinde, Feldahorn u.v.a. bilden ein niedrigeres zweites Stockwerk. Auf nicht allzu basenarmen Böden findet sich in typischen Mittelwäldern darunter noch eine oftmals dichte Strauchschicht, an der die Hasel einen umso größeren Anteil hatte, je kürzer die Umtriebszeit war.

Insgesamt besaßen diese heute nur noch selten zu findende Wälder keinen hohen Schlußgrad (0.7-0.8) und wiesen deshalb in ihrer Krautschicht zahlreiche heliophile Arten auf.

Bei der Überführung zum Hochwald werden alle gutgewachsenen Stockausschläge und Kernwüchse stehengelassen, die minderwertigen weggenommen. Ältere Überführungswälder sind fast geschlossen und weisen eine hallenwaldartige Struktur auf. Eine Strauchschicht fehlt dann oft.

Wie überall in der Bundesrepublik verhindert der übergroße Rehwildbestand eine Naturverjüngung der Baumarten ohne Zaun. Unverbissener Gehölzjungwuchs findet sich niemals.

In der Literatur ist oftmals betont worden, wie sehr die Mittelwaldwirtschaft über die Beeinflussung der Baumschicht auch auf die Zusammensetzung der Krautschicht Einfluß nimmt (HESMER 1932, MEUSEL 1954, KRISO 1958, RUBNER 1960, SEIBERT 1966, ELLENBERG 1982 u.v.a.).

In ehemals rotbuchenreichen Wäldern wird Fagus sylvatica in den warmen Tieflagen, wo sie sowieso schon am Rande ihres ökologischen Optimums steht, durch die Ausschlagswirtschaft zurückgedrängt oder ganz entfernt, weil ihr Baumstumpf bei trocken-warmem Klima austrocknet. Fehlt die Schattenlaubholzart Buche, können sich lichtliebendere Baumarten, wie Eiche, Hainbuche und Linde, entwickeln, die alle zugleich auch ausschlagsfreudiger sind. Zahlreiche heliophile Strauch-und Krautarten, die ihr ökologisches Optimum mehr in Mantel und Saum haben, können jetzt in die lichten Waldungen einwandern.

Diese eben besprochenen Zusammenhänge gelten für ehemalige Rotbuchenwälder, die durch den Nieder- und Mittelwaldbetrieb "herabgewirtschaftet" (AICHINGER) worden sind.

Wo aber Fagus sylvatica aus natürlichen Gründen zurücktritt, waren die lichtliebenden Carpinion-Kennarten immer schon Bestandteil der Waldgesellschaften, auch schon vor deren stärkerer menschlicher Beeinflussung. Ein für Beckenlagen typisches sonnenscheinreiches Regionalklima ermöglichte ihnen in den niemals voll geschlossenen Eichen-Hainbuchen-Urwäldern ein Fortkommen.

Auch in den ursprünglichen Carpinion-Wäldern hat es eine Entwicklungsdynamik gegeben (MAYER 1977). Geschlosseners Optimalphasen wurden von lichteren Alters-, Zerfalls- und Jugendphasen abgelöst. Lichtungs ("Schlag-")-, Saum- und Mantelgesellschaften konnten sich ausbilden, deren Vertreter mit dem Dichterschließen des Bestandes auswichen oder vegetativ längere Zeit im Waldschatten überdauerten. Ähnliches dürfte für Windwurflücken und Flächen gelten, deren Baumbestand während Insektenkalamitäten kahlgefressen wurden. Wildtiere haben solche optimalen Äsungsflächen sicher länger baumfrei gehal-

ten (vgl. DIERSCHKE 1974).

Die Mittelwaldwirtschaft hat diese strukturdynamischen Vorgänge teilweise nachgeahmt und so - in natürlichen Eichen-Hainbuchenwaldgebieten! - nur zu einer quantitativen kaum aber qualitativen Veränderung in der Artenkombination geführt.

9. Zusammenfassung des einleitenden Teils

Das Arbeitsgebiet, der südlich des Mains gelegene Teil des Schweinfurter Beckens, stellt eine reliefschwache Ackerlandschaft dar. Strukturmäßig erweist sie sich als geologische und morphologische Mulde. Neben verbreiteten lehmigen und tonigen Böden des Letten- und Gipskeupers spielen die sandigen Substrate der Terrassensedimente und Flugsande eine große Rolle. Trocken-warmes Regionalklima erlaubt den Anbau zahlreicher Feldfrüchte und Sonderkulturen. Häufige Spätfröste schließen Wein- und Obstbau aus. Die ehemals weitverbreiteten moorigen Niederungen werden nach Grundwasserabsenkung ebenfalls ackerbaulich genutzt. Waldflächen nehmen in dem waldarmen Raum die für die Landwirtschaft ungünstigen sandigen und nassen Böden ein. Aus klimatischen Gründen fehlt ihnen die Rotbuche weitgehend. Pflanzengeographisch bestätigen kontinentale Pflanzenarten und -gesellschaften bei gleichzeitigem Zurücktreten des subatlantischen Geoelementes die klimatischen Verhältnisse. Spätestens seit dem Neolithikum greift der Mensch stärker in das Naturgefüge ein. Die meisten ehemaligen Mittelwälder befinden sich in Überführung zum Hochwald.

II. METHODIK

1. Vegetationskundliche Untersuchungen

Die vegetationskundlichen Untersuchungen fanden während der Vegetationsperiode 1986 statt, die bodenkundlichen Geländearbeiten erstreckten sich bis in den Winter 1986/87 hinein. Mehr als die Hälfte der Aufnahmeorte wurden wegen der verschiedenen Aspekte zweimal besucht. Die Tabellen enthalten die Artenkombination aus beiden Besuchen. Um möglichst alle Waldgesellschaften zu erfassen und sie floristisch ausreichend zu kennzeichnen, wurden relativ viele Aufnahmen angefertigt.

Die Aufnahmen erfolgten nach der Methode von BRAUN-BLANQUET (1964, vgl. hierzu auch ELLENBERG (1956), REICHEL und WILMANNS (1973), SCAMONI (1955))

Die Probeflächen waren zwischen 200-300 m² groß, der Dekkungswert der Arten wurde nach folgender Skala geschätzt:

```
r: nur 1-3 Exemplare in der Aufnahmefläche
+: wenig vorhanden, Deckungsgrad < 1 %
1: zahlreich vorhanden und/oder - < 5 %
2: - 5 - 25%
3: - 25 - 50%
4: - 50 - 75%
5: - 75 -100%
```

v : nur vegetativ vorhanden

Tm Gelände wurde weiter notiert:

- Datum

- Standpunkt

- Aspekt - Bodenart (Oberboden)
- Bewirtschaftung - Humusform
- Neigung+Exposition - Morphologie

-(Bodentyp)

- Geologie

- Aufnahmeflächengröße

Das Material von gut 250 Aufnahmen wurde am Rechenzentrum der Universität Bayreuth mit dem Ordnungsprogramm von Streng/ Schönfelder, verbessert durch Reif und Lastic, weiterverarbei tet. Dieses Programm läßt eine Umstellung von Arten und Aufnahmen in klassischer Weise mit Computerunterstützung zu.

Die im Gelände vermerkten Soziabilitätsangaben mußten dabei leider wegfallen; ein nachträgliches Wiedereinfügen in die fertigen Tabellen konnte aus Zeitgründen nicht mehr erfolgen.

Ein Verzeichnis der Lage der Aufnahmeflächen befindet sich im Anhang.

Die entstandenen Gesellschaftstabellen stellen die Grundlage für die Beschreibung der Vegetationseinheiten dar. Die Untereinheiten (Subassoziationen, Varianten u.s.w.) sind rein lokal gefaßt, weswegen häufig auch von ranglosen "Ausbildungen" gesprochen wird.

Bei der Beschreibung der Vegetationseinheiten werden die Arten innerhalb ihrer ökologisch-soziologischen Gruppen nach Stetigkeit aufgezählt.

Die Benennung der Phanerogamen folgt OBERDORFER (1983), die der Moose FRAHM und FREY (1983). Die soziologische Bewertung der Arten und die Benennung der Einheiten wurde weitgehend nach dem bewährten System von OBERDORFER (1983) vorgenommen.

Ebenfalls nach dem zuletzt genannten Autor erfolgte die Kennzeichnung des Wasser- und Nährstoffhaushaltes der Standorte. Wert wurde dabei auf die Unterscheidung von Basen- und Nährstoffgehalt eines Bodens gelegt.

Der Hopfen (Humulus lupulus) als Hemikryptophyt wurde wegen seiner Wuchsweise zu den Straucharten gestellt.

Die verschiedene Arten des Weißdorns werden von den überhöhten Rehwildbeständen überaus stark verbissen, eine genaue Bestimmung war selbst dem Spezialisten nicht möglich, weswegen in der Tabelle immer nur von Crataegus spec. gesprochen wird.

Ein Teil der in den Tabellen erscheinden Viola odorata stellt nach freundlicher Auskunft von Herrn Prof. Dr. Meierott (Gerbrunn) die Kreuzung mit Viola hirta dar.

Die Bestimmung der Ulmen erfolgte nach dem Schlüssel von SACH-SE (1984). Bei Ulmus minor dürfte es sich demnach teilweise um Ulmus hollandica (=Ulmus glabra x Ulmus minor) handeln.

Unter "Schlußgrad" wird hier, abweichend vom üblichen Gebrauch, die Beschattung verstanden, die Bäume und Sträucher auf die Bodenvegetation werfen. Insbesondere in haselnußreichen Beständen spielt die Strauchschicht eine wesentliche Rolle bei der Beschattung.

In den Tabellenköpfen wurden folgende Abkürzungen verwendet:

Deckungsgrade: BI > 20 m (getrennt nach BII 5 - 15(-20) m Wuchshöhe) S 0.5 - 3 m < 0.5 ĸ

Geologie: M Obere Muschelkalk

G Ton- und Kalksteine des Lettenkeupers

S Sandsteine des Lettenkeupers

T Untere Myophorienschichten (Gipskeuper) Q Terrassensedimente

F Flugsand (z.T. Dünen)

A Maintalholozan (v.a. tonige Schluffe)

K Talfüllung (v.a. Sande)

N Niedermoortorf

C Seekreide mit dünner Niedermoordeckschicht

F/T Flugsandschleier (<0.5m) über Myophorienschichten Q/T Schotterstreu (<0.5m) -

Bodenart:

T(t) Ton (tonig) L(1) Lehm (lehmig) S(s) Sand (sandig) sandiger Lehm u.s.w.

Humusform: MU Mull MO Moder RH Rohhumus

In den Übersichtskarten wurden folgende Ortsnamen abgekürzt: Fu Fulda, Mi Miltenberg, Mgh Bad Mergentheim, Wi Bad Windsheim, Sch Schweinfurt, Wü Würzburg, Ho Hollfeld Lo Lohr/Main, Co Coburg, Ki Kitzingen, Kö Königshofen/ Grabfeld, Nü Nürnberg, Fü Fürth, Er Erlangen, Ba Bamberg

2. Bodenkundliche Untersuchungen

Die bodenkundlichen Untersuchungen gliederten sich in einen Freiland- und einen Laborteil. Mit Hilfe von gut 100 Bodeneinschlägen verschaffte sich der Verfasser Einblicke in den Zusammenhang Geologie - Morphologie - Boden - Vegetation. Der Bohrstockbefund wurde nach dem in der Standortskunde üblichen Verfahren beschrieben (vgl u.a. ARBEITSKREIS STANDORTSKARTIE-RUNG 1980). An 13 repräsentativen Orten wurden Bodengruben angelegt, die Profile aufgenommen und bei allen am selben Tag von drei Wänden aus jedem Horizont Proben genommen. Diese wurden getrocknet und anschließend in den Laboratorien der Biogeographie und der Bodenkunde der Universität Bayreuth untersucht auf:

- Korngrößenzusammensetzung (nach KÖHN)
- Humusgehalt, C/N-Verhältnis (Gaschromatograph)
- pH-Wert (Boden: 0.01n CaCl₂ = 1:2.5; pH-Elektrode)
- (aktuelle) Basensättigung
- (Eintausch: BaCl2, Rücktausch: MgCl2 ---> AAS)

Die in den Analysenergebnissen der Bodenproben angegebenen Werte für die Kationenaustauschkapazität und die basisch-wirkenden Kationen verstehen sich in mval/100 g Boden (trocken).

Die verwendeten Bodenhorizontsymbole halten sich an die Angaben in der "Bodenkundlichen Kartieranleitung" (ARBEITSGRUPPE BODENKUNDE 1982) sowie an die Empfehlungen des ARBEISKREISESFÜR BODENSYSTEMATIK (1985). Die Angabe der Farben bei der Beschreibung der Horizonte erfolgte nach dem subjektiven Empfinden des Verfassers.

In den schematischen Bodenprofilzeichnungen bedeuten die Symbole folgendes:

UUU Humu	sform = Mull	Horizont, naßgebleicht
U U U Humu	asform = Moder	Horizont, humos mit Humusauswaschung
Humu	asform = Rohhumus	Horizontbegrenzung t scharf
Hori	izont, stark humos	· · · · Horizontbegrenzung ± wellig
Hori	zont, mäßig humos	Grundwasserzutritt
Hori	izont, schwach humos	* * Eisen-Mangan-Konkretionen
Hor	izont, verbraunt	Rostfleckung (Marmorierung)
Hor	izont, tonverarmt	Bodenausgangsmaterial # fest
Hor	izont mit Tonverwitterung	Bodenausgangsmaterial 2 locker
Hor.	izont mit Toneinwaschung	C Bodenausgangsmaterial kalkhaltig
1 A A I	izont mit Humus- und quioxid-Einwaschung	eclogischer Wechsel im Bodenausgangsmaterial

III. DIE PFLANZENGESELLSCHAFTEN

1. Übersicht der behandelten Pflanzengesellschaften

Salicetea purpureae Moor 58
Salicetalia purpureae Moor 58
Salicion albae Soó 30 em. Moor 58
Salicetum albae Issl. 26

Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 43
Alnetalia glutinosae Tx. 37
Salicion cinereae Müll. et Görs 58
Salicetum cinereae Zol. 31
Alnion glutinosae Malc. 29
Carici elongatae-Alnetum glutinosae W.Koch 26

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 37
Quercetalia robori-petraeae Br.-Bl. 32
Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 32
Luzulo-Quercetum petraeae Knapp em. Oberd. 50

Quercetalia pubescenti-petraeae Br.-Bl. 31 Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 32 Clematido-Quercetum Oberd. 57

Fagetalia sylvaticae Pawl. 28
Alno-Ulmion Br.-Bl. et Tx. 43
Pruno-Fraxinetum Oberd. 53
Querco-Ulmetum Issl. 24
Carpinion Issl. 31 em. Oberd. 53
Stellario-Carpinetum Oberd. 57
Galio-Carpinetum Oberd. 57

Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müll. 61
Origanetalia vulgaris Th. Müll. 61
Geranion sanguinei Tx. in Th. Müll. 61
Geranio-Peucedanetum Th. Müll. 61
Trifolion medii Th. Müll. 61
Agrimonio-Vicietum cassubicae Pass. 67 (n.inv.)

Epilobietea angustifolii Tx. et Prsg in Tx. 50
Atropetalia Vlieg. 37
Epilobion angustifolii (Rüb. 33) Soó 33
Calamagrostio-Digitalietum grandiflorae
Sill. 33 em. Oberd. 57

? Magnocaricion W.Koch 26
Euphorbia palustris-Carex acutiformis-Gesellschaft

2. Die Waldgesellschaften

2.1. <u>Querco-Fagetea</u> Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 37, Sommergrüne Laubwälder in Europa

2.1.1. <u>Fagetalia sylvaticae</u> Pawl. 28, Mesophile Laubmischwälder

2.1.1.1. <u>Carpinion</u> Issl. 31 em. Oberd. 53, Eichen-Hainbuchenwälder

In großen Teilen West-, Mittel- und Osteuropas stocken in wärmeren Lagen auf mineralkräftigen Böden artenreiche Mischwälder, deren Baumschicht von Eiche, Hain- und Rotbuche, Linde und zahlreichen weiteren Baumarten (im Osten auch Fichte) gebildet wird. Zu einem größeren Teil als Ersatzgesellschaften von Rotbuchenwäldern zu bezeichnen, stellen sie auf bestimmten, für Fagus sylvatica ungünstigen Standorten die zonale (=klimatisch bedingte) Vegetation dar.

- Sommertrockenheit
- Spätfrostgefährdung
- Gleyböden, sommerliche Überflutung
- Tonböden mit unausgeglichenem Wasser- und Lufthaushalt

sind Faktoren, die einen höheren Anteil der Rotbuche an der natürlichen Waldgesellschaft ausschließen (ELLENBERG 1982).

Von TÜXEN und DIEMONT (1936) als Fraxino-Carpinion mit den Auen- und Edellaubholz-Hangwäldern vereinigt, wurden die Eichen-Hainbuchenwälder von OBERDORFER (1953) als selbständiger Verband Carpinion Issl. 31 em. Oberd. 53 herausgestellt. Seit OBERDORFER (1957) werden zwei Assoziationen unterschieden, die später von MÜLLER (1966, 1967) schärfer gefaßt wurden.

- Galio-Carpinetum Oberd. 57 auf Böden mit sommerlicher Oberbodenaustrocknung, mehr im östlichen Mitteleuropa verbreitet
- Stellario-Carpinetum Oberd. 57 auf ganzjährig frischen Böden, mehr im westlichen Mitteleuropa verbreitet

Im AG stellen Carpinion- Gesellschaften die Leitgesellschaft im Sinne SCHRETZENMAYR (1950,1961) dar. Sie besiedeln eine breite Standortspalette und sind demgemäß mannigfaltig gegliedert. Während das vom basenhaltigen Grund- und Hangzugwasser lebende, nur noch schwach von der folgenden Gesellschaft trennbare Stellario-Carpinetum nur in zwei an anspruchsvollen Arten reichen Ausbildungsformen erscheint, finden sich beim Galio-Carpinetum "reiche", "mittlere" und "arme" Untereinheiten.

Auf dem "reichen Flügel" des Carpinion erfolgt die weitere Untergliederung bei beiden Assoziationen weitgehend durch die gleichen Trennarten. Aufgrund der zahlreichen Untereinheiten mußte mit dem Hilfsmittel der Subassoziationsgruppe gearbeitet werden, ähnlich wie es beispielsweise HOFMANN (1964/65) und MÜLLER (1966) getan haben.

Beiden Gesellschaften gemeinsam ist das beständige Vorkommen von Melica picta, Phyteuma nigrum und in der Baumschicht Ulmus minor. Einen Vorschlag von HOFMANN (1964/65,1967) aufgreifend, darf hierbei wohl von einer "Melica picta-Rasse" (innerhalb der "gemäßigt kontinentalen Neckar-Main-Rasse" von MULLER 1967) des Carpinion gesprochen werden. Melampyrum nemorosum, von HOFMANN ebenfalls als mögliche Rassentrennart

erwähnt, wächst im AG nicht innerhalb geschlossener Wälder, sondern ist Bestandteil mesotraphenter Saumgesellschaften. Dieselbe Rasse scheint im Grabfeld (MEUSEL 1935), Kitzinger Becken (ZEIDLER und STRAUB 1959) sowie in der Windsheimer Bucht vorzuliegen.

2.1.1.1.1. Stellario-Carpinetum Oberd. 57, Eschen-Stieleichen-Hainbuchenwald, (Tab. 1, Aufn. 1-34)

Verbreitung im AG

Die Gesellschaft besiedelt flache Bachtälchen mit holozäner Talfüllung sowie wasserzügige Unterhänge und Hangmulden im Gipskarstbereich der Unteren Myophorienschichten. Lokal findet sie sich auch auf terrassensandüberdecktem Oberen Muschelkalk. Sie ist real nicht stark verbreitet, würde in der potentiellen natürlichen Vegetation aber einen größeren Teil der Mainaue und des Talfüllungsbereiches besiedeln. Schöne Bestände finden sich in der "Hellelohe", der "Holzspitze" und am Ostrand des "Ansbach". Kleinflächige sieht man die Gesellschaft noch im "Kapitelwald" im "Kammerholz" sowie im "Schopfig".

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

Nach dem verwandten Hartholzauenwald bietet die Gesellschaft die wüchsigsten Waldbilder. In den häufigen Überführungsbeständen bauen gradschäftige Stieleichen, Eschen, Hainbuchen, Feldahorne, seltener Winterlinden und Flatterulmen die obere Baumschicht auf. Ein zweites, niedrigeres Stockwerk aus Hainbuche, Winterlinde, Feldahorn u.a. zeichnet sich nur undeutlich ab. In den straucharmen hallenwaldartigen Beständen fallen der stark verbissene Weißdorn, Hasel und Pfaffenhütchen kaum auf. Die Vogelkirsche, die ebenfalls die BI erreicht, besitzt auf den frisch-feuchten Böden ihren Verbreitungsschwerpunkt im AG. Die Winterlinde erreicht nicht ganz die Stetigkeit wie in den reichen Ausbildungen des Galio-Carpinetum.

Mittelwaldartige Bestände weisen eine dichte, artenreiche Strauchschicht aus Hasel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Blutrotem Hartriegel, Rotem Geißblatt und Schwarzer Holunder auf. Letzterer besitzt hier und im verwandten Galio-Carpinetum allietosum sein lokales Optimum innerhalb der Eichen-Hainbuchenwälder des AG. Deutlich lassen sich mehrere Baumschichten unterscheiden, die von den oben angeführten Baumarten gebildet werden.

Auf die Zusammensetzung der im Mittel 80-95% deckenden Krautschicht hat die Bewirtschaftung kaum einen Einfluß, da ein hoher Schlußgrad in jedem Fall vorhanden ist.

Während des Jahres lassen sich vier Aspekte trennen. Nach dem üppigen Erscheinen der Frühlingsgeophyten, folgt der schwach ausgeprägte Aspekt der Blüte der Großen Sternmiere. Nachdem im Frühsommer Hochstauden dominieren, schließt die Entwicklung mit der Blüte verschiedener Gräser ab.

Floristische Zusammensetzung der Krautschicht

Die Kennarten des Verbandes Dactylis polygama, Stellaria ho-

lostea, Galium sylvaticum, seltener Carex umbrosa sind durchgehend vorhanden. Das Waldlabkraut, bereits von MÜLLER (1966) nur als schwache Kennart des Galio-Carpinetum bezeichart, stellt nach BOHN und ZEIDLER (beide mündlich) lediglich eine Verbandskennart dar, die ihren Schwerpunkt allerdings im Galio-Carpinetum des AG besitzt. Die Trennarten der zuletzt genannten Gesellschaft fehlen, ebenso fast alle Zeigerpflanzen trockener Böden. Die Trennarten der Eichen-Hainbuchenwälder basenreicher Böden sind gut vertreten und erreichen höhere Deckungswerte: Asarum europaeum, Ficaria verna, Aegopodium podagraria, Ranunculus auricomus agg., Anemone ranunculoides, Geum urbanum, Primula elatior, Vicia sepium, Viola mirabilis, Campanula trachelium, Heracleum sphondylium, Glechoma hederacea, Galium aparine, Lilium martagon, Geranium robertianum, Pulmonaria obscura, Carex sylvatica, dazu weitere Arten geringerer Stetigkeit. Das subatlantische Lamium g.montanum darf als lokale Trennart gegen das Galio-Carpinetum gelten, in dem es durch das subkontinentale Lamium g.ga-leobdolon ersetzt wird.

Eine gute Wasserversorgung sowie einen lockeren, gut gekrümelten Oberboden, der sich im Frühjahr schnell erwärmt, verlangen die sehr anspruchsvollen Geophyten Arum maculatum, Scilla bifolia, Gagea lutea, Muscari botryoides und der Märzenbecher (Leucojum vernum), der durch Ausgraben selten geworden ist. Die Nitrophyten Alliaria petiolata, Lamium maculatum und Arctium nemorosum mit ähnlichen Ansprüchen bevorzugen die lichteren mittelwaldähnlichen Bestände.

Die hygrophile Deschampsia cespitosa fehlt kaum einem Bestand, bei Auflichtung, etwa in einer Windwurflücke oder unter absterbenden Feldulmen, bildet das Gras ausgedehnte Kolonien (eigene Lichtungsgesellschaft?).

Wo das Herbstlaub rasch abgebaut wird, erreicht die Moosschicht größere Deckungswerte. Es dominieren anspruchsvolle, einen mindestens frischen Boden fordernde Vertreter, wie Eurhynchium striatum, E. swartzii, seltener Rhytidiadelphus triquetrus.

Untereinheiten

Fast alle angetroffenen Bestände gehören zu der reichste Standorte besiedelnden <u>Allium ursinum-Subassoziation</u> (SA). Neben dem im Frühjahrsaspekt oft absolut dominierenden Bärlauch, eignen sich Corydalis cava und C. solida als differenzierende Arten. Die Unduldsamkeit des Bärlauchs gegenüber Konkurrenten (vgl. ELLENBERG 1982, LANGE und KANZOW 1965) dürfte in einigen Fällen das Fehlen der Trennarten des Galio-Carpinetum erklären, zu dessen Allium ursinum-Subassoziation enge floristische Beziehungen bestehen. Nach dem Absterben des Bärlauchs im Frühsommer bieten die Bestände einen etwas trostlosen Anblick, weil die verbleibende Vegetation anfangs nur wenig Bodendeckung besitzt.

Je nach Feuchtegrad des Bodens treten verschiedene Varianten auf. Am verbreitetsten ist die <u>Stachys sylvatica- Variante.</u> Ihr lassen sich die meisten Bestände des <u>Stellario-Carpinetum</u> des AG zuordnen. <u>Stachys sylvatica</u>, <u>Elymus caninus</u>, seltener <u>Circaea lutetiana</u>, <u>Impatiens noli-tangere</u>, <u>Ranunculus lanuginosus</u> und <u>Aconitum vulparia</u> deuten auf einen auch im

Sommer betont frischen Oberboden hin.

Fehlen die oben genannten Trennarten, liegt die <u>Trennartenfreie-Variante</u> vor. Ihre Standorte sind wohl etwas weniger feucht.

Nur sehr lokal finden sich zwei weitere Untereinheiten. Typisch für den Steilabfall der Niederterrasse gegen die Maintalaue ist die <u>Corydalis intermedia-Variante</u>. Außer dem Mittleren Lerchensporn sind weitere Arten mit kontinentalem Verbreitungsschwerpunkt, wie Omphalodes sorpioides und Gagea minima, bezeichnend.

Recht feuchte Böden besiedelt die <u>Filipendula ulmaria-Variante</u>. Auf den veränderten Bodenwasserhaushalt deuten die Feuchtezeiger Filipendula ulmaria, Carex acutiformis, Crepis paludosa und Lysimachia vulgaris hin. Sie zeigen oft nur geringe Vitalität und erreichen keinen hohen Deckungsgrad. In der Baumschicht weist die Erle ebenfalls auf die Bodenfeuchte hin. Die seltenen Bestände ohne Allium ursinum werden der <u>Arum maculatum-Subassoziation</u> zugeordnet. Deren Böden dürften etwas weniger nährstoff- und basenhaltig sein. Das Vorkommen der Arten der <u>Stachys sylvatica-Gruppe</u> zeigt eine gute Wasserversorgung an.

Standorte

Mit MÜLLER (1967) dürfte der entscheidende Standortsunterschied zum im folgenden beschriebenen Galio-Carpinetum die sommerliche Oberbodenfrische sein. Im Bereich der Talfüllungssedimente mit ihrem nahen Grundwasser sowie an wasserzügigen Unterhängen und Hangmulden sind ganzjährige Feuchte bis Frische örtlich gewährleistet. Das hier ebenfalls vorhandene Galio-Carpinetum (allietosum, aretosum) läßt ein kleinflächiges Mosaik unterschiedlicher Bodenwasserverhältnisse vermuten, das die Vegetation nachzeichnet.

Alle Standorte des Stellario-Carpinetum im AG weisen neben der guten Wasser- gute bis sehr gute Basen- und Nährstoffversorgung auf. Eine hochaktive Bodenflora und -fauna setzt den herbstlichen Bestandesabfall rasch um, im folgenden Frühsommer findet sich fast nichts mehr davon, beste Humusform, L-Mull sowie ein lockerer, gut gekrümelter Oberboden wie ihn die anspruchsvollen Geophyten verlangen, sind die Folge.

Bodentypologisch treten größere Unterschiede auf. Im Grundwasserbereich der Talfüllungssedimente bestätigen die verbreiteten Entwässerungsgräben das Profilbild: <u>Tschernitzen</u> und alle Übergänge zu <u>Gleyen mit humosem Oberboden</u> deuten die ehemals feuchteren Verhältnisse an. Diese Böden tragen heute die <u>Stachys sylvatica-Variante der Allium ursinum</u> und <u>Arum maculatum-SA</u> des <u>Stellario-Carpinetum</u>. Zumindestens die hier ebenfalls vorhandene <u>Filipendula ulmaria-Variante dürfte eine Folgegesellschaft des Erlen-Eschenwaldes (<u>Pruno-Fraxinetum/ Alno-Ulmion</u>) darstellen (vgl. JAHN 1984).</u>

Wasserzügige Unterhänge und Hangmulden im Bereich der Unteren Myophorienschichten und des deckschichtentragenden Oberen Muschelkalkes weisen pseudovergleyte Braunerde-Pelosole bzw. Braunerde-Hangpseudogleye auf. Hier stocken die Stachys sylvatica- und - seltener - die Trennartenfreie Variante der

Profil 1: Ansbach; hochwaldartiger Überführungswald; 218 m NN;

Auenlage: 1°E

Stellario-Carpinetum allietosum, Stachys sylvatica-Variante

Gley, im Oberboden stärker humushaltig, aus Talfüllung

+2 cm Humusform: L-Mull

0-10 cm $\mathbf{A_h}$ grauschwarzer, humoser, schluffiger Lehm; gut durchwurzelt; Krümelgefüge

10-25 cm ${}^{A}_{h}G_{01}$ olivgrüner, orange marmorierter, etwas humoser, sandiger Ton; stark kalkhaltig; gut durchwurzelt; Subpolyedergefüge


25-35 cm ${\bf A_h G_{o2}}$ hellgrüner, orange marmorierter, etwas humoser sandiger Ton; stark kalkhaltig; gut durchwurzelt; Subpolyedergefüge

35-45 cm ${f A}_h{f G}_{o3}$ schwarzgrüner, stark orange marmorierter, etwas humoser, schluffiger Ton; stark kalkhaltig; mittel durchwurzelt; Subpolyedergefüge

45-55 cm G_{or} dunkelgrüner, orange marmorierter, schluffiger Ton; gering durchwurzelt; Polyedergefüge

Analyseergebnisse:

		Korngrößenzu- sammensetzung			Humusge- halt		Sorptions- verhältnisse		
	S%	U%	Т%	C%	C/N	рН	T	S	٧%
Δ	37	37 34 29			mval 11.6 12 6.90 29.8 28.7				96.3
AhGo1	97 40	34 15	45	3.7	13	7.46	33.4	31.9	95.5
AhGo2	36	24	40	3.7	25	7.27	34.5	34.2	99.1
AhGoz Gor	22	32	46	3.6	22	7.66	32.8	31.9	97.2
G	19	28	53	n.b.	n.b.	7.75	38.7	38.0	98.2



Allium ursinum- und Arum maculatum-SA.

Im Bereich der *Corydalis intermedia*-Variante findet sich eine <u>eutrophe Braunerde</u> mit (reliktischer?) Gleyfleckung im Unterboden. Während sommerlicher Trockenperioden kommt es hier zum kapillaren Aufstieg basenreichen Maintalgrundwassers.

Als charakteristisch für die am weitesten verbreitete Untereinheit des Stellario-Carpinetum, die Allium ursinum-SA, Stachys sylvatica-Variante wurde das auf der nächsten Seite beschriebene Bodenprofil (Profil 1) näher untersucht.

Literaturvergleich (Stellario-Carpinetum)

Unsere Gesellschaft vermittelt deutlich zwischen den mehr subatlantischen und den mehr subkontinentalen Ausbildungen des Stellario-Carpinetum. Von den subatlantischen Arten Lonicera periclymenum, Potentilla sterilis, Ilex aquifolium, Oxa-

lis acetosella, Hedera helix, Arum maculatum und Prunus avium der Tabellen von OBERDORFER (1957: Oberrheinebene, St.-C. allietosum, St.-C. ficarietosum) und LOHMEYER (1967: Münsterland, St.-C. stachyetosum) finden sich nur die letzten drei im Stellario-Carpinetum des AG, wobei der Efeu recht selten ist. Sippen mit subkontinentalem Verbreitungsschwerpunkt, wie Asarum europaeum, Lathyrus vernus, Viola mirabilis (im AG kein Wärmezeiger!), Lilium martagon, Ulmus minor und Tilia cordata erreichen in unserer Gesellschaft z.T. höhere Stetigkeiten, während sie in den Tabellen der genannten Autoren selten oder garnicht zu finden sind. Sie sind auch im Stellario-Carpinetum Polens verbreitet (MATUSZKIEWICZ, W. und A. 1985: St.-C. ficarietosum), dem die oben genannten subatlantischen Arten völlig fehlen.

Floristisch ähnliche eschenreiche Stellario-Carpineten mit buntem Geophytenaspekt im Frühjahr sind oft beschrieben worden. Der verbreiten Trennartenfreien und Stachys sylvatica-Variante der Allium ursinum- und Arum maculatum-SA sind beispielsweise vergleichbar (p.p. = pro parte):

LIBBERT (1932/32: Neumark, Querco-Carpinetum, SA von Stachys sylvatica); MEUSEL (1935: Grabfeld, Ficaria-Primula-, Ficaria-, Allium ursinum-Typ p.p.); TÜXEN und DIEMONT (1936: Westfrankreich, Querco-Carpinetum, SA von Scilla bifolia), TÜXEN (1937: NW-Deutschland, Querco-Carpinetum corydaletosum); KREH (1938: Mittleres Neckargebiet, Querco-Carpinetum, Kleebwald p.p.); SCHLENKER (1940: Württembergisches Unterland, Querco-Carpinetum corydaletosum); LOHMEYER (1950: Hannover, Querco-Carpinetum corydaletosum, Q.-C. stachyetosum, Arum maculatum-Variante); EHWALD (1959: Thüringisches Grabfeld, Schneeglöckchen Stieleichen-Hainbuchenwald p.p.); RODI (1959/60: Schwäbische Alb, Kleebwald p.p.); HOFMANN (1964/65: Fränkische Platte, Stellario-Carpinetum corydaletosum); BORN-KAMM und EBER (1967: Südniedersachsen, Galio-Carpinetum asperuletosum, Corydalis-Variante); PASSARGE und HOFMANN (1968: NO-Deutsches Flachland, Corydalido-Lathraeo-Carpinetum); MUL-LER (1968: Schwäbisches Albvorland, Stellario-Carpinetum stachyetosum, Allium ursinum-Variante); KÜNNE (1969: Frankenalb, Stellario-Carpinetum p.p.); HOFMEISTER (1970: Unteres Wesertal, Querco-Carpinetum corydaletosum); MARSTALLER (1981:

Galio-Carpinetum, Gagea lutea-SA p.p.); ZEIDLER (1982/1984: Steigerwald, Stellario-Carpinetum allietosum/corydaletosum); PHILIPPI (1982,1983: Kraichgau bzw. Unteres Taubertal, Stellario-Carpinetum p.p.); SCHMALE (1984: Frankenhöhe, Stellario-Carpinetum); DIERSCHKE (1986: Südniedersachsen, Stellario-Carpinetum corydaletosum).

Es spricht für die klimatische Stellung des AG, daß sich das Stellario-Carpinetum kaum noch von den oft unmittelbar benachbarten frühjahrsfeuchten Ausbildungen des Galio-Carpinetum unterscheidet. Will man dem Kennartenprizip treubleiben, kommt man um die Unterscheidung nicht herum, bei der dann manchmal das Vorkommen einzelner Exemplare von Convallaria majalis den Ausschlag für die Zuordnung gibt.

2.1.1.1.2. **Galio-Carpinetum** Oberd. 57, Winterlinden-Stieleichen-Hainbuchenwald

Das Galio-Carpinetum stellt die im AG real und potentiell natürlich am weitesten verbreitete Waldgesellschaft dar. Es handelt sich um Stieleichen-Hainbuchen-Winterlinden-Mischbestände, denen sich die Traubeneiche und andere Baumarten nur in bestimmten Ausbildungen beimischen. Die große von ihm besiedelte Standortsamplitude macht eine Untergliederung in drei größere Gruppen notwendig:

- Galio-Carpinetum , SA-Gruppe von Luzula luzuloides
- --> mesotraphent
 Galio-Carpinetum typicum ---> meso-eutraphent
- Galio-Carpinetum, SA-Gruppe von Asarum europaeum

---> eutraphent

In allen Untereinheiten der Gesellschaft sind die Trennarten gegen das Stellario-Carpinetum (MÜLLER 1966,1967) vertreten; in der Baumschicht die selteneren Elsbeere und Speierling, in der Krautschicht Convallaria majalis, Carex montana, Festuca heterophylla, Lathyrus niger, alles Anzeiger einer sommerlichen Oberbodentrockenheit. Auch Chrysanthemum corymbosum stellt nach ZEIDLER (mündlich) eine gute Trennart dar. Querco-Fagetea-Arten sind fast immer vorhanden. Meist finden sich Anemone nemorosa, Milium effusum, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum, Scrophularia nodosa; Viola reichenbachiana und Brachypodium sylvaticum treten in der Luzula luzuloides-SA-Gruppe zurück. Bei den Begleitern erreichen Melica nutans, Galeopsis tetrahit und Fragaria vesca höhere Stetigkeiten.

Bedingt durch das sommerwarme Regionalklima lassen sich keine besonderen thermophilen Untereinheiten herausarbeiten. Vielmehr finden sich in fast jedem Waldstück wärmeliebende und trockenheitsertragende Arten, wie Chrysanthemum corymbosum, Lathyrus niger sowie Vertreter der Origanetalia Th. Müll.61, freilich nur steril auf ihre Chance wartend. In anthropogenen oder natürlich entstandenen Lichtlücken schließen sie sich zu verschiedenen Lichtungsgesellschaften zusammen (siehe 3.1.!). In relativ geschlossenen Beständen spielen thermo- und heliophile Arten auch an geneigten Südhängen nur steril eine Rolle, wohingegen am Nordhang blühender Diptam die Windwurflücken bereichert.

Es spricht für den subkontinentalen Klimazug des AG, wenn so-

genannte "Saumarten" Bestandteile bestimmter Waldgesellschaften darstellen, die ihnen in lichteren Phasen der Waldentwicklungsdynamik auch im Urwaldzustand Lebens- und Reproduktionsmöglichkeiten boten.

2.1.1.1.2.1. <u>Galio-Carpinetum</u>, <u>SA-Gruppe</u> <u>von Asarum</u> <u>europaeum</u> = SA-Gruppe basenreicher Standorte, (Tab. 1, Aufn. 35-119)

Auf Böden guter bis sehr guter Basenversorgung stocken im AG artenreiche Eichen-Hainbuchenwälder, die durch zahlreiche anspruchsvolle Arten zusammengehalten werden:

Baumschicht: Acer campestre, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Ulmus effusa

Strauchschicht: Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Lonicera xylosteum, Daphne mezereum (oft ausgegraben!)

Krautschicht: Asarum europaeum, Aegopodium podagraria, Ficaria verna, Anemone ranunculoides, Lathyrus vernus, Viola mirabilis, Geum urbanum, Vicia sepium, Campanula trachelium, Primula elatior, Heracleum sphondylium, Glechoma hederacea, Senecio fuchsii, Lamium g.galeobdolon, Galium aparine, Lilium martagon, Rubus caesius, Carex sylvatica, Geranium robertianum, Pulmonaria obscura, Paris quadrifolia, Melandrium dioicum, Bromus benekenii, Mercurialis perennis

Die Gesellschaftsgruppe läßt sich in etwa mit dem Galio-Carpinetum, SA-Gruppe von Lathyrus vernus bei MÜLLER (1966) und dem recht komplexen Querco-Carpinetum asaretosum von LIBBERT (1939) vergleichen.

Der <u>Wasserhaushalt</u> der Standorte entscheidet über die weitere Untergliederung, wobei mehr Wasser in der Regel auch mehr pflanzenverfügbare Nährstoffe bedeutet. In der Reihenfolge G.-C. allietosum --> G.-C. aretosum --> G.-C. asaretosum wird der Bodenwasser- und Basenhaushalt langsam ungünstiger.

Verbreitung im AG.

Die Gesellschaften der reichen SA-Gruppe finden sich im AG überall dort, wo in wurzelerreichbarer Tiefe ton- oder kalkreiche Keupersedimente anstehen.

Das <u>Galio-Carpinetum</u> <u>allietosum</u> <u>ursini</u> bestockt im typischen Fall den Ausstrichbereich des Gipskeupers mit seinem durch Gipskarsterscheinungen unruhigen Kleinrelief. Während das Stellario-Carpinetum allietosum hier die Unterhänge und Hangmulden besiedelt, findet sich die floristisch und standörtlich nahe verwandte Gesellschaft mehr am Ober- und Mittelhang, z.T. auch auf Verebnungsflächen. Daneben stockt sie auch auf den grundwasserbeeinflußten Böden der Talfüllungssedimente, wobei mosaikartig das Stellario-Carpinetum die feuchteren, das Galio-Carpinetum die weniger feuchten Standorte einnimmt; hier genügen anscheinend nur wenige Zentimeter Höhenunterschied der Bodenoberfläche, um mal die eine, mal die andere Gesellschaft zur Vorherrschaft zu bringen.

Ebenfalls im Gipskeuperbereich findet sich das <u>Galio-Carpine-tum aretosum</u>. Lößlehmbeeinflußte Fließerden führen hier zu einer etwas weniger günstigen Wasser- und Basenversorgung der

Böden. Zudem nimmt die Gesellschaft oft die weniger geneigten Flächen ein, wo die "nachschaffende Kraft des Hanges" wegfällt. Weiterhin begegnet man ihr im Bereich der Talfüllungssedimente der kleinen Bäche und Gräben sowie auf Zweischichtböden (Sand/Lehm über Gelbkalk und Ton) an wasserzügigen Lettenkeuperhängen.

Beide Gesellschaften besitzen im AG eine große Verbreitung, sowohl in der realen, wie in der potentiellen natürlichen Vegetation (p.n.V.). "Holzspitze", "Drittelholz", "Eichig", "Schopfig", "Riedholz", "Ansbach" und "Kämmlingsberg" sind als Fundorte zu nennen.

Nur lokal stößt man auf das <u>Galio-Carpinetum asaretosum</u>. Es würde in der p.n.V. den Bereich des Grenzdolomitausstriches bestocken, der schon bei der neolithischen Erstbesiedlung bevorzugtes Rodungsgebiet war. Daneben findet sich die Gesellschaft kleinflächig überall dort, wo Reliefposition und/oder Deckschichtenmächtigkeit einen für das Gedeihen der <u>Allium ursinum</u>- und <u>Arum maculatum</u>-SA notwendigen Wasser- und Basenhaushalt nicht mehr gewährleisten. Flugsand- und Fließerdedecken über Keupertonen sowie umgelagerte Schotter älterer Terrassen (Streuschotter) sind hier zu nennen. Im "Riedholz" besiedelt die Gesellschaft Seekreide mit dünner vererdeter Niedermoordecke. Weitere Bestände findet man im "Esbachholz", "Ansbach", "Kämmlingsberg", "Gehäu", "Spitalholz".

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

Die Gesellschaften begegnen uns im Gelände entweder als straucharmer Überführungswald (ehemaliger Kirchenbesitz!) oder mit dichter, artenreicher Strauchschicht als mittelwaldartiger Bestand (Gemeindewälder!). Stieleiche, Hainbuche, Winterlinde und Feldahorn bilden die obere Baumschicht; die letzten drei dominieren auch im unteren Baumstockwerk, das nur in den mittelwaldartigen Beständen gut zu erkennen ist; ihnen sind noch Flatterulme, Traubenkirsche, seltener Feldulme (Schwerpunkt G.-C. aretosum), Vogelkirsche, Bergahorn (ob autochthon?), Erle und Zitterpappel einzelstammweise beigemischt. Die ansonsten häufige, wohl forstlich etwas geförderte Esche tritt im G.-C. asaretosum zurück, wahrscheinlich aus Feuchte- und Nährstoffgründen. Hier und im G.-C. aretosum findet man noch vereinzelt Traubeneiche, Elsbeere und Speierling.

Bei lichter Bestandesstruktur gedeihen Weißdorn, Hasel, Pfaffenhütchen, untergeordnet Blutroter Hartriegel, Seidelbast, Feldrose, Rote Heckenkirsche, Schwarzer Holunder, Efeu, Liguster, Echter Kreuzdorn und Wilde Stachelbeere recht üppig.

Nach einem charakteristischen, artenreichen Geophytenaspekt im Frühjahr und dem schwach ausgeprägten Aspekt der Blüte der Großen Sternmiere entwickeln sich im Sommer zahlreiche Stauden, im Spätsommer und Herbst Gräser.

Floristische Zusammensetzung der Krautschicht

Zu den oben genannten Trennarten der reichen Eichen-Hainbuchenwälder kommt beim $\underline{G.-C.}$ <u>allietosum</u> und <u>aretosum</u> noch eine charakteristische Artengruppe aus <u>sehr</u> <u>anspruchsvollen</u> <u>und (frühjahrs)feuchtigkeitsbedürftigen</u> $\underline{Geophyten}$, wie \underline{Arum} ma-

culatum (schwach auf das G.C. asaretosum übergreifend), Scilla bifolia, Gagea lutea, Muscari botryoides. Die Nitrophyten Alliaria petiolata, Lamium maculatum und Arctium nemorosum haben ebenfalls hier einen Schwerpunkt.

Allium ursinum (meist absolut dominierend), Corydalis cava und C. solida differenzieren die Allium ursinum-SA gegen das nahe verwandte G.-C. aretosum. Die beiden Lerchenspornarten zeigen eine auffällige Häufung im Randbereich der Wälder, was auf Eutrophierung vom Acker her hindeuten dürfte (vgl. WEINERT, GROßE, SCHABERG 1973).

Hygrophile Arten, wie Deschampsia cespitosa und Cardamine p. nemorosa, findet man sehr häufig. Sie wachsen aber auch im meso-eutraphenten G.-C. typicum, weswegen sie nicht zu den Trennarten der reichen Eichen-Hainbuchenwälder gestellt werden können.

Nur in Beständen mit stellenweise unbewachsenem Boden erreichen Moose größere Deckungswerte. Anspruchsvollere Vertreter, wie Eurhynchium striatum, Thuidium tamariscinum, Rhytidiadelphus triquetrus (selten im G.C. allietosum), Fissidens taxifolius, seltener Atrichum undulatum und Plagiomnium undulatum sind hier anzuführen.

Untereinheiten

In allen drei Gesellschaften der SA-Gruppe lassen sich eine Trennartenfreie Variante auf sommerlich mäßig frischen, eine Stachys sylvatica-Variante auf frischen und eine Filipendula ulmaria-Variante auf mäßig feuchten Böden unterscheiden.

Charakteristisch für die <u>Stachys sylvatica</u>- und <u>Filipendula ulmaria-Varianten</u> sind die hygrophilen <u>Alno-Ulmion-Kenn-</u> und Trennarten <u>Stachys sylvatica</u>, <u>Elymus caninus</u>, seltener <u>Impatiens noli-tangere</u>, <u>Circaea lutetiana</u>, <u>Festuca gigantea</u>, <u>Cardamine impatiens</u>, <u>Ranunculus lanuginosus</u>, <u>Aconitum vulparia</u>, <u>Colchicum autumnale</u>. In den seltenen <u>Filipendula-Varianten</u> kommen dazu noch die Feuchtezeiger <u>Filipendula ulmaria</u>, <u>Carex acutiformis</u>, <u>Crepis paludosa</u> und <u>Lysimachia vulgaris</u>, allerdings nur mit geringen Deckungsgraden und oft kümmernd.

Aufgrund Häufigkeit und Variabilität der im AG vorhandenen Deckschichten treten beim G.-C. aretosum und vor allem beim G.-C. asaretosum innerhalb der oben genannten Varianten weitere Untereinheiten auf dem Niveau der Subvariante und Ausbildung auf. Gemeinsam ist den Serratula tinctoria-Subvarianten, die sich besonders schön im "Spitalholz" finden, das Vorkommen mehrerer Wechselfeuchtezeiger, wie Färberscharte, Calamagrostis arundinacea, Rosa gallica, Pulmonaria mollis, Molinia arundinacea, Inula salicina und Stachys officinalis, bis auf den Heilziest alles Vertreter des subkontinentalen Geoelements, das durch die Standortsverhältnisse – zeitweise Vernässung und anschließende scharfe Austrocknung – kräftig gefördert wird.

Thermophile und bodentrockenheitsertragende Arten, wie Sorbus torminalis, Lathyrus niger, Carex montana, Festuca heterophylla, Chrysanthemum corymbosum, Campanula persicifolia, aber auch Dictamnus albus erreichen hier höhere Deckungswerte, ohne den übrigen Gesellschaften der reichen SA-Gruppe

Gesellschaft	Geologie/Relief	Böden	Wasserhaush. (Sommer)
G.C. allietosum Trennartenfr. + St. sylvVar.	Gipskeuper; Hänge, (Verebnungen) Talfüllung; Mulden	Pelosole,z.T. Vertisola. Pel> Profil ? Tschernitzen	frisch
G.C. aretosum	Gipskeuper + Lettenkeuper mit Deckschicht;	Braunerde-Pelosole, Pelosole, Entrophe Brannerden	frisch
St. sylvVar.	Talfüllung; Mulden	Tschernitzen	
Filip. ulmVar.	Talfüllung; Mulden Streusch./Gipsk. im GrundwBer.;Mulden	Tschernitzen Gley-Pseudogleye> Profil <i>3</i>	mäßig feucht
Trennartenfr. Var.	Gipskeuper + Lettenkeuper mit ärmerer Deckschicht; Hänge - Verebn.	Pelosol-Braunerden, Braunerde-Pelosole, Eutrophe Braunerden> Profil4	māßig frisch
6.C. asaretosum Filip. ulmVar.	Talfüllung; Mulden	Tschernitzen	mäßig feucht
St. sylvVar.	Flugsand; Platte Lettenkeuper; Platte Seekreide + geringe Niedermoordecksch.;Mulden	Schwarzerde? Pseudogley-Braunerden "Phäno-Rendzina"	frisch
Trennartenfr. Var. Trennartenfr. Subvar.	Streusch./Gipsk.; Hänge Lettenkeuper mit Decksch.; Hänge Grenzdolomit; Platte Talfüllung; Mulden	Pelosol-Braunerden Braunerde-Pelosole Eutrophe Braunerden> Profil 5 Tschernitzen	māßig frisch
Trennartenfr. Var. Serratula-Subvar.	Streusch./Gipsk. im GrundwBer.; Mulden Lettenkeuper mit Decksch.; Hänge	Gley-Pseudogleye Braunerde-Pseudogleye	wechsel- frisch

Standortsverhältnisse im Bereich des **Galio-Carpinetum**,SA-Gruppe von Asarum europaeum


Profil 2: Holzspitze; Überführungswald; 228 m NN; Oberhang: 5°SW Galio-Carpinetum allietosum ursini, Trennartenfreie-Variante

Vertisolartiger Pelosol aus tonig-lehmiger Deckschicht über den Tonsteinen der Unteren Myophorienschichten

+2	cm		Humusform: L-Mull
0-7	cm	A _h	grauschwarzer, humoser, toniger Lehm; gut durchwurzelt; Krümelgefüge
7-25	cm	A _h P	schwarzgrauer, humoser, schluffiger Ton; gut durchwurzelt; Polyedergefüge
25-40	cm	IIP	mittelgrauer, schluffiger Ton; etwas durch- wurzelt; Polyedergefüge

40-45 cm **?IIIPC**e hellgrauer, schluffiger, kalkhaltiger Ton; schwach durchwurzelt; Kohärent-/Polyeder-gefüge

	Korngrößenzu- sammensetzung			Humus gehal		pH- Wert		tions- ältnis:	ions- iltnisse	
	S%	U%	Т%	C%	C/N	рН	T mv:	S	٧%	
Ah Ah P PC _C	17 7 3 2	57 51 31 53	26 42 66 45	13.5 4.9 n.b. n.b.		6.02 6.57	32.3 30.7 31.1 31.9	20.4 24.6 28.2 31.8	63.1 80.1 90.6 99.7	



Profil 3: Spitalholz; oberholzarmer Mittelwald; 215 m NN; Mulde

Galio-Carpinetum aretosum, Filipendula ulmaria-Variante,


Serratula tinctoria-Subvariante

Gley-Pseudogley aus Streuschotterdeckschicht über den Tonsteinen der Unteren Myophorienschichten

+2	cm		Humusform: L-Mull
0-7	cm	A _h	grauschwarzer, schwach kiesiger, humoser schluffiger Lehm; gut durchwurzelt; Wurmlo- sungsgefüge
7-18	cm	G _o S _w	dunkelgrauer, marmorierter, schwach kiesiger, schwach humoser, schluffiger Lehm; gut durchwurzelt; Krümel-/Subpolyedergefüge
18-50	cm	^{IIG} or ^S d	orange-grün marmorierter, schwach kiesiger, lehmiger Ton; mittel durchwurzelt; Polyeder- gefüge; einzelne Konkretionen

50-70 cm ${\bf IIIG_{r}C_{v}}$ grünlichgrauer, lehmiger Ton; gering durchwurzelt; im Tonanteil Polyedergefüge

		Korngrößenzu- sammensetzung			Humusge- gehalt		pH- Sorptions- Wert verhältnisse		
	S%	U%	Т%	C%-	C/N	рH	T mv	S	V%
Ah Gosw Gorsd Grcv	32 32 27 16	41 40 24 25	27 28 49 59	9.1 2.4 n.b. n.b.		6.10 5.84 6.04 6.63	19.4 13.5 30.2 32.5	11.6 7.4 22.5	59.7 54.8 74.5 92.6




Profil 4: Gehäu; Mittelwald; 217 m NN; Mittelhang: 3°N Galio-Carpinetum aretosum, Trennartenfreie Variante

Eutrophe Braunerde aus Fließerdedeckschichten (Material des Oberen Sandsteins) über Gelbkalk des Lettenkeupers

+2	cm		Humusform: L-Mull
0-10	cm	Ah	schwarzbrauner, etwas skeletthaltiger, humoser, sandiger Lehm; gut durchwurzelt; Krümel-/Wurmlosungsgefüge;
10-33	cm	B _V	schokoladenbrauner, etwas skeletthaltiger, sandiger Lehm; gut durchwurzelt; Krümel-/ Subpolyedergefüge;
33-45	cm	11B ₄	schokoladenbrauner, skeletthaltiger, toni- ger Lehm; gering durchwurzelt; Subpolyeder- gefüge

45-58 cm IIImCc gelblicher verwitterter Kalkstein; z.T. vertont; gering durchwurzelt

	Korngrößenzu- sammensetzung			Humusge- halt		pH- Wert	Sorptions- verhältnisse		se
	S%	U%	Т%	C%	C/N	pН	T mv	S fa	٧%
Ah By By nC _C	60 56 51 24	24 29 19 37	16 15 30 39	5.9 n.b. n.b. n.b.	n.b.	4.94 5.93 6.04 7.21	20.7 18.1 28.8 43.9	11.4 13.2 21.4 42.8	55.1 72.9 74.3 97.5



Profil 5: Esbachholz; Überführungswald; 218 m NN; Platte Galio-Carpinetum asaretosum, Trennartenfreie-Variante


Eutrophe Braunerde (Kolluvium ?) aus sandiger Deckschicht über Grenzdolomitboden

+3	cm		Humusform: F-Mull
0-8	cm	A _h	schwarzbrauner, ganz schwach kiesiger, humoser, stark sandiger Lehm; schwach kalkhaltig; gut durchwurzelt; Wurmlosungs-/Krümelgefüge
8-25	cm	B ♥	braungelber, ganz schwach kiesiger, stark sandiger Lehm; schwach kalkhaltig; gut durchwurzelt; Subpolyeder-/Kohärentgefüge

25-35 cm IIfA_h schwarzbrauner, skeletthaltiger, humoser, sandiger Lehm; stark kalkhaltig; gering durchwurzelt; Subpolyedergefüge

35-58 cm IImC_c gelbbrauner, verwitterter Kalkstein; z.T.vertont; gering durchwurzelt

	Korngrößenzu- sammensetzung			Humusge- halt		pH- Wert			
	S%	U%	Т%	C%	C/N	pН	T mva	S al	٧%
Ah BY fAh mC _C	73 68 57 45	15 13 16 21	12 19 27 24	4.3 n.b. 3.5 n.b.	26	7.00 7.00 7.25 7.64	18.2 21.0 27.9 14.9	17.3 18.7 27.5 14.0	95.5 89.0 98.6 99.2



ganz zu fehlen.

Die Basenarmutzeiger der Hieracium sabaudum-Ausbildung innerhalb der oben angesprochenen Subvarianten, Hieracium sabaudum, H. sylvaticum, H. lachenalii, Luzula luzuloides, Melampyrum pratense, Polytrichum formosum, Lathyrus linifolius, Deschampsia flexuosa und Veronica officinalis, die sich aus Mächtigkeit der Deckschicht und lichtreichem Standort (Verhagerung!) erklären, deuten bereits den Übergang zur Luzula luzuloides-SA-Gruppe an.

Standorte

Die Trennarten des Galio-Carpinetum gegen das Stellario-Carpinetum zeigen alle die sommerliche Oberbodentrockenheit an. Trotz des subkontinentalen Klimazugs im AG verfügen die von der reichen SA-Gruppe besiedelten Böden aber über ausreichende Wasserreserven im Unterboden, um Hainbuche, Winterlinde und anderen nicht xerophytischen Baumarten - mithin dem Carpinion - ein Gedeihen zu ermöglichen.

Gute bis sehr gute Basenversorgung zeichnet alle Standorte der reichen SA-Gruppe aus. Ein regenwurmreicher, lockerer, gut gekrümelter Oberboden mit L- und F-Mull als Humusform findet sich fast immer. Lediglich bei den Serratula tinctoria-Subvarianten des G.-C. asaretosum, deren Bestände sich auf Keupertonböden mit einer Deckschicht aus verlagerten Terrassensedimenten finden, kommt es zu einem verzögerten Streuabbau und damit zu Übergängen zwischen Mull und Moder.

Einen Einblick in die vielfältigen Standortsverhältnisse, die sich im Bereich der Asarum europaeum-SA-Gruppe finden, mögen die Standortsübersicht und die Bodenuntersuchungen auf den vorangegangenen Seiten geben.

2.1.1.1.2.2. Galio-Carpinetum typicum, (Tab. 3, Aufn. 1-15)

Auf Böden, die in ihrem Basenhaushalt zwischen mittel und gut stehen, siedeln im AG gutwüchsige Eichen-Hainbuchenwälder, denen sowohl die differenzierenden Arten der reichen, wie die der ärmeren SA-Gruppe fehlen.

Verbreitung im AG

Der Trennartenfreie Eichen-Hainbuchenwald ist charakteristisch für den Ausstrichbereich des Oberen Sandsteins. Kleinflächig trifft man ihn auf Werksandstein und auf Flugsand, der in nicht allzu großer Mächtigkeit basenreiche Keupergesteine (meist Tonsteine) überlagert. Schöne auch großflächige Bestände findet man im "Ansbach", "Kämmlingsberg" und im "Gehäu".

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

Bei fast allen aufgenommenen Beständen handelt es sich um straucharme Überführungwälder mit nur noch abgeschwächt erkennbarer Mittelwaldstruktur. Tonige Unterböden erklären das Erscheinen der Hainbuche in der oberen Baumschicht, die wie üblich von (gutgeformter) Stieleiche, seltener Traubeneiche gebildet wird. Darunter füllen Hainbuche und Winterlinde den

verbleibenden Raum.

In der Strauchschicht erreicht nur die Hasel manchmal höhere Deckungswerte, oft kümmert sie ebenso wie der Weißdorn; weitere Straucharten findet man nur selten.

Im Frühjahr überzieht das Buschwindröschen oft geschlossen den Waldboden mit seiner weißen Blüte, nur selten mischt sich das Gelb der Scharbockskrautblüte dazwischen. Mit dem Ergrünen der Bäume fällt die Blüte der Großen Sternmiere zusammen. Recht stark ausgeprägt ist im Spätsommer die Entwicklung von Flatter- und Hainrispengras. An lichteren Stellen kann das Waldreitgras aspektbildend hervortreten (Calamagrostio-Digitalietum grandiflorae Sill. 33 em. Oberd. 57).

Floristische Zusammensetzung der Krautschicht

Die nach dem Einziehen der Frühlingsgeophyten nicht voll deckende Krautschicht setzt sich auf den "mittleren Böden" erwartungsgemäß aus relativ wenigen Arten zusammen. Stellaria holostea, Dactylis polygama, Milium effusum, Poa nemoralis, Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum kommen mit den Standortsverhältnissen am besten zurecht und erreichen z.T. hohe Deckungswerte. Azidophile Arten fehlen fast völlig, anspruchsvolle Vertreter sind auf die nachfolgenden Untereinheiten beschränkt.

Von einer mäßig bodenfrischen <u>Trennartenfreien</u> <u>Variante</u> läßt sich eine <u>Deschampsia cespitosa-</u>Variante auf frischen (wechselfrischen) Böden abtrennen. Letztere wird außer durch die Rasenschmiele durch <u>Cardamine p.nemorosa</u>, <u>Plagiomnium undulatum und Thuidium tamariscinum</u> differenziert. Vereinzelt trifft man noch <u>Ficaria verna</u>, <u>Carex sylvatica</u> und <u>Primula elatior</u> mit geringen Deckungswerten an.

Innerhalb beider Varianten zeigen einzelne Exemplare der tieferwurzelnden Basenzeiger Asarum europaeum, Lathyrus vernus, Lilium martagon, (Campanula trachelium) in erreichbarer Tiefe vorhandene basenreiche Schichten an (Ausbildung nach Asarum europaeum).

Standorte


Allen Böden ist eine Basenversorgung gemeinsam, die zwischen mittel und gut einzuordnen ist. Nicht mehr optimaler Basengehalt und sommerliche Trockenheit der Oberböden verhindern einen schnellen und vollständigen Streuabbau, Moderformen, meist noch als Mullartiger Moder anzusprechen, sind die Folge. Mesotrophe Braunerden sind charakteristisch für anstehenden Oberen Sandstein (Profil 6!). Häufig im Unterboden vorhandene reichere Schichten erlauben den Arten der Asarum europaeum-Ausbildung ein Fortkommen (Pelosol-Braunerden). Flugsanddecken größerer Mächtigkeit (0.5-0.8 m!) über Gipsund Lettenkeuper (Ton-/ Kalkfazies) tragen ebenfalls Moder-Braunerden, auf denen die Trennartenfreie Variante stockt. Unterhalb seines Ausstrichs, der meist einen kurzen Steilhang verursacht, trifft man den Oberen Sandstein in Form seines Frostschuttes als Bestandteil von Fließerden über der Ton-/Kalkfazies des Lettenkeupers (Obere Schießer-Gelbkalk-Folgen) an. Pseudovergleyte Pelosol-Braunerden und Pseudogleye

Profil 6: Kämmlingsberg; Mittelwald; 223 m NN; Platte Galio-Carpinetum typicum, Trennartenfreie Variante

Mesotrophe Braunerde aus Frostschutt des Oberen Sandsteins

+5	cm		Humusform: Mullartiger Moder
8-0	cm	A _h	grauschwarzer, stark lehmig-schluffiger, humoser Sand; gut durchwurzelt; Krümelgefüge
8-25	cm	B _v	sepiabrauner, stark lehmig-schluffiger Sand; gut durchwurzelt; Einzelkorngefüge
25-43	cm	$\mathbf{m}_{\mathbf{C}^{\mathbf{A}}}$	grünlichbrauner, stark lehmig-schluffiger Sandsteinfrostschutt

	Korngrößenzu- sammensetzung			Humusge- halt		pH- Wert			€
	S%	U%	Т%	C%	C/N	pН	T mval	s L	V%
Ah By mCy	55 42 45	34 47 41	11 11 14	11.0 n.b. n.b.	16 n.b. n.b.	3.88	41.7 22.4 9.9	3.2 0.5 0.3	7.6 2.2 3.0



mit unterschiedlich ausgeprägter Wechselfrische erlauben den hygrophilen Arten der *Deschampsia cespitosa*-Variante ein Wachstum. Wieder zeigen die Vertreter der *Asarum europaeum*-Ausbildung wurzelerreichbare, basenhaltige Untergrundschichten an.

2.1.1.1.2.3. <u>Galio-Carpinetum</u>, <u>SA-Gruppe</u> von <u>Luzula</u> <u>luzuloides</u>, = SA-Gruppe mittelgut basenversorgter Standorte, (Tab. 3, Aufn. 1-50)

Mesotrophe Standorte, meist pleistozäne Sedimente größerer Mächtigkeit, besiedeln im AG Eichen-Hainbuchenwälder, in denen Basenarmutszeiger eine große Rolle spielen. Neben dem Faulbaum in der Strauchschicht erreichen in der Krautschicht folgende Arten eine höhere Stetigkeit: Deschampsia flexuosa, Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, Melampyrum pratense, Hieracium sabaudum, H. sylvaticum, H. lachenalii, H. laevigatum, Pleurozium schreberi, Scleropodium purum, untergeordnet Agrostis tenuis, Holcus mollis und Lathyrus linifolius.

Anspruchsvolle und hygrophile Arten fehlen oder treten sehr stark zurück.

In dieser Gruppe sind zwei Gesellschaften zusammengefaßt: das Galio-Carpinetum potentilletosum albae auf wechseltrockenen und das Galio-Carpinetum luzuletosum luzuloidis auf mäßig frischen bis mäßig trockenen Standorten.

1. <u>Galio-Carpinetum potentilletosum albae</u>, (Tab. 3, Aufn. 1-5)

Verbreitung im AG

Die floristisch und standörtlich interessante Gesellschaft besiedelt fast ausschließlich den west- und südexponierten Randbereich von Wäldern, die dem G.-C. typicum zuzuordnen sind. Weder in der realen, noch in der potentiellen natürlichen Vegetation spielt sie eine größere Rolle. Als Fundpunkte sind Randpartien im "Ansbach", "Elsenholz", "Gehäu" und "Spitalholz" anzuführen.

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

Die lichten, sonnendurchfluteten Bestände weisen meist keine BI auf. Tiefbeastete Stieleichen und Winterlinden überschirmen nur locker eine artenarme Strauchschicht, in der der Faulbaum vorherrscht, nur selten von Hasel und Weißdorn begleitet. Hainbuche und Traubeneiche treten auf den wechseltrockenen Böden auffällig zurück. Mehrfach wurde die Wildbirne in dieser Gesellschaft gefunden, ob auch das Vorkommen der Kiefer natürlich ist, erscheint fraglich.

Außer einigen Blüten des Buschwindröschens fehlt ein Frühlingsaspekt, überhaupt entwickelt sich die Gesellschaft erst recht spät im Sommer. Lichtreichtum und Aushagerung der Oberböden erklären dabei den Grasreichtum.

Floristische Zusammensetzung der Krautschicht

Neben den gut vertretenen Trennarten des Galio-Carpinetum zählen Basenarmuts-, Bodentrockenheits- und Wechselfeuchtezeiger, wie Potentilla alba, Serratula tinctoria, Stachysofficinalis, Genista tinctoria, Peucedanum officinale, Rosagallica, Vicia cassubica, Dianthus superbus und Genista germanica zur charakteristischen Artengruppenkombination. Abge-

sehen vom Heilziest und vom Färberginster vertreten die letztgenannten Arten das subkontinentale Florenelement. Zu den oben genannten, für die SA-Gruppe bezeichnenden Azidophyten kommen noch die lichtliebenden Arten Veronica officinalis, Viola canina, V. riviniana, Calamagrostis epigejos und das Moos Dicranum polysetum; von den Bodentrockenheitszeigern sind Campanula persicifolia, Brachypodium pinnatum und Peucedanum cervaria die stetesten.

Stellaria holostea, Dactylis polygama und Galium sylvaticum machen die Stellung unserer Gesellschaft im Carpinion deutlich. Eine Zuordnung zum Potentiilo-Quercetum Libb. 33, dem die Eichen-Hainbuchenwaldarten fehlen, erscheint noch nicht gerechtfertigt. MARSTALLER (1978) betont den fließenden Übergang zwischen Carpinion und dem Fingerkraut-Eichenwald.

Bezeichnend für die klimatische Übergangsstellung des AG ist das Verhalten des Weißen Fingerkrautes. Die Art meidet einerseits wirklich geschlossene Wälder und besitzt ihr Optimum im Mantel und in dichten Säumen, also im Halbschatten (vgl. ULL-MANN 1977), andererseits vergilben seine Blätter bei Freistellung (Photodestruktion der Chloroplastenpigmente!), etwa nach dem Fällen eines Baumes.

Untereinheiten

Aufgrund der geringen Aufnahmenzahl lassen sich keine besonderen Untereinheiten herausarbeiten, lediglich Aufn. 5 fällt standörtlich (Flugsand/Gipskeuper) und floristisch etwas aus dem Rahmen. Hier spielen Hainbuche, Traubeneiche und die Frühjahrsfrischezeiger Ficaria verna und Cardamine p.nemorosa eine gewisse Rolle.

Standorte

Wechseltrockenheit und Basenarmut der Oberböden erklären sich aus Geologie und Wuchsort der Gesellschaft. Fließerden aus Frostschutt des Oberen Sandsteins über wasserstauenden Lettenkeupertonen bzw. Tonlinsen innerhalb des anstehenden Sandsteins ergeben bei Ackerrandnähe mit dem dort vorhandenen kontinentalen Temperaturgang (vgl. MEUSEL 1954) einen ausgeprägt unausgeglichenen Luft- und Wasserhaushalt sowie Verhagerungserscheinungen in den Oberböden der Pseudogleye. Humusform ist Mullartiger oder Typischer Moder.

2. <u>Galio-Carpinetum luzuletosum</u> <u>luzuloidis</u>, (Tab. 3, Aufn. 6-50)

Verbreitung im AG

Die Gesellschaft besiedelt großflächig den Komplex der pleistozänen Terrassen mit seinen sandig-kiesigen Böden mittlerer Basenversorgung. Auch auf mächtigeren Flugsanddecken und flachen Dünen, wie sie z.B. den Ostrand der Maintalaue begleiten, trifft man sie vereinzelt. Ganz lokal stockt sie auch an der Oberhangkante kleiner Härtlingskuppen, die der Obere Sandstein bildet. Große Teile von "Kapitelwald", "Kammerholz" und "Spitalholz" werden von der Gesellschaft eingenommen, nur kleine Flächen besiedelt sie im "Ansbach", "Kämmlingsberg" und "Gehäu" sowie im "Schopfig" und "Eichig".

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

Das obere Baumstockwerk bildet meist die Stieleiche, die deutlich seltenere, oft gepflanzte (Forstakten!) Traubeneiche mischt sich ihr bei, ebenso die häufig künstlich eingebrachte Kiefer. Geringe Bodengüte schließt die Hainbuche meist, die Winterlinde völlig von der BI aus; sie werden aufgrund ihrer schlechten Wuchsformen bei der Überführung nicht übernommen und bleiben unterständig. Hängebirke, Els- und Vogelbeere, Späte Traubenkirsche (eingebracht), Zitterpappel u.a. finden sich nur selten einzelstammweise beigemengt.

Zu geringer Basengehalt der Böden und ungenügende Lichtmengen in den häufigen Überführungsbeständen äußern sich im Zurücktreten der Sträucher. Der genügsame Faulbaum wird nur selten von schlechtwüchsiger Hasel und vom Weißdorn begleitet.

Nach ELLENBERG (1939,1982) verhalten sich Licht- und Basenbedürfnis bei Waldpflanzen umgekehrt proportional, d.h. je schlechter die Basenversorgung, umso größer der Lichthunger, ein Zusammenhang, der auch im AG sehr schön zu erkennen ist: in geschlossenen Überführungswäldern finden wir nur eine schüttere Krautschicht, die oft weniger als die Hälfte des Bodens deckt, in angrenzenden Lichtschächten erreichen Vitalität und Deckungsgrad derselben und weiterer, oft anspruchsvollerer Arten viel höhere Werte.

Lediglich einige Blüten des Buschwindröschens bereichern im Frühjahr den lange braun daliegenden Waldboden, die Entwicklung der Krautschicht setzt erst recht spät ein. Das Blühen von Behaarter und Weißer Hainsimse, Schlängelschmiele, Wiesenwachtelweizen und Bergplatterbse im Sommer setzt einen schwachen Höhepunkt, der nur an lichteren Stellen von hochwüchsigen Habichtskräutern verstärkt wird.

Floristische Zuammensetzung der Krautschicht

Die Kenn- und Trennarten von Verband und Assoziation sind meist gut vertreten, lediglich Chrysanthemum corymbosum und Lathyrus niger treten etwas zurück (Nährstofffrage?). Frische- und vor allem Basenzeiger finden sich nur selten, Basenarmutszeiger bestimmen das Bild. Die Vertreter der SA-Gruppe erreichen hohe Stetigkeits- und Deckungswerte. Unter eingebrachter Kiefer deuten Teppiche aus azidophytischen Moosen auf eine verstärkte Versauerung durch die Kiefernnadelstreu. Pleurozium schreberi, Scleropodium purum, Dicranum polysetum, D. scoparium und Leucobryum glaucum häufen sich hier.

Untereinheiten

Ännlich wie bei WELSS (1985) ergeben sich auch im AG kaum weitere Untergliederungsmöglichkeiten. Die Basenarmut der Standorte stellt wohl für viele Arten eine Verbreitungsschranke dar. In Tabelle 3 verschwinden die ohnehin meist nur vereinzelt auftretenden Anzeiger frischerer und damit etwas besser basenversorgter Standorte, wie Milium effusum, Polygonatum multiflorum, Eurhynchium triatum, Cardamine p.nemorosa, Ficaria verna, Viola reichenbachiana, Brachypodium sylvaticum, Scrophularia nodosa, mit zunehmender laufender Nummer. Hier irgendwo eine Grenze ziehen zu wollen, erscheint nicht sinnvoll.

Je einmal fand sich eine Ausbildung mit dominierendem Adlerfarn (<u>Pteridium aquilinum</u>) - unter Kiefern - und mit faziesbildendem Pfeifengras (<u>Molinia arundinacea</u>), beide wahrscheinlich anthropogen (Kiefernanbau und Streurechen).

Standorte

Die Gesellschaft stockt zum großen Teil auf mäßig frischen bis mäßig trockenen, oft tiefgründig entwickelten, ± podsoligen Moder-Braunerden (siehe Profil 7!); unter Kiefern ist die Basenauswaschung schon weiter fortgeschritten, was sich an geringmächtigen Ahe-Horizonten (3-5 cm) äußert. Hier findet sich bereits Rohhumusartiger Moder als Humusform. In die kiesigen Terrassensande eingeschaltete Tonlinsen (Pseudogley-Braunerden) werden von anspruchsvollen, tieferwurzelnden Arten (Asarum europaeum, Lathyrus vernus u.a.) angezeigt. Im Bereich mächtigerer Flugsande trifft man die Gesellschaft entweder auch auf hier auffällig gering entwickelten Moder-Braunerden (eisenzeitlich entstandene Flugsande und Dünen?) oder - lehrbuchmäßig – auf Bänder-Parabraunerden (siehe Profil 8!). Die lokalen Vorkommen auf Oberem Sandstein stocken auf flachgründigen Ranker-Braunerden.

Literaturvergleich (Galio-Carpinetum)

Ähnlich wie beim Stellario-Carpinetum nimmt das Galio-Carpinetum des AG eine Übergangsstellung zwischen subozeanischen und subkontinentalen Gesellschaftsausbildungen ein. Subatlantiker, wie Prunus avium, Hedera helix, Lonicera periclymenum, Galium odoratum, die in den Tabellen von DIERSCHKE (1986), der die Aufnahmen aus NW-Deutschland, wo das Galio-Carpinetum schon ausklingt, zusammenfaßt, häufig sind, fehlen im AG oder sind selten. Unsere Gesellschaft erhält mit der hochsteten Winterlinde sowie der selteneren Feldulme, bei gleichzeitigem Zurücktreten der Traubeneiche, schon subkontinentale Züge, die bereits deutlich an die Verhältnisse im Mitteldeutschen Trockengebiet und Polen anklingen, wie der Vergleich mit den Tabellen von PASSARGE (1953,1964), SCHLÜTER (1968), SCHUBERT (1972) und MATUSZKIEWICZ, W und A. (1985) zeigt.

Ahnlich wie dort spielen Arten mit subkontinentalem Verbreitungsschwerpunkt, wie Asarum europaeum, Lathyrus vernus, Lilium martagon, Viola mirabilis, Anemone ranunculoides u.a., in der Krautschicht der reichen SA-Gruppe eine bedeutende Rolle, dazu kommen Calamagrostis arundinacea, Serratula tinctoria, Rosa gallica, Molinia arundinacea, Pulmonaria mollis, Potentilla alba, Peucedanum officinale in den nicht seltenen wechselfeuchten Ausbildungen.

Mit der Häufigkeit von Melica picta und Phyteuma nigrum sowie dem einzigen Fundort von Lactuca quercina in der Bundesrepublik besitzt das Galio-Carpinetum im AG durchaus eigenständige Züge.


An dieser Stelle kann unmöglich ein Vergleich unserer Gesellschaft mit der unübersehbaren Literatur über den Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald erfolgen. Wegen der Bedeutung dieser waldgesellschaft für AG und Umgebung soll aber doch kurz auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu aus benachbarten Räumen beschriebenen Ausbildungen des Galio-Carpinetum hingewiesen

Profil 7: Spitalholz; Überführungswald; 220 m NN; Oberhang: 2°NW Galio-Carpinetum luzuletosum luzuloidis

Mesotrophe Braunerde aus kiesigen Terrassensanden

+5	cm		Humusform: Typischer Moder
0-10	cm	A _h	grauschwarzer, schwach kiesiger, schwach schluffiger, humoser Sand; gut durchwurzelt; Einzelkorngefüge;
10-65	cm	B _v	mittelbrauner, schwach kiesiger, schwach schluffiger Sand; gut durchwurzelt; Einzel-korngefüge
65-100	cm	10	braungrauer, stark kiesiger, schwach schluf- figer Sand; mittel durchwurzelt; Einzelkorn- gefüge

	Korngrößenzu- sammensetzung			Humusge- halt		pH- Wert		Sorptions- verhältnisse	
	S%	U%	Т%	C%	C/N	pН	T mval	S 1	٧%
By 1C	83 87 87	10 13 12	7 - 1	6.5 n.b. n.b.	18 n.b. n.b.	-	21.4 8.3 6.1	0.3 0.2 0.7	1.4 2.4 11.4



Profil 8: Gehäu; Kiefern-Eichen-Mischbestand; 220 m NN; Dünenkuppe Galio-Carpinetum luzuletosum luzuloidis

Bänder-Parabraunerde, leicht podsolig, aus Flugsand (Düne)

+5 cm Humusform: Typischer Moder


0-7 cm ${f A_{eh}}$ grauschwarzer, schwach gebleichter, humoser, ganz schwach schluffiger Sand; gut durchwur-

zelt; Einzelkorngefüge

 $\mathbf{A_1B_v}$ schokoladenbrauner, ganz schwach schluffiger 7-55 cm Sand; gut durchwurzelt; Einzelkorngefüge

B_{t.} 55-130 cm hellbrauner Sand mit unterschiedlich breiten, dunkelbraunen Einspülungsbändern aus schluffigem Material

	Korngrößenzu- sammensetzung		Humusge- halt		pH- Wert	Sorptions- verhältnisse			
	S%	U%	Т%	C%	C/N	pН	T mva	S	v
Aeh Al ^B v	94 95 98	5 5 2	1 1 -	6.5 n.b. n.b.	18 n.b. n.b.	4.55 4.33 4.26	17.4 6.7 4.9	0.3 0.2 0.2	1.7 3.0 4.1



werden, wobei gesellschaftsweise vorgegangen wird.

Aus dem Grabfeld hat MEUSEL (1935) von Gipskeuperböden den Allium ursinum-, den Ficaria-, den Ficaria-Primula elatior-, und den Asarum-Typ beschrieben, die gute Übereinstimmung mit unserer Asarum europaeum-SA-Gruppe (G.-C. allietosum, aretosum, asaretosum, jeweils Trennartenfreie und Stachys sylvatica-Variante) zeigen. Aus demselben Gebiet stammen einige Aufnahmen von ULLMANN und RÖßNER (1983), deren G.-C. asaretosum, geophytenreiche Variante mit unserem G.-C. allietosum und aretosum. Trennartenfreie Variante nahe verwandt ist. Ihre typische Variante läßt sich mit unserem G.-C. asaretosum, Trennartenfreie Variante vergleichen, während ihre etwas schwächer wechseltrockene Calamagrostis-Variante an unsere Serratula-Varianten des G.-C. asaretosum anklingt. Der zuletzt genannten Gesellschaft entspricht auch der Calamagrostis arundinacea-Typ von MEUSEL zum Teil. Unserem G.-C. allietosum und aretosum näher verwandt ist auch die Anemone ranunculoides-Variante, die ULLMANN und BRUMM (1979) aus dem Muschelkalkgebiet Umgebung von Münnerstadt beschreiben. Aus dem benachbarten Kitzinger Becken, in dem sandige Bodenarten vorherrschen, erwähnen ZEIDLER und STRAUB (1959) ein G.-C., nährstoffreiche Ausbildung, das unserem G.-C. asaretosum. Trennartenfreie Variante vergleichbar ist, während ihr G.-C. melicetosum pictae Anklänge an die Serratula tinctoria-Subvarianten unserer reichen SA-Gruppe zeigt. Ihr G.-C. primuletosum elatoris stimmt gut mit unserem G.-C. aretosum, Stachys sylvatica-Variante überein.

Bei den bisher aufgezählten Vergleichsgesellschaften handelt es sich um winterlindenreiche, buchenarme bis -freie Eichen-Hainbuchenwälder mit Melica picta z.T. auch Phyteuma nigrum und Ulmus minor, die große Übereinstimmungen mit den Verhältnissen im AG zeigen.

Etwas weniger gut läßt sich die eutrophe SA-Gruppe, die HOF-MANN (1964/65) von der im Westen an das AG angrenzenden Fränkischen Platte beschreibt, mit unseren Gesellschaften vergleichen. Das liegt teilweise daran, daß der Autor auch rotbuchenreiche Wälder ins Carpinion einbezogen hat, wie es seinerzeit noch üblich war. Das erklärt möglicherweise auch die deutlich geringere Stetigkeit der Winterlinde in seinen Tabellen. Anders als im AG spielt in den dortigen Wäldern die Traubeneiche und nicht die Stieleiche die wichtigere Rolle. Von seiner mit den Verhältnissen im AG recht gut übereinstimmenden Trennartengruppe des reichen G.-C. fehlen dem AG Euphorbia amygdaloides, Sanicula europaea sowie Elymus europaeus, während Polygonatum multiflorum stark auf die mesotraphente SA-Gruppe übergreift. Ungefähr lassen sich parallelisieren:

Fränkische Platte:

Schweinfurter Becken:

G.-C. asaret., Allium urs.-V.

G.-C. stachyetosum

G.-C. primuletosum veris

G.-C. allietosum

G.-C. asaret., St. sylv.-/Filip.-V.G.-C. asaret., Primula el.-V. G.-C. asaret., Trennartenfreie V.

alle Gesellschaften der SA-Gruppe enthalten thermophile Arten.

Auch in den Tabellen von ULLMANN (1977) vom Südlichen Maindreieck erreicht die Winterlinde in den hier buchenarmen Beständen geringere Stetigkeits- und Deckungswerte, was **mög**-licherweise doch mit dem weniger extremen Klima der **Frän**-kischen Platte zusammenhängen könnte. Ihr G.-C. asaretosum, Normalausbildung, enthält weniger Frischezeiger als unser G.-C. asaretosum, Trennartenfreie Variante.

Im AG fehlende oder stärker zurücktretende submontane Arten, wie Galium odoratum, Melica uniflora, Rosa arvensis, Fagus sylvatica, Quercus petraea, vereinzelt Prenanthes purpurea zeichnen das G.-C. lathyretosum verni von WELSS (1985) aus, dessen Primula elatior-Variante, von Gipskeuperböden im höher gelegenen nördlichen Steigerwald stammend, ansonsten gut mit unserem G.-C. asaretosum, Trennartenfreie und Stachy sylvatica-Ausbildung übereinstimmt. Etwas weniger stet sind diese Subatlantiker auch schon in den Tabellen von HOFMANN (1964/65) vorhanden. Schließlich bestehen auch Beziehungen zum G.-C., Ausbildung frischer Muschelkalkböden von PHILIPPI (1983) aus dem Taubertal.

Die hohen Stetigkeiten von Rotbuche, Traubeneiche, Melica uniflora, Galium odoratum, Rosa arvensis, z.T. auch Potentilla sterilis in den Aufnahmen von HOFMANN, PHILIPPI und WELSS, spiegeln die gemäßigteren klimatischen Bedingungen von Fränkischer Platte, Taubertal und Steigerwald gegenüber dem Schweinfurter Becken wieder.

In den das AG umgebenden Landschaften scheinen dem <u>Galio-Carpinetum typicum</u> vergleichbare Gesellschaften selten zu sein. Am ehesten läßt sich das nicht ganz einheitliche <u>Galio-Carpinetum typicum</u> vom WELSS (1985) anführen, während der <u>Milium-Typ</u> von MEUSEL (1935) nur teilweise vergleichbar ist.

Groß dagegen ist die Verbreitung von Gesellschaften mit Beziehungen zu unserem Galio-Carpinetum, SA-Gruppe von Luzula luzuloides. Wieder sind hier die Aufnahmen von MEUSEL (Luzula nemorosa-Typ) aus dem Grabfeld und dem nördlichen Frankenjura besonder gut vergleichbar. Ein Teil seiner Gesellschaft besitzt mit Wechselfeuchtezeigern, wie Serratula tinctoria, Stachys officinalis, Potentilla alba, Dianthus superbus u.a., enge Beziehungen zu unserem G.-C. potentilletosum albae. Unserem G.-C. luzuletosum näher verwandt sind außerdem das G.-C., Ausbildung auf Böden mit schwächerer mineralischer Nährstoffversorgung, von ZEIDLER und STRAUB (1959) aus dem Kitzinger Becken, deren Tilio-Quercetum sich unserer Poten-tilla alba-SA nähert, das G.-C. luzuletosum von HOFMANN (1964/65: Fränkische Platte) mit viel Buche (Ersatzgesellschaft des Luzulo-Fagetum milietosum?) und ULLMANN (1977), während das G.-C. Ausbildung von trockenen Buntsandsteinhängen von PHILIPPI (1983) aus dem Taubertal basenreichere Standeinnimmt. Größer sind die Übereinstimmungen wieder mit dem G.-C. luzuletosum von WELSS (1985) aus dem Steigerwald, in dem Galium odoratum, Lamium galeobdolon und Melica uniflora auf etwas besser asenversorgte Standorte hindeuten.

Der "Fingerkraut-Eichenmischwald", den HOFMANN (1964/65) von der östlichen (=kontinentaleren) Fränkischen Platte beschreibt, weist Beziehungen zu unserem G.-C. potentilletosum albae auf.

2.1.1.2. <u>Alno-Vlmion</u> Br.-Bl. et Tx. 43, Auenwälder

Auf ganzjährig frisch-feuchten, häufig kolluvial oder alluvial aufgedüngten Böden stocken in großen Teilen Europas artenreiche Laubmischwälder, in denen anspruchsvolle, hygrophile Pflanzen vorherrschen. Im AG dominieren Erle, Esche, Stieleiche, Flatterulme und Traubenkirsche in der Baumschicht. Bis auf die Stieleiche besitzen die genannten Baumarten ihre leistungsfähigsten Wuchsorte im Alno-Ulmion des AG. In Strauch- und Krautschicht überwiegen Arten mit hohen Ansprüchen an Wasser- und Nährstoffversorgung.

Die ursprüngliche Zonierung begann in der Maintalaue mit flußufernahen, im häufigen Überflutungsbereich siedelnden Schmalblattweidengesellschaften (Salicetum triandrae Malc. 29, Salicetum albae Issl. 26), auf unreifen Schwemmböden, die in Resten am Rand von Altmainen erhalten sind (siehe 2.3!). Die überwiegende Fläche der Aue nahm aber der Hartholzauenwald ein, das Querco-Ulmetum Issl. 26, der nur noch episodisch überschwemmt wurde und auf Allochthoner Vega stockt.

Die reichen Auenböden liegen nach ihrer Entwässerung heute fast gänzlich unter Ackernutzung. Überflutungen kommen nach Auskunft von Anwohnern kaum noch vor (in den letzten 10 Jahren einmal!). Restwälder sind selten, doch besitzt das Schweinfurter Becken in "Elmuß" und "Garstädter Holz" zwei Hartholzauenwaldreste von mitteleuropäischer Bedeutung (vgl. STÜRZENBERGER 1981).

Die heutige potentielle natürliche Vegetation in der Maintalaue dürfte neben kleineren Flächen mit Silberweiden-, Hartholzauen-, und Erlen-Eschenwald (*Pruno-Fraxinetum*) das Stellario-Carpinetum darstellen, wie Bodenprofil und Vegetationentwicklung andeuten.

Als weitere im AG vorhandene Alno-Ulmion-Gesellschaft ist das <u>Pruno-Fraxinetum</u> anzuführen. Seine grundwassernahen Standorte in den Auen kleiner Bäche wurden und werden nur selten überschwemmt. Sein "nasser Flügel" vermittelt floristisch wie standörtlich zu den Bruchwaldgesellschaften des Alnion glutinosae.

Ursprünglich mit Tilio-Acerion Klika 55 und dem Carpinion Issl. 31 em. Oberd. 53 im Fraxino-Carpinion Tx. et Diemont 36 vereinigt, werden seit OBERDORFER (1953) Alno-Ulmion und Carpinion unterschieden. Beiden Verbänden stellt der Autor das Fagion sylvaticae Pawl. 28 gegenüber, mit dem zusammen sie die Ordnung der (anspruchsvolleren) Laubmischwälder, die Fagetalia sylvaticae Pawl. 28 bilden.

Ähnlich wie bei MÜLLER und GÖRS (1958) beschrieben, ist der Verband vorwiegend negativ durch den Ausfall der Carpinion-Elemente gekennzeichnet. Carpinus betulus, Tilia cordata, Stellaria holostea, Dactylis polygama, Galium sylvaticum fehlen oder sind auf bestimmte, weniger feuchte Ausbildungen beschränkt.

2.1.1.2.1. **Querco-Ulmetum** Issl. 26, Hartholzauenwald, (Tab. 4, Aufn. 1-20)

Verbreitung im AG

Neben den von STÜRZENBERGER (1981) untersuchten größeren Beständen "Elmuß" und "Garstädter Holz" findet sich der Hartholzauenwald ausschließlich in kleinen Restwäldchen ("Auenrestgehölze") im Bereich der Maintalaue, wo er Altmaine umgibt. Die Zonierung beginnt hier mit dem Querco-Ulmetum und endet über einen schmalen Gürtel mit dem Pruno-Fraxinetum bei Resten des Salicetum albae (vgl. Abb. 9!) im Muldentiefsten.

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

Esche, Stieleiche, untergeordnet Flatterulme und Erle bilden das obere Baumstockwerk, unter dem sich die Stockausschläge von Traubenkirsche, Esche, Flatterulme, seltener Erle und Feldulme (vor dem "Ulmensterben häufiger!) in den unteren Stammraum teilen. Alle Bestände wurden bis in die Zeit nach dem II. Weltkrieg als Mittelwälder genutzt, was die heute noch gut zu erkennende Zweischichtigkeit erklärt. Teilweise beherrschen eingebrachte Hybridpappeln (Kreuzungen zwischen Populus nigra und nordamerikanischen Pappeln) die Baumschicht. Bis auf die Ulmen besitzen die Überhälter der BI gute bis sehr gute Schaftformen, das weitringige Holz der schnellwüchsigen "Wassereichen" erreicht freilich keine Furnierqualität. Die Traubenkirsche zeigt öfters zusammengebrochene Stockausschläge, wohl eine Folge von Grundwasserabsenkung und hohem Alter der Stöcke, die ja heute nicht mehr in der früheren Weise genutzt werden.

Die nicht voll geschlossene Bestandesstruktur und die hervorragende Basen- und Nährstoffversorgung der Böden dokumentieren sich in einer üppig entwickelten, artenreichen Strauchschicht aus Schwarzem Holunder, Hasel, Pfaffenhütchen, Blutrotem Hartriegel, untergeordnet Hopfen, Echtem Kreuzdorn, Schlehe und dem (vom Rehwild übrig gelassenen) Nachwuchs von Traubenkirche, Esche, seltener Feldahorn.

Die im Sommer nicht voll deckende Krautschicht besteht fast nur aus anspruchsvollen, hygrophilen Vertretern. Im Frühling schmückt ein geschlossener Teppich aus Lerchensporn, Bärlauch und zahlreichen weiteren Geophyten den Waldboden, während im Sommer Hochstauden, im Spätsommer und Herbst dann die insgesamt gegenüber den frühjahrsfeuchten Ausbildungen des Carpinion doch auffällig zurücktretenden Gräser zusammen mit den beiden Taubnesselarten dominieren (zur Phänologie der Gesellschaft vgl. STÜRZENBERGER 1981!).

Floristische Zusammensetzung der Krautschicht

Neben einigen Kennarten des Alno-Ulmion, wie Stachys sylvatica, Gagea lutea, seltener Festuca gigantea, Eurhynchium swartzii, Impatiens noli-tangere und Circaea lutetiana, zählen anspruchsvolle Frühjahrsgeophyten, wie Corydalis cava, C. solida, Allium ursinum, Adoxa moschatellina, Ficaria verna, Scilla bifolia, Anemone ranunculoides, Arum maculatum, vor allem aber auch hygrophile Nitrophyten, wie Lamium maculatum, Galium aparine, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Veronica h. lucorum, Geum urbanum, Geranium robertianum, Elymus caninus, Glechoma hederacea, Rubus caesius, Viola odorata, Chaerophyllum bulbosum, Alliaria petiolata, Heracleum sphondylium u.a., zur charakteristischen Artengruppenkombination. Die zuletzt genannte Artengruppe greift zwar mit etwas geringerer Stetig-

keit und Deckungsgrad auch auf die bodenfrischen Ausbildungen der Eichen-Hainbuchenwälder über, besitzt hier aber ihr absolutes Optimum, was an Vitalität und Artmächtigkeit deutlich erkennbar ist.

Auch in der Urlandschaft dürften diese durch die lichten Verhältnisse in den kleinen Restwäldchen geförderten stickstoff-liebenden Vertreter hier einen Verbreitungsschwerpunkt besessen haben, denn gerade in der Aue mit ihrer besonderen Wasserdynamik dürften durch Hochwässer immer wieder kleinräumige Auflichtungen entstanden sein.

Außer einigen frischebedürftigen Arten, wie Lamium g.montanum, Pulmonaria obscura, Brachypodium sylvaticum und Eurhynchium striatum sind weitere Fagetalia-Arten selten oder auf die im folgenden beschriebene Stellaria holostea-Ausbildung beschränkt.

Gegenüber dem verwandten Pruno-Fraxinetum, Trennartenfreie und Allium ursinum-Ausbildung, treten die Feuchtezeiger zurück. Die Annäherung an die mesophileren Verhältnisse des Carpinion ist unverkennbar.

Untereinheiten

Die Gesellschaft zeichnet sich durch große floristische Gleichförmigkeit aus. Auerandnahe Bestände enthalten allerdings Elemente der benachbarten Carpinion-Gesellschaften, wie Winterlinde, Weißdorn, Stellaria holostea, Hedera helix, Anemone nemorosa, Asarum europaeum, Primula elatior u.a., die nicht überflutungsresistent sind (ZEIDLER mdl.). Ob für das Zustandekommen dieser zum Stellario-Carpinetum überleitenden Stellaria holostea-Ausbildung standörtliche Gründe verantwort lich sind, läßt sich schwer entscheiden, das Bodenprofil gibt jedenfalls keine Antwort. Möglicherweise war die Zeit, die seit der letzten großen Grundwasserabsenkung verstrichen ist (zuletzt wurden Mitte der 70 er Jahre im Zuge der Flurbereinigung und des Ausbaus der Staustufen Garstadt und Wipfeld umfangreiche Entwässerungsmaßnamen vorgenommen, vgl. SCHWARZ-MEIER 1981), zu kurz, um den jetzt konkurrenzfähigen Carpinion-Elementen eine Einwanderung in die z.T. durch kilometerbreite Ackerflächen getrennten Restgehölze zu ermöglichen.

Standorte

Das Querco-Vlmetum findet sich im AG ausnahmslos auf Allochthoner Vega (Profil 9!). Gleymerkmale im Unterboden dürften Relikte aus Perioden mit höherem Grundwasserstand oder Pseudovergleyungserscheinungen darstellen. Das Bodenausgangsmaterial – die Auenschluffe und -lehme – wurden nach SCHWARZMEIER (1981) größtenteils erst nach den frühnistorischen und vor allem frühmittelalterlichen Rodungsperioden in das Maintal gespült, wo sie auf sandigen Schottern liegen.


Vor Grundwasserabsenkung und Mainregulierung sorgten episodische Überschwemmungen für einen andauernden Nährstoffnachschub. Das feucht-warme Lokalklima der großen Flußtäler, das auch für den Reichtum der Auenwälder an Lianen verantwortlich ist, bedingt zusammen mit der optimalen Bodenfeuchte eine hervorragende Mineralisation durch die rege Bodenlebewelt sowie eine günstige Bodenstruktur. Auenwälder zählen zu den

Profil 9: Auenrestgehölz; Mittelwald; 204 m NN; Auenlage des Mains Querco-Ulmetum

Vega aus Auenschluffen

+2 cm		Humusform: L-Mull
0-7 cm	A h	braunschwarzer, humoser, toniger Schluff; gut durchwurzelt; Krümel-/Wurmlosungsgefüge;
7-15 cm 1	h ^M	schwarzbrauner, humoser, toniger Schluff; gut durchwurzelt; Krümelgefüge
15-35 cm 1	1	rötlichbrauner, ganz schwach humoser, toni- ger Schluff; gut durchwurzelt; Polyeder-/ Subpolyedergefüge
35-85 cm f G	oM	dunkelbrauner, toniger Schluff; mittel durch- wurzelt; Subpolyedergefüge; einzelne Konkre- tionen

	Korngrößenzu- sammensetzung		Humus halt	Humusge- halt			Sorptions- verhältnisse		
	S%	U%	Т%	C%	C/N	pН	T mv	S	V%
Ah Mh M fG _o m	9 8 5 5	64 65 67 63	27 27 28 32	10.2 4.7 n.b. n.b.	13 16 n.b. n.b.	6.05 6.08 6.02 6,26	20.7 20.1 18.3 21.4	16.5 16.3 17.2 20.9	80.0 79.9 94.0 97.6



produktionskräftigsten Waldgesellschaften Mitteleuropas, was ihren Reichtum an nitrophilen Arten in Strauch- und Krautschicht erklärt.

Literaturvergleich

STÜRZENBERGER (1981) hat in seiner vegetationskundlichen Analyse der im AG gelegenen Hartholzauenwaldreste "Elmuß" und "Garstädter Holz" auch einen umfassenden Gesellschaftsvergleich mit den entsprechenden Gebietsausbildungen anderer Autoren gegeben, auf den hier verwiesen sei (Stetigkeitstabelle!).

Unserer Trennartenfreien Ausbildung entspricht sein Q.-U. typicum, typische und (nur durch höher Dominanz des Bärlauchs unterschiedene) Allium ursinum-Variante, während sein Q.-U. carpinetosum unserer Stellaria holostea-Ausbildung weitgehend gleicht. Eine seinem Q.-U. alnetosum vergleichbare Ausbildung des Hartholzauenwaldes wurde nicht gefunden, alle angetroffenen erlenreichen Bestände gehören bereit zum Pruno-Fraxine-tum.

Der oben genannte Gesellschaftsvergleich zeigt sehr schön die vermittelnde Stellung unserer Gesellschaft zwischen mehr subatlantischen und mehr subkontinentalen Gebietsausbildungen des Querco-Ulmetum. Einerseits enthält unsere Gesellschaft subatlantische Arten, die auf den feuchten Böden natürlich besonders weit in kontinentalere Gebiete vordringen können, hier sind Arum maculatum, Allium ursinum, Primula elatior, Lamium g.montanum und Corylus avellana zu nennen, die auch in den Tabellen von WATTENDORF (1964: Münsterland), MOOR (1958: Nordschweiz), SEIBERT (1962: Isarauen bei München), TRAUTMANN und LOHMEYER (1960: Emsland) häufig sind. Andererseits weisen dort fehlende Arten mit subkontinentalem Verbreitungsschwerpunkt, wie Ulmus minor, U. laevis, Lamium maculatum, Anemone ranunculoides, Scilla bifolia, Lilium martagon, Omphalodes scorpioides (in Auenwaldsäumen) auf die Nähe zu östlichen Ausbildungsformen hin, wie sie PASSARGE (1953: Mitteldeutsches Trockengebiet), NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA (1965: Tschechisches Eger- und Elbtal), MRAZ und SIKA (1965: Polnisches Elbtal) beschrieben haben.

2.1.1.2.2. Pruno-Fraxinetum Oberd. 53, Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald, (Tab. 5, Aufn. 8-29)

Verbreitung im AG

Die verschiedenen Ausbildungsformen der Gesellschaft findet man auf grundwassernahen Standorten im Bereich der kleinen Mainzuflüsse und – seltener – in der Mainaue. Insgesamt sind die Wuchsorte bodenfeuchter als die des Querco-Ulmetum, sie werden aber nicht oder kaum einmal überschwemmt. Die nicht häufigen Fundorte liegen in der Unkenbachaue, dort, wo der Bach den Südteil des "Kapitelwaldes" durchfließt und im "Riedholz", im "Bauholz" (= östliches Anhängsel des "Kämmlingsberg"), im Marbachtal nahe dem "Kämmlingsberg", im "Schopfig" und in der "Hellelohe" als charakteristischer, schmaler Übergangsstreifen zwischen Stellario-Carpinetum und Alnion glutinosae-Gesellschaft. Kleinflächige Bestände finden sich noch in der Mainaue im Bereich von Altmainen.

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

Alle angetroffenen Bestände waren ehemals Mittelwälder, die sich jetzt in Überführung zum Hochwald befinden. In der oberen Baumschicht herrschen Esche und Erle etwa zu gleichen Teilen, manchmal scheint letztere forstlich gefördert worden zu sein. Recht häufig ist die Flatterulme einzelstamm- bis truppweise beigemischt, sie besitzt hier ihr lokales Optimum im AG. Die Stieleiche spielt im Gegensatz zum Querco-Ulmetum keine Rolle. Die Stockausschläge von Traubenkirsche, Esche, Erle, seltener Flatterulme und Feldahorn mischen sich im unteren Baumstockwerk.

Neben dem Nachwuchs von Esche und Traubenkirsche wachsen in der artenreichen Strauchschicht noch Schwarzer Holunder, Blutroter Hartriegel, Hasel (v.a. in der bodentrockeneren Ausbildung), Pfaffenhütchen, seltener Echter Schneeball. Der Hopfen rankt hoch in die Bäume hinauf, er findet hier optimale Wuchsbedingungen (Luft-/Bodenfeuchte, gute Nährstoffversorgung).

Die Krautschicht bedeckt im Sommer meistens die gesamte Bodenoberfläche. Die oft hüfthohen Bestände aus hygrophilen Stauden sind dann wegen der vielen Brennessel kaum zu durchdringen. Im Frühling überzieht das Scharbockskraut geschlossen den Boden, teilweise von anderen Geophyten begleitet. Niemals aber erreichen diese Artenreichtum und Deckungsgrad wie im Querco-Ulmetum. In der Bärlauch-Ausbildung tritt die namengebende Art aspektbestimmend auf. Das auf den tätigen Böden schnell umgesetzte, leicht abbaubare Laub von Erle und Esche erlaubt es verschiedenen Moosarten ausgedehnte Teppiche zu bilden.

Floristische Zusammensetzung der Krautschicht

Kennarten des Verbandes sind reichlich vorhanden und erreichen höhere Artmächtigkeiten als im Querco-Ulmetum: Stachys sylvatica, Impatiens noli-tangere, Circaea lutetiana, Festuca gigantea, Eurhynchium Swartzii, Gagea lutea. Grosses Springkraut, Pariser Hexenkraut und Riesenschwingel besitzen hier ihre optimalen Wuchsorte. <u>Hygrophile</u> <u>Fagetalia-Arten</u> sind ebenfalls häufig: *Ficaria verna*, <u>Eurhynchium striatum</u>, <u>Lami-</u> um g.montanum, Anemone ranunculoides, Paris quadrifolia, Primula elatior, Ranunculus auricomus agg., Pulmonaria obscura. Bemerkenswert ist das Vorkommen weiterer nicht-überflutungstoleranter Vertreter der Ordnung, wie Asarum europaeum, Brachypodium sylvaticum, Anemone nemorosa, Polygonatum multiflorum, Dactylis polygama, Milium effusum u.a., die dem Quer co-Ulmetum fehlen oder auf dessen Stellaria holostea-Ausbildung beschränkt sind. Sie deuten auf die veränderten ökologischen Bedingungen (z.B. fehlende Überschwemmung!) hin. Weiter sind für die Gesellschaft feuchtigkeitsbedürftige Nitrophyten bezeichnend, von denen hier stellvertretend Rubus caesius, Urtica dioica, Glechoma hederacea, Aegopodium podagraria, Lamium maculatum, Galium aparine, Elymus caninus und Alliaria petiolata genannt seien.

Untereinheiten

Der <u>Bodenwasserhaushalt</u> entscheidet über die weitere Gliederung.

Den im Tabellenbild und im Gelände zu erkennenden Übergang zu

Alnion glutinosae-Gesellschaften bildet die <u>Carex acutiformis-Ausbildung</u>. Nässeholde Arten, wie die Sumpfsegge, Iris pseudacorus, Calystegia sepium, Caltha palustris, Angelica sylvestris, Phalaris arundinacea, Cirsium oleraceum, Eupatorium cannabinum u.a. mischen sich den Verbandskennarten gleichwertig bei. Die Flatterulme fehlt den meisten Beständen, die Moorbirke tritt gelegenlich auf.

Etwas weniger bodennaß dürften die Wuchsorte der $\underline{\text{Trennarten}}$ freien Ausbildung sein.

In der durch kalkreiches (Seekreide!) Grundwasser beeinflußten mäßig bodenfeuchten <u>Allium ursinum-Ausbildung</u> dominiert der Bärlauch im Frühlingsaspekt, von <u>Arum maculatum</u> und dem selteneren <u>Corydalis cava</u> begleitet. Diese Untereinheit ist im AG am weitesten verbreitet, sie vermittelt floristischstandörtlich zum <u>Stellario-Carpinetum</u>, mit dem sie öfters im Kontakt steht.

Standorte

Im Gegensatz zum verwandten Querco-Ulmetum wurden und werden die Standorte der Gesellschaft kaum je überschwemmt, im Frühjahr und nach längeren Regenfällen aber öfters zeitweise überstaut. Insgesamt handelt es sich um eutrophe, mineralische, seltener organische Feucht- und Naßböden mit Feuchtmull als Humusform. Meist ist der Oberboden aber nicht so locker wie im Querco-Ulmetum, was das Zurücktreten mancher Geophyten (Scilla, Adoxa, Gagea) erklären dürfte.

Bezeichnend für alle Ausbildungen des *Pruno-Fraxinetum* im AG ist die Tatsache, daß die von ihnen eingenommenen Standorte von einer bodennasseren "Vorgängergesellschaft" mitgeschaffen wurden, die sich nach Entwässerungsmaßnahmen in eine weniger bodennasse Folgegesellschaft umwandelte.

So siedeln die Bestände der Carex acutiformis-Ausbildung teilweise auf echten, vom Erlenbruchwald (Carici elongatae-Alnetum) geschaffenen Niedermoortorfen, wie beispielsweise im "Riedholz" zu beobachten ist. Häufiger trifft man sie auf (mit den Niedermooren gleitend verbundenen) Anmoorgleyen an. Durch Entwässerung entstehen aus letzteren Tschernitzen (Profil 10!), die bei stärkerer Durchtränkung mit kalk- und basenreichem Grundwasser von der Allium ursinum-Ausbildung besiedelt werden. Zahlreiche, aber kümmernde Erlen im benachbarten Stellario-Carpinetum allietosum deuten die Gesellschaftsdynamik bei weiterer Grundwasserabsenkung an. Die vermittelnde Trennartenfreie Ausbildung wurde im AG auf Typischen und Humusgleyen angetroffen, die sich in Auenschluffen des Maintals entwickelt haben.

Literaturvergleich

Die relativ wenigen (21) Aufnahmen lassen nur mit Vorsicht Vergleiche mit Beschreibungen des Traubenkirschen-Erlen-Eschenwaldes aus anderen Gebieten zu.

Die klimatische Übergangsstellung zeigt sich wieder sehr deutlich in der floristischen Zusammensetzung der Gesellschaft. Die in den Aufnahmen von OBERDORFER (1957: Oberrheinebene, P.-F. typicum, P.-F. caricetosum remotae) häufigen


Profil 10: Kapitelwald; Mittelwald; 208 m NN; Auenlage
Pruno-Fraxinetum, Allium ursinum-Ausbildung

Tschernitza aus anmoorigem Talfüllungsmaterial über Seekreide

+2	cm		Humusform: L-Mull
0-10	cm	A _h	schwarzer, humoser, lehmiger Schluff; kalk-haltig; gut durchwurzelt; Wurmlosungs-/Krümelgefüge
10-40	cm	G _o A _h	schwarzer, orange marmorierter, humoser schluffiger Ton; kalkhaltig; gut durchwur- zelt; Krümelgefüge;
40-75	cm	A _h G _o	schwarzer, stark orange marmorierter, humo- ser schluffiger Ton; kalkhaltig; mittel durchwurzelt; Subpolyedergefüge

75-100 cm $\mathbf{IIG_{or}IC_{c}}$ cremefarbige Seekreide; stark kalkhaltig (Schneckengehäuse !); gering durchwurzelt

	Korngrößenzu- sammensetzung		Humusge- halt		pH- Wert		Sorptions- verhältnisse		
	S%	U%	Т%	C%	C/N	рН	T	s	V%
A _h	14	78	8	15.9	13	7.25	mv: 35.4	33.0	93.0
$\mathbf{G_oA_h}$	15	37	48	9.6	17	7.53	35.7	34.1	95.5
$\mathbf{A_h}^{\mathbf{G}}_{\mathbf{O}}$	14	53	33	8.7	18	7.65	31.1	31.1	99.9
G _{or} 1C _c	11	65	24	n.b.	n.b.	7.89	22.1	22.0	99.9



subatlantischen Arten Lonicera periclymenum, Hedera helix, Rosa arvensis, Oxalis acetosella, Luzula pilosa und Veronica montana fehlen dem AG bis auf Arum maculatum und Allium ursinum, während hier Arten mit subkontinentalem Verbreitungsschwerpunkt, wie Asarum europaeum, Corydalis cava, Anemoneranunculoides und Aegopodium podagraria häufig sind.

Vergleichbar sind insbesondere Beschreibungen aus der DDR und der Tschechoslowakei. So stimmt unsere <u>Carex acutiformis-Ausbildung</u> recht gut mit dem <u>Aegopodio-Filipendulo-Fraxinetum</u> bei PASSARGE und HOFMANN (1968: Nordostdeutsches Flachland), mit dem <u>P.-F. filipenduletosum</u> von NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA (1979: Tschechei) und dem <u>P.-F. caricetosum acutiformis</u> bei MARSTALLER (1976: Thüringen) überein. Unserer <u>Trennartenfreie Ausbildung</u> verwandt sind das <u>Aegopodio-Milio-Fraxinetum</u> bei <u>PASSARGE</u> und HOFMANN, das <u>P.-F. typicum</u> von NEUHÄUSLOVA-NO-VOTNA und das <u>P.-F. typicum</u>, Typische Variante, <u>Sambucus nigra-Subvariante</u> von MARSTALLER. Schließlich findet unsere verbreitete <u>Allium ursinum-Ausbildung</u> ihre Entsprechung im <u>Corydalido-Milio-Fraxinetum</u> (ohne <u>Allium!</u>) bei PASSARGE und HOFMANN, im <u>P.-F. typicum</u>, Arum maculatum-Variante, <u>Sambucus nigra-Subvariante</u> (ohne <u>Allium!</u>) von MARSTALLER und im etwas armere Standorte einnehmenden <u>P.-F. listeretosum</u> von NEU-HÄUSLOVA-NOVOTNA.

Aus dem Muschelkalkgebieten des Kraichgaus und des Taubertals beschreibt PHILIPPI (1982,1983) verschiedene Ausbildungen eines Alno-Fraxinetum Oberd. 49, in dem die Traubenkirsche keine Rolle spielt. Überhaupt bestreitet der Autor eine stärkere Beteiligung von Prunus padus an den Erlen-Eschenwäldern seines Arbeitgebietes, eine Aufassung, die BOHN (mdl.) nach seiner Erfahrung nicht bestätigen kann. Im Alno-Fraxinetum von PHILIPPI, das insgesamt ärmer an Verbandskennarten ist, kommen Carex acutiformis und Allium ursinum teilweise zusammen vor, während sie sich im AG ausschließen.

Beziehungen zu unserer Allium ursinum-Ausbildung bestehen beim P.-F. allietosum ursini, das WELSS (1985) aus dem nördlichen Steigerwald beschreibt, während das Milio-Fraxinetum von ULLMANN (1977), am ehesten unserem P.-F., Trennartenfreie Ausbildung vergleichbar, nach seiner Artenkombination insgesamt weniger (sommer)feuchte Standorte besiedeln dürfte (Zurücktreten feuchtigkeitsliebender, Zunahme mesophiler Vertreter).

Die Bestände aus den niederschlagsreicheren Landschaften Kraichgau und Nordsteigerwald deuten mit den subatlantischsubmontanen Arten Galium odoratum, Fagus sylvatica, Oxalis
acetosella, (Melica uniflora, Dentaria bulbifera), die insgesamt klimatisch gemäßigteren Bedingungen gegenüber dem Schweinfurter Becken an.

2.1.2. **Quercetalia robori-petraeae** Br.-Bl. 32, Eichen-Birkenwälder

2.1.2.1. Quercion robori-petraeae Br.-Bl. 32

Der Verbreitungsschwerpunkt der Artenarmen Eichen-Birkenwälder liegt im west- und mitteleuropäischen Flachland mit seinen durch das atlantische Klima ausgelaugten pleistozänen Sandböden sowie im submontanen Höhenbereich der Mittelgebirge auf armem Untergrund. Die innerhalb des Verbandes unterschiedenen Gesellschaften , nach OBERDORFER (1983) Querco roboris-Betuletum Tx. 37, Luzulo-Quercetum petraeae Knapp 48 em. Oberd. 50 Violo-Querceium Oberd. 57 (=Fago-Quercetum Tx. 55 p.p), Pino-Quercetum petraeae (Hartm. 34) Reinh. 39, sind floristisch und standörtlich nahe miteinander verwandt (WILMANNS 1978). Die oben gewählte Reihenfolge ergibt sich aus einer Nordwest-Südost-(Rassen-)Differenzierung, die sich in einer Abnahme von subatlantischen Arten, wie Lonicera periclymenum, Teucrium scorodonia, Polypodium vulgare, Corydalis claviculata, Hypericum pulchrum, Ilex aquifolium, Sarothamnus scoparius, Holcus mollis, Lathyrus linifolius, Galium saxatile und andererseits in einer Zunahme subkontinentaler Arten, wie Pinus sylvestris, Genista germanica, Cytisus nigricans, Vaccirinus sylvestris, Genista germanica, Cytisus nigricans, Vaccinium vitis-idaea nach Südosten hin äußert (vgl. PASSARGE und HOFMANN 1968, NEUHÄUSL und NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA 1967). Allerdings ist bei solchen, der Änderung des Großklimas zugeschriebenen Abwandlungen in der Artenkombination innerhalb einer Gesellschaft (---> Rassenbildung!) wohl immer zu bedenken. daß kontinentales Klima auf vergleichbarem Bodenausgangssubstrat weniger Basenauswaschung bedingt und so zu besseren Böden führt.

Innerhalb des AG finden sich Gesellschaften dieser 1932 von BRAUN-BLANQUET aufgestellten Ordnung nur kleinflächig und lokal. Sie sind überwiegend negativ durch das Fehlen von Fagetalia-Kennarten gekennzeichnet. Um Kontinuität mit der bestehenden Literatur zu gewährleisten, wurden die Bestände hier in Anlehnung an ULLMANN (1977) und ZEIDLER (1982,1984) zum Luzulo-Quercetum petraeae gestellt und nicht zum Violo-Quercetum, einer Gesellschaft, die aufgrund der Diagnose in der Erstbeschreibung von OBERDORFER (1957) ein Stieleichen-Wald ist, was auch für die entsprechenden Bestände des AG zutrifft (vgl. hierzu WELSS 1985!).

2.1.2.1.1. Luzulo-Quercetum petraeae Knapp 48 em. Oberd. 50

 Luzulo-Quercetum molinietosum arundinaceae, Pfeifengras-Stieleichenwald, (Tab. 3, Auf. 51-59)

Verbreitung im AG

Die Gesellschaft besiedelt flache Unterhanglagen und Mulden mit grund-, seltener stauwasserbeeinflußten Böden im Bereich der pleistozänen Terrassensedimente und des Oberen Sandsteins. Ein größerer Bestand findet sich am Nordostrand des "Kammerholz", kleinflächige Wuchsorte bestehen noch im "Gehäu" und im "Elsenholz". Alle Standorte der Gesellschaft dürften erst durch menschliche Degradation (Streurechen, Waldweide, Futtergewinnung) so basenarm geworden sein. Die auf ihnen stokkenden Bestände müssen als Degradationsstadien von Carpinion-

Gesellschaften wechselfeuchter, mesotropher Böden angesehen werden

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

In der Baumschicht herrscht die Stieleiche, selten von (eingebrachter?) Traubeneiche begleitet. Im niedrigeren Baumstockwerk bildet die Moorbirke ausgedehnte Bestände, manchmal sind noch Winterlinde und Vogelbeere einzelstammweise beigemischt. Die tief ansetzenden Grobäste der Eichen beweisen, daß die Bäume in ihrer Jugend frei aufgewachsen sind. Die Moorbirke scheint nach Auskunft von Anwohnern erst nach Aufgabe der Streunutzung zwischen den Kriegen aufgekommen zu sein.

Außer dem Faulbaum, der hier sein lokales Optimum besitzt, und wenig geringwüchsiger Hasel fehlen weitere Straucharten.

In der Krautschicht dominiert das Pfeifengras im Sommer und Herbst. Nur wenige Blüten von Buschwindröschen und Großer Sternmiere bereichern das Frühlingsbild der Gesellschaft.

Floristische Zusammensetzung der Krautschicht

Die parkartige Waldstruktur, das Zurücktreten anspruchsvollerer Arten und die Dominanz des Wechselfeuchtezeigers Molinia arundinacea verbinden alle Ausbildungen. Ansonsten variiert die Artenzusammensetzung innerhalb der Krautschicht deutlich, ein Hinweis auf die Entstehung der Gesellschaft aus verschiedenen Ausgangsbeständen. Carpinion- und Fagetalia-Arten, wie Tilia cordata, Stellaria holostea, Milium effusum, Eurhynchium striatum, Scrophularia nodosa und Dactylis polygama erreichen zwar keine hohen Artmächtigkeiten, dürften aber dort, wo sie vorkommen, als Relikte der Ausgangsgesellschaften angesehen werden. Ansonsten trifft man vereinzelt weniger basenbedürftige, deswegen weit verbreitete Querco-Fagetea-Arten an, wie Anemone nemorosa, Convallaria majalis und Festuca heterophylla sowie als weiteren Wechselfeuchtezeiger Melica picta.

Weit häufiger sind <u>Basenarmutszeiger</u> zu finden: *Deschampsia* flexuosa, *Polytrichum formosum*, *Luzula luzuloides*, *Melampyrum* pratense, *Hieracium sabaudum*, *Leucobryum glaucum*, *Dryopteris* carthusiana sind hier zu nennen.

Untereinheiten

Die Artenzusammensetzung innerhalb der Gesellschaft variiert stark. Üppige Herden der im AG nur hier vorkommenden, seltenen Heidelbeere zeichnen die <u>Vaccinium myrtillus-Ausbildung</u> aus. Große Torfmoospolster sind für die <u>Sphagnum palustre-Ausbildung</u> bezeichnend, die in einer <u>Trennartenfreien</u>, einer <u>Carex brizoides-</u> und in einer <u>Agrostis</u> <u>canina-Unterausbildung</u> (mit <u>Lysimachia vulgaris</u>, <u>Calamagrostis canescens</u>, <u>Galium palustre</u> und <u>Juncus effusus</u>) auftritt. Ausgedehnte Herden der Seegrassegge kennzeichnen die <u>Carex brizoides-Ausbildung</u>, während der <u>Trennartenfreien</u> <u>Ausbildung</u> weitere differenzierende Arten fehlen.


Profil 11: Kammerholz; lichter Eichenwald; 215 m NN; Unterhang-Mulde Luzulo-Quercetum molinietosum, Vaccinium myrtillus-Ausbildung

+8 cm Humusform: Rohhumus $0-10 \, cm$ $\mathbf{A}_{\mathbf{he}}$ schwarzer, schwach gebleichter, humoser, schwach schluffiger Sand; gut durchwurzelt; Einzelkorngefüge ?fG_oB_{hs} hellbrauner, violettstichiger, schwach kie-10-25 cm siger, schwach humoser, schwach schluffiger Sand; gut durchwurzelt ; Einzelkorngefüge 25-80 cm PfG, graubrauner, naßgebleichter, schwach kiesiger Sand; mittel durchwurzelt; Einzelkorngefüge 80-95 cm IIGor grünlicher, marmorierter, schwach kiesiger, lehmiger Sand; gering durchwurzelt; Kohä-

Analyseergebnisse:

	Korngrößenzu- sammensetzung			Humusge- gehalt		pH- Wert	Sorptions- verhältnisse		
	S%	U%	T%	C%	C/N	pН	T	ន	V%
							mv	al	
Aha	84	12	4	4.5	29	3.18	15.4	0.2	1.3
?fGoB _{hs}	94	6	-	1.7	26	3.55	6.1	0.1	1.6
?fG ™	76	24	-	n.b.	n.b.	4.16	8.5	0.2	2.4
Gor	86	7	7	n.b.	n.b.	4.58	13.5	0.6	4.4

rentgefüge



Standorte

Gemeinsam ist allen Wuchsorten der Gesellschaft Lichtreichtum, Wechselfeuchtigkeit und Basenarmut des (Ober-)Bodens. Bodentypologisch handelt es sich um Podsol-Gleye (siehe Profil 11!), die sich im Bereich basenärmerer Terrassensedimente unter dem Einfluß von stark schwankendem, sauerstoffarmen (H_2S -Geruch!) Grundwasser (Frühjahr 20-30, Herbst > 120 cm unter GOF) gebildet haben. Daneben finden sich Bestände auf podsoligen bis Podsol-Pseudogleyen, die sich in staufeuchten Mulden im Bereich des Oberen Sandsteins gebildet haben.

Zusammenfassend kann das Luzulo-Quercetum molinietosum des AG als eine floristisch-standörtlich inhomogene, durch Streuentnahme, Waldweide und Futtergewinnung "herabgewirtschaftete" Ersatzgesellschaft von Eichen-Hainbuchenwäldern basenärmerer, wechselfeuchter Böden bezeichnet werden.

Luzulo-Quercetum typicum, Schafschwingel-Stieleichenwald, (Tab. 3, Aufn. 60)

In ihrer Arbeit über kiefernhaltige Waldgesellschaften im Mittelmaingebiet erwähnen ZEIDLER und STRAUB (1967) aus dem Schweinfurter Becken das nicht seltene Auftreten zweier Ausbildungen eines bodentrockenen Eichen-Birkenwaldes (Quercetum medioeuropaeum, Q. peucedanetosum), in der die Kiefer ein natürliches Glied der Baumschicht darstellt. Sie geben als Fundpunkte "Kammerholz", "Kapitelwald" und "Spitalholz" an. Hier liegt überall eine teilweise zu Dünen aufgewehte Flugsanddecke über Terrassensanden. Nachsuche mit Herrn Prof. Zeidler ergab keinen Hinweis auf die Existenz dieser Gesellschaften. An den Orten der vor 20 Jahren angefertigten Aufnahmen fanden sich nur laubholzunterpflanzte Kiefernalthölzer mit üppigem Unterwuchs aus Nitrophyten, wie Himbeere, Brombeere u.a. (siehe 2.1.3!). Solche Bestände überkleiden sogar die Köpfe höherer Dünen.

Nur an einer einzigen Stelle ließ sich noch ein bodentrockener Eichen-Birkenwald nachweisen. Die Belegaufnahme stammt von dem gegen Südwesten gerichteten steileren (7°) Mittelhang einer 7m hohen Düne. Hier dürfte es für die erwähnten Nitrophyten zu trocken sein. Die lichte Baumschicht besteht aus schlechtwüchsiger Stieleiche – sie erreicht kaum 15m Höhe – und einem krüppeligen Exemplar der Winterlinde. Sträucher fehlen. In der Krautschicht dominieren anspruchslose, trockenheitsertragende Gräser und Moose, wie Deschampsia flexuosa, Pleurozium schreberi, Polytrichum formosum, Festuca ovina, Festuca heterophylla und, als beinahe einziges Kraut, Melampyrum pratense.

Der Bestand stockt auf einer gering entwickelten $\underline{Podsol-Braun-erde}$ mit Rohhumusartigem Moder als Humusform.

Literaturvergleich (Luzulo-Quercetum)

Der Sekundär- bzw. Reliktcharakter des Luzulo-Quercetum des AG und die wenigen zur Verfügung stehenden Aufnahmen erschweren einen Vergleich mit naturnahen Ausbildungen anderer Gebiete. Der Ausfall der oben angeführten subatlantischen Arten bis auf die seltene Lathyrus linifolius deutet bei gleichzeitigem Fehlen der Trennarten subkontinentaler Eichen-Birkenwälder die

Clematido-Quercetum

Aufnahme Nr. 255; lichter TrEi-Elsb-Bestand mit viel Weißdorn im Unterstand; Überführungswald; Ober-Mittelhang:10-15°SW; Untere Myophorienschichten unterhalb der Bleiglanzbank; Pelosol-Ranker: Tu: F-Mull; Deckungsgrade: BII:75%, S:35%, K:50%

sol-Ranker; Tu; F-Mull;	Deckungs	grade: BII:75%	, S:35%,	Κ:
Baumschicht:				
Quercus petraea	3 1	Sorbus tormina.	lis	3
Carpinus betulus	1	Acer campestre		2
Tilia cordata	2	Sorbus domesti	CA	1
	-		-	٠
Strauchschicht:				
Crataegus cf monogyna	2	Tilia cordata		1
Acer campestre	1	Rosa spec.		1
•		•		
Gehölzverjüngung:				
Sorbus torminalis	1	Carpinus betul	us	+
Prunus avium	+	Sorbus tormina.	lis	+
Crataegus spec.	+	Quercus petrae.	a	+
Acer campestre	+	Fraxinus excel.		+
Daphne mezereum	+	Prunus spinosa		+
Cornus sanguinea	r	Sorbus domesti		r
Coinus Sanguinea	•	Borbus domestr	Ca	-
Krautschicht:				
Thermophile Arten:				
Dictamnus albus	2	Clematis recta		+
Campanula rapunculoides	:2	Anthericum ram	osum	2
Vincetoxicum hirund.	2	Campanula pers.	icifolia	1
Chrysanthemum corymb.	1	Lathyrus niger		1
Carex montana	1	Silene nutans		+
Peucedanum officinale	+	Primula veris		+
Peucedanum cervaria	r	IIIMUIA VCIID		
Teacedanum cervaria	•			
Wechselfeuchtezeiger:	,			
Serratula tinctoria	1	Rosa gallica		1
Calamagrostis arundin.	1	Stachys offici.	nalis	+
Molinia arundinacea	+	Inula salicina		+
northia arandinacea	•	India Dalicina		·
Arten des Carpinion:				
Stellaria holostea	1	Galium sylvati	cum	1
Dactylis polygama	1			
Arten der Querco-Fagete	ea:			
Convallaria majalis	2	Anemone nemoro	sa	1
Asarum europaeum	1	Hepatica nobil		1
Polygonatum multifl.	1	Mercurialis pe		1
Lathyrus vernus	+	Brachypodium s		
Lathyrus wernus Lathyrus montanus				+
Hedera helix	+ r	Hieracium cf g		r
Hedela Hellx	T	Lilium martago	**	Τ.
Sonstige Arten:				
Moehringia trinervia	1	Lapsana commun	ís	1
Hieracium sylvaticum	1	Vicia sepium		+
Taraxacum officinalis	+	Fragaria vesca		+
Solidago virgaurea	r			
	-			

klimatische Übergangsstellung des AG an. Das vereinzelte Vorkommen von Tilia cordata, die Häufigkeit von Quercus robur in der Baumschicht, das Erscheinen von Genista germanica in angrenzenden Saumgesellschaften sowie die Tatsache, daß die in westlichen Ausbildungen der Gesellschaft dominierende subatlantische Molinia coerulea durch die subkontinentale Molinia arundinacea ersetzt wird, könnte als Annäherung an östliche Gebietsausbildungen gewertet werden.

Dem <u>Luzulo-Quercetum molinietosum</u> des AG vergleichbare Gesellschaften erwähnen unter demselben Nahmen aus dem Steigerwald und seinem Vorland ZEIDLER und STRAUB (1959), ZEIDLER, LEIPPERT, STRAUB (1969) und ZEIDLER (1982,1984). Aus seinem Arbeitsgebiet, Windsheimer Bucht und Anstieg der Frankenhöhe, liegen Aufnahmen von SCHMALE (1984) vor, dessen Luzulo-Quercetum typicum z.T. Molinia arundinacea mit größeren Deckungswerten enthält.

Einzelne seiner Aufnahmen ohne Pfeifengras lassen sich mit unserem $\underline{Luzulo-Quercetum}$ $\underline{typicum}$ vergleichen. Hier sind auch der Festuca ovina-Calluna-Typ und der Myrtillus-Typ von MEUSEL (1935: Grabfeld/Nordfrankenalb), das trockene Quercetum medioeuropaeum von ZEIDLER und STRAUB (1958: Kitzinger Becken) und das reichere, buchenhaltige Quercetum medioeuropaeum von HOFMANN (1964/65) zu nennen, während das L.-Q. peucedanetosum von ULLMANN (1977: südliches Maindreieck) in einer thermophilen Untereinheit vorliegt.

2.1.3. <u>Kiefernforstgesellschaften</u> auf Standorten des Carpinion und des Quercion robori-petraeae, (Tab. 3, Aufn. 61-68)

Obwohl bei Untersuchungsbeginn eine Miteinbeziehung der wenig verbreiteten Forstgesellschaften nicht geplant war, wurde im Bereich der Flugsandfelder und -dünen, die die Mainaue an ihrem Ostrand begleiten, einige Kiefernbestände näher untersucht; sie herrschen in diesem Gebiet absolut vor, während sich naturnahe Laubmischwälder kaum noch finden. Um so interessanter erschien der Versuch einer Parallelisierung Wald-Forstgesellschaft.

Durch das Vorkommen einiger Carpinion-Kennarten, wie Stellaria holostea und Dactylis polygama sowie der Querco-Fagetea-Arten Anemone nemorosa, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum und Milium effusum läßt sich ein Stellaria holostea-Kiefernforst (KF) von einem Trennartenfreien Kiefernforst abtrennen. Letzterem fehlt in der Strauchschicht außerdem der Faulbaum, der Schwarze Holunder und die Hasel. In der Baumschicht dominiert die Kiefer, immer von Stieleiche, seltener, und nur im reicher KF, von Traubeneiche, Winterlinde und Hainbuche in der BII begleitet.

In der Krautschicht, zu der hier auch die niedrige Strauchschicht gerechnet werden soll, trifft man auf ein charakteristisches Neben-, besser Übereinander von azidophytischen Arten, wie Deschampsia flexuosa, Pleurozium schreberi, Agrostis tenuis, Festuca ovina, Scleropodium purum, Dicranum polysetum, Rumex acetosella, Dicranum scoparium, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, um nur die stetesten zu nennen, die in der in beiden KF-Typen häufigen Rubus idaeus-Ausbildung von geschlossenen Teppichen aus Himbeere und Brombeere

überwuchert werden. Hier spielen als weitere Nitrophyten Moehringia trinervia und Polygonum dumetorum eine größere Rolle. Lichtreichtum und reichlich Stickstoff im Auflagehumus erklären auch das Erscheinen von photophilen, nährstoffbedürftigen Arten, wie Arrhenatherum elatius, Epilobium angustifolium und Veronica chamaedrys in den Aufnahmeflächen.

In beiden KF-Typen fand sich je einmal eine <u>Peucedanum oreoselinum-Ausbildung</u> (mit Beziehung zum <u>Quercetum peucedanetosum</u> von ZEIDLER und STRAUB 1967!), die außer dem Berghaarstrang noch <u>Silene nutans</u> und <u>Jasione montana</u> enthält. Nur im reichen Typ fand sich eine etwas kuriose <u>Dictamnus albus-Ausbildung</u>, die den Diptam mit guter Vitalität enthielt. Schließlich sei beim ärmeren KF noch die <u>Trennartenfreie</u> <u>Ausbildung</u> genannt.

Standorte

Der Stellaria holostea-KF, eine Ersatzgesellschaft des Galio-Carpinetum luzuletosum, besiedelt mesotrophe, podsolige Moder-Braunerden, die sich in Terrassensedimenten mit unterschiedlich mächtiger Flugsanddecke und in flachen Dünen entwickelt haben. Die Köpfe höherer Dünen sind als Wuchsorte des Trennartenfreien KF zu nennen, der Gesellschaften des Luzulo-Quercetum ersetzen dürfte. Als Bodentypen trifft man hier bereits auf Podsol-Braunerden mit 3-5cm mächtigen Ahe-Horizonten. Humusform ist Rohhumusartiger Moder bis Rohhumus.

Interessant war die Frage, wie die Dominanz nitrophiler Arten auf den eigentlich recht armen Sandböden zu erklären sei, eine Erscheinung, die dem Verfasser z.B. auch aus dem Nürnberger Reichswald bekannt ist (vgl. TÜRK 1987). In den Tabellen von ZEIDLER und STRAUB (1967) finden sich Nitrophyten kaum.

Die seit den vergangenen 20 Jahren verstärkt eingetretene Eutrophierung der Landschaft scheint sich auf den leichten Sandböden besonders deutlich im Nitrophytenreichtum zu dokumentieren. Hier können wegen der wenigen bei dieser Bodenart vorhandenen Kationentauscher auftreffende Depositionen nicht wie bei Lehm- und Tonböden festgelegt werden. Deshalb werden hier pro Zeiteinheit mehr pflanzenverfügbare Nährstoffe angeboten als bei schwereren Bodenarten.

- 2.1.4. **Quercetalia pubescenti-petraeae** Br.-Bl. 31, Wärmeliebende Eichenmischwälder
- 2.1.4.1. Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 32
- 2.1.4.1.1. <u>Clematido-Quercetum</u> Oberd. 57 (syn. <u>Dictamno albae-Quercetum</u> Förster 68), Elsbeeren-Traubeneichenwald

Die heute in Mitteleuropa vorhandenen wärmeliebenden Eichenmischwälder gelten als Relikte der postglazialen Wärmezeit. Der ab dem Subboreal vorrückende Buchenwald verdrängte die einst verbreiteten Gesellschaften auf konkurrenzarme, trockenheiße Standorte. Wärmebegünstigung und Lichtreichtum erlauben es hier zahlreichen Arten mit südlichem und südöstlichem Verbreitungsschwerpunkt, weit nach Mitteleuropa vorzudringen.

Dem AG fehlen Gesellschaften der Ordnung aus geomorphologischen Gründen weitgehend, erst am stärker reliefierten Ostrand wurde ein Bestand gefunden. Er besiedelt einen sw-exponierten Steilhang im Bereich der Unteren Myophorienschichten direkt unter der Terrasse der Bleiglanzbank auf flachgründigem, wechseltrockenen Pelosol-Ranker.

Die lückige Baumschicht ist artenreich, aber schlechtwüchsig. Sie besteht hauptsächlich aus Traubeneiche (!) und Elsbeere, denen sich Winterlinde, Feldahorn, Speierling und Hainbuche beimischen. Weißdorn (Crataegus cf. monogyna), Rose (Rosa pec.) und der Nachwuchs von Feldahorn und Winterlinde bilden die üppig entwickelte Strauchschicht. In der nur etwa die Hälfte des Bodens deckenden Krautschicht finden sich viele buntblühende, thermophile und bodentrockenheitsertragende Vertreter, wie Dictamnus albus, Vincetoxicum hirundinaria, Anthericum ramosum, Campanula rapunculoides, Chrysanthemum corymbosum, Campanula persicifolia, Lathyrus niger, Clematis recta, um nur die wichtigsten zu nennen. Auf die Wechseltrokkenheit des Standorts weisen Serratula tinctoria, Calamagrostis arundinacea, Rosa gallica, Molinia arundinacea, Inula salicina, Stachys officinalis und Peucedanum officinale hin. Neben einigen Carpinion-Elementen finden sich Basenzeiger, wie Asarum europaeum, Lathyrus vernus, Hepatica nobilis, Mercurialis perennis (nicht forma ovatifolia = M. paxii!).

Der Bestand wurde einst als Mittelwald genutzt, jetzt befindet er sich in Überführung. Nach Auskunft von Herrn Prof. Zeidler besaß er vor 25 Jahren dasselbe Aussehen. Er dürfte sich um einen natürlichen *Quercion pubescenti-petraeae-*Wald handeln, dessen Standort für Eichen-Hainbuchenwälder zu trocken ist.

Von steilen, sonnenexponierten Lehrbergtonhängen im niederschlagsreicheren Schwanberggebiet (Steigerwald) beschreiben ZEIDLER, LEIPPERT, STRAUB (1969) und ZEIDLER (1984) floristischstandörtlich übereinstimmende Bestände unter dem Namen Clematido-Quercetum Oberd. 57. Nach der Gliederung von FÖRSTER (1979) würde unsere Gesellschaft zum Dictamno albae-Quercetum potentilletosum albae Förster 68 gehören; er gibt als Fundort auch Mainfranken an.

- 2.2. <u>Alnetea glutinosae</u> Br.-Bl. et Tx. 43, Bruchwälder und -gebüsche
- 2.2.1. Alnetalia glutinosae Tx. 37
- 2.2.1.1. Salicion cinereae Müll. et Görs 58,
- 2.2.1.1.1. Salicetum cinereae Zol. 31, Grauweidengebüsch, (Tab. 5, Aufn. 1)

Grauweidengebüsche bilden natürliche Mantelgesellschaften von Alnion glutinosae-Wäldern; sie nehmen nach PASSARGE (1961) eine charakteristische Übergangszone zwischen Röhricht und Bruchwald auf sumpfigen Torfböden ein. Häufiger begegnet man der Gesellschaft heute als Regenerationsstadium des Bruchwaldes auf nicht mehr genutzten Naßwiesen.

Im AG findet sich nur ganz lokal ein Bestand im Randsumpf ei-

ner Großseggengesellschaft mit Carex elata, C. lasiocarpa, C. rostrata, Calamagrostis canescens, Stellaria palustris u.a., die in einer Hohlform (Pingo?) im Bereich des Oberen Sandsteins siedelt.

In der Gehölzschicht dominiert die Grauweide, die hier halbbaumförmige Wuchsform erreicht, begleitet von Erle, Moorbirke und Faulbaum. Die Krautschicht wird von mesotraphenten, nässeholden Arten beherrscht, hier sind insbesondere Calamagrostis canescens, Carex elata, Peucedanum palustre, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Scutellaria galericulata, Lythrum salicaria und Galium palustre zu nennen. Dazwischen findet sich noch Platz für die Sumpfmoose Acrocladium cuspidatum und Sphagnum palustre. Als floristische Besonderheit tritt hier Comarum palustre auf.

Der Bestand stockt auf mesotrophem Niedermoor.

Innerhalb der Gesellschaftsgliederung, die PASSARGE (1961) aufgrund seiner Revision des gesamten damaligen Tabellenmaterials erstellte, nähert sich unser Bestand dem östlichen Pentandro-Salicetum cinereae (von PASSARGE und HOFMANN 1968 zu verschiedenen "Elementargesellschaften" des Comaro-Salicetum auritae gestellt), dessen Comarum palustre-SA er sich floristisch wie standörtlich anschließen läßt.

Aus dem südlichen Maindreieck beschreibt ULLMANN (1972,1977) ein Salici-Franguletum Malc. 29 bzw. Alno-Salicetum Pass. 56, die nach ihrer Artenkombination etwas reichere, aber weniger (sommer)nasse Standorte einnehmen. WÖRZ (1983) gibt 6 Aufnahmen eines Frangulo-Salicetum Malc. 29 von Bruchwaldstandorten aus dem Steigerwald und seinem Vorland, das in Wasser und Basenhaushalt mit unserer Gesellschaft vergleichbar ist.

2.2.1.2. <u>Alnion glutinosae</u> Malc. 29, Erlennaß- und Bruchwälder

Innerhalb West-, Mittel-, und Osteuropas besiedeln die azonalen Gesellschaften des Anion glutinosae vorwiegend organische, aber auch mineralische (vgl. BOHN 1981!) Naßböden, die maßgeblich durch hochanstehendes, zeitweise austretendes Grundwasser geprägt werden. Im Gegensatz zu den Auenwäldern werden sie nicht überschwemmt, eine "Düngung" unterbleibt also. Herrschende Baumart ist die Erle, der sich auf reichen Standorten die Esche, auf ärmeren die Moorbirke beigesellt. Arten der Querco-Fagetea fehlen oder sind auf Sonderstandorte, wie die Stammbasen der Erlen beschränkt. Sträucher fehlen oft, die Krautschicht dagegen ist üppig entwickelt und besteht aus hochwüchsigen, nässeholden Seggen, Gräsern und Kräutern.

Entscheidend für die floristische Zusammensetzung der Bruchwälder scheinen Chemismus und Dynamik des Grundwassers zu sein. Nach ELLENBERG (1982) neutralisieren die mit dem "ziehenden Grundwasser" herangeführten Basen die beim anaeroben Abbau organischer Substanz verstärkt anfallenden organischen Säuren, außerdem stellen sie natürlich Pflanzennährelemente dar. In Mulden mit i stagnierendem Grundwasser besitzen deshalb die Böden saurere Reaktion und dementsprechend eine weniger anspruchsvolle Vegetation.

Nach BODEUX (1955) siedeln in Mitteleuropa zwei vorwiegend durch geographische Trennarten geschiedene Assoziationen: im Westen das <u>Carici-laevigatae-Alnetum glutinosae</u> Schwick. 38 (von OBERDORFER neuerdings (1983) als <u>Sphagno-Alnetum</u> Lemeé bezeichnet) und im Osten der gemäßigt-kontinentale Walzensegen-Erlenbruchwald, das <u>Carici elongatae-Alnetum glutinosae</u> W.Koch 26.

2.2.1.2.1. <u>Carici elongatae-Alnetum glutinosae</u> W.Koch 26, Walzenseggen-Erlenbruchwald, (Tab. 5, Aufn. 2-7)

Verbreitung im AG

Die Gesellschaft erscheint in zwei Ausbildungsformen. Die floristisch wie standörtlich ärmere <u>Trennartenfreie</u> <u>Ausbildung</u> besiedelt Dolinen im Grundgipsbereich der Unteren Myophorienschichten im "Drittelholz". Die reichere <u>Calystegia-sepium-Ausbildung</u> findet sich im Bereich anmooriger und mooriger Talfüllungssedimente mit noch intaktem Grundwasserstand, wie sie kleinflächig im "Kapitelwald", im "Moorhäg" (verlandete ehemalige Torfstiche!) und im kleinen Restwäldchen ne von Grafenrheinfeld anzutreffen sind.

Einst dürften Bruchwälder größere Flächen im Niederungsbereich eingenommen haben, wie Torfuntersuchungen von ZEIDLER (1939) aus dem AG zeigten. Durch Entwässerung sind ihre Standorte aber längst in solche des Alno-Ulmion und Carpinion umgewandelt worden.

Erscheinungsbild/Gehölzartenkombination

In der Baumschicht herrscht die Erle, von einzelnen Eschen, Moorbirken und Traubenkirschen begleitet. Der Schlußgrad beträgt in der Dolinen-Ausbildung um 70%, denn die Erle zeigt hier keinen guten Wuchs; in der Calystegia sepium-Ausbildung liegt er zwischen 75 und 85%. Die gering entwickelte Strauchschicht enthält als Sukzessionsrelikt manchmal die Grauweide, selten die Esche. In Aufnahme 2 fehlen Bäume, die Grauweide dominiert absolut. Wegen der weitgehenden Übereinstimmung in Floristik und Standort mit Aufnahme 3 wurde der Bestand hier eingereiht. Die gutentwickelte Krautschicht besteht aus nässeholden Arten.

Floristische Zusammensetzung der Krautschicht

Gemeinsam ist beiden Ausbildungen ein Grundstock aus mesotraphenten Nässezeigern, wie Carex elata, C. acutiformis, Lysimachia vulgaris, Iris pseudacorus, Scutellaria galericulata, Galium palustre, Solanum dulcamara, Calamagrostis canescens, Carex elongata, C. riparia, Peucedanum palustre, Lythrum salicaria; Rubus caesius, Urtica dioica und Dryopteris carthusiana, aber auch die namengebende Walzensegge bevorzugen die Bulte der Steifsegge und die Erlenstammbasen als Wuchsorte.

Untereinheiten

Von der <u>Trennartenfreien</u> (<u>Dolinen-)Ausbildung</u> läßt sich eine an anspruchsvollen Arten reiche <u>Calystegia</u> <u>sepium-Ausbildung</u> abtrennen, die durch Uferwinde, <u>Symphytum officinale</u>, <u>Phala-</u>

ris arundinacea, Phragmites australis, Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Eupatorium cannabinum und Caltha palustris unterschieden ist. In der nur einmal angetroffenen Großseggenfreien Ausbildung fehlen, bei Anwesenheit der genannten Nährstoffzeiger, Carex elata und C. acutiformis.

Standorte

Die Böden der Gesellschaft werden vom Frühjahr bis in den Sommer hinein überstaut. Im Spätsommer und Herbst wurde das Grundwasser in 40-60 cm Tiefe angetroffen. Die floristischen Unterschiede erklären sich aus der Dynamik des Untergrundwassers. In den Dolinen dürfte eine Wasserbewegung nur in bescheidenem Maße erfolgen, da es sich um zu- und abflußlose Senken handelt. In Übereinstimmung damit sind hier meso-eutrophe Anmoorgleye (Profil 12!) mit Übergängen zwischen Feuchtmull und -moder als Humusform zu finden, deren pH- und Basensättigungswerte die Standortsansprache mittels der Vegetation voll bestätigen. Dagegen werden die Böden, die die reichere Ausbildung besiedelt, von bewegtem Grundwasser beinflußt, wie die angrenzenden Bachläufe beweisen. Der beständige Basennachschub erklärt den Reichtum an Nährstoffzeigern und die guten Wuchsformen der Erle sowie den höheren Schlußgrad. Als Bodentypen trifft man eutrophe Anmoorgleye und Niedermoore an, wobei letztere in verlandeten Torfstichen anzutreffen sind. Humusform ist Feuchtmull.

Literaturvergleich

Die <u>Calystegia sepium-Ausbildung</u> läßt sich der anspruchsvollen <u>Symphytum officinale-SA</u> von BODEUX (1955) zuordnen. Unsere <u>Trennartenfreie Ausbildung</u> besitzt am ehesten Beziehungen zu seiner <u>Ranunculus repens-SA</u>, allerdings fehlen alle hierfür angegebenen Trennarten.

Im wasserarmen Mainfranken sind Alnion glutinosae-Gesellschaften schon aus geologischen Gründen nur selten zu erwarten; ULLMANN (1972) beschreibt vom südlichen Maindreieck ein wohl etwas weniger bodennasses Carici elongatae-Alnetum ranunculetosum repentis, das mit Nährstoffzeigern, wie Calystegia, Phragmites, Angelica, Caltha, Eupatorium und Cirsium oleraceum dennoch recht nah mit unserer reicheren Ausbildung verwandt ist. Eine entsprechende Gesellschaft bei WÖRZ (1983) besiedelt nach Ausweis der Artenkombination bei ähnlichem Bodenwasserhaushalt etwas ärmere Standorte als unsere Trennartenfreie Ausbildung.

Profil 12: Drittelholz; Hochwald; 228m NN; Muldenlage einer Doline

Carici elongatae-Alnetum glutinosae, Trennartenfreie Ausbildung

Anmoorgley aus toniger Dolinenfüllung


+10 cm Humusform: Feuchtmull

0-45 cm $\mathbf{G_{or}A_a}$ schwarzer, orange marmorierter, humoser, schluffiger Ton; gut durchwurzelt; Krümelgefüge

45-60 cm $\mathbf{A_h}\mathbf{G_r}$ graugrüner, humoser, schluffiger Ton; gering durchwurzelt; Kohärentgefüge

Analyseergebnisse:

	Korngrößenzu- sammensetzung				Humusge- halt			Sorptions- verhältnisse		
	S%	U %	Т%	C%	C/N	pН	T	S	٧%	
^G og ^A a Ah ^G r	_ 1	23 17	77 82		16 22	5.09 5.71	44.3	24.1	54.1 58.1	



Anhangsweise folgt noch eine Belegaufnahme für einen nach Entwässerung in Umwandlung begriffenen Bruchwald:

"Gehäu", Nordostteil, 219 m NN; entwässerter Bruchwald mit Zitterpappel (künstlich!), Moorbirke, Stieleiche; ehemals abflußlose Mulde, tiefer Entwässerungsgraben quert; Aufnahmefläche 15 x 15m; Niedermoortorf (entwässert!)/Oberer Sandstein; Deckung BI:70%, BII:25%, S:15%, K:70%

Baumschicht: Populus tremula 4, Betula pubescens 2, Quercus robur 2; Strauchschicht: Betula pubescens 2, Salix cinerea 2, Frangula alnus 1, Prunus spinosa +, Prunus serotina +; Gehölzverjüngung: Populus tremula 1, Quercus robur 1, Corylus avellana +; Krautschicht: Bruchwaldrelikte: Calamagrostis canescens 2, Peucedanum palustre 2, Carex elata 2°, Iris pseudacorus 2°, Lysimachia vulgaris 1, Carex acutiformis 1°, Agrostis canina 1; Aulacomnium palustre +, Dryopteris carthusiana +; Störzeiger: Molinia arundinacea 1, Carex brizoides 1, Rubus idaeus +, Urtica dioica +; mesophile Arten: Stellaria holostea 2, Milium effusum 2, Eurhynchium striatum 2, Brachythecium spec. 1, Poa nemoralis 1, Moehringia trinervia 1, Asarum europaeum +

- 2.3. <u>Salicetea purpureae</u> Moor 58, Weidengebüsche und -wälder
- 2.3.1. Salicetalia purpureae Moor 58
- 2.3.1.1. <u>Salicion albae</u> Soó 30 em. Moor 58, Weidenwälder
- 2.3.1.1.1. <u>Salicetum albae</u> Issl. 26, Silberweidenwald, (Tab. 6, Aufn. 1-3)

Nach MOOR (1958), der sich neben MÜLLER und GÖRS (1958) besonders um Abgrenzung und Inhalt der Klasse verdient gemacht hat, besiedeln die Gesellschaften der baumförmigen Schmalblattweiden (Salix alba, S. fragilis, S. x rubens) eine charakteristische, flußufernahe Zone, die "...bei Mittelwasser eben erfaßt und bei jedem Hochwasser überschwemmt und mit Sandmassen überführt (überschüttet)... "wird (MOOR 1958 p.295). Der Krautschicht fehlen eigene Kennarten, sie besteht neben übergreifenden Arten der Flußuferfluren und aus zahlreichen, Nitrophyten (viele Therophyten!), deren Artenkombination sich nach jedem Hochwasser ändern kann.

In der Mainaue künden einzelne alte, oft urig geformte Silberweiden von der einstigen Verbreitung des Salicetum albae. Am Rand und Grund von nassen Mulden, die meist ehemalige Mainläufe darstellen ("Altmaine") und im Frühjahr und Sommer durch Qualmwasser überstaut werden, findet man noch Reste silberweidenreicher Gesellschaften. Sie stocken hier auf Naßgleyen und Übergängen zu subhydrischen Böden, die sich in den tonreichen Hochflutabsätzen am Grunde der Mulden entwickelt haben. Überschwemmungen finden heute kaum mehr statt. Bedingt durch das veränderte Wasserregime befinden sich die Bestände in Umwandlung zu weniger bodennassen Folgegesellschaften, meist zum Pruno-Fraxinetum, dem sie teilweise schon anzuschließen sind.

Die in Tabelle 6 zusammengefaßten Gesellschaften zeichnen durch die Dominanz der Silberweide in der Baumschicht sich ihr sind Erle, Esche, strauchförmige Traubenkirsche, aus: Moorbirke und Stieleiche beigemischt. In der Strauchschicht findet sich neben dem steten Hopfen Echter Schneeball. Blutroter Hartriegel und Pfaffenhütchen. Die Zusammensetzung der Krautschicht variiert stärker. In den als <u>Pruno-Fraxine-tum</u>, <u>Salix alba-reiche Ausbildung</u> bezeichneten Beständen tum, Salix alba-reiche Ausbildung bezeichneten Beständen (Aufn. 1,2) finden sich neben Alno-Ulmion-Kennarten, wie Stachys sylvatica, Impatiens noli-tangere, Gagea lutea, hy-grophile Nitrophyten, wie Urtica dioica, Ficaria verna, La-mium maculatum, Galium aparine, Glechoma hederacea, Veronica h.lucorum, Rubus caesius u.a.. Auf den lange unter Wasser stehenden Böden des Salicetum albae finden sich, bei Zurücktreten der Alno-Ulmion-Elemente, dazu noch Nässezeiger, wie Phalaris arundinacea, Filipendula ulmaria, Tris pseudacorus, Lycopus europaeus, Valeriana officinalis coll., Ranunculus repens, Agrostis stolonifera, Veronica beccabunga, Bidens spec.. Tümpeln zwischen den Bäumen schwimmen Decken von Lemna minor.

WALDGESELLSCHAFTEN IM SCHWEINFURTER-BECKEN (SOMMER 1986)

TABELLE δ : SILBERWEIDENREICHE WALDGESELLSCHAFTEN

AUFNAHMEN 1-2: PRUNO-FRAXINETUM, SALIX ALBA-REICHE AUSBILDUNG

AUFNAHME 3: SALICETUM AL	BAE	, .,	,		KETONE	70
LAUFENDE NUMMER AUFNAHMENUMMER DECKUNG BII (%): DECKUNG BII (%): DECKUNG K (%): DECKUNG K (%): SCHLUSSGRAD (%): GEOLOGIE: NEI GUNG (GRAD): EXPOSITION: BODENART (OBERBODEN): HUMUSFORM: ARTENZAHL:		1 50 80 5 90 85 A 1 SE UMU 25	2 5 5 5 8 5 8 5 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9	3 52 -75 15 90 75 A - Ut MU 38		
BAUMARTEN:						
SALIX ALBA ALNUS GLUTINOSA FRAXINUS EXCELSIOR PRUNUS PADUS PRUNUS PADUS PRUNUS PADUS BETULA PUBESCENS QUERCUS ROBUR	BI BII BI BII K BII S BII S K BII BI	2253 .22	3 :42+2+ 3 :22	4 2 2 1 +		
STRAUCHARTEN:						
HUMULUS LUPULUS VIBURNUM OPULUS CORNUS SANGUINEA	s s s	1 :	2	1 2 1		
EUONYMUS EUROPAEUS	Š	٠	+	•		
KRAUTIGE ARTEN:						
HYGROPHILE NITROPHYTEN:						
URTICA DIDICA FICARIA VERNA LAMIUM MACULATUM GALIUM APARINE GLECHOMA HEDERACEA GALEOPASIS TETRAHIT AEGOPODIUM PODAGRARIA ELYMUS CAMINUS VERONICA H.LUCORUM GEUM URBANUM RUBUS CAESIUS CIRSIUM OLERACEUM SOLANUM DULCAMARA GERANIUM ROBERTIANUM MYOSOTOM AGUATICUM CHAEROPRYLLUM BULBOSUM		422222++2+	3232112++22	2 V + 1 1 r + 1 . + + 2 1 . r .		
ALNO-ULMION-ARTEN:						
GAGEA LUTEA STACHYS SYLVATICA FESTUCA GIGANTEA IMPATIENS NOLI-TANGERE		2 2 ÷	2 1	i 1		
FAGETALIA-ARTEN:						
LAMIUM G.MONTANUM ADOXA MOSCHATELLINA PULMONARIA OBSCURA ASARUM EUROPAEUM CARDAMINE P.NEMOROSA ARUM MACULATUM SCROPHULARIA NODOSA DACTYLIS POLYGAMA		2	† 1 	*		
ARTEN FEUCHTER BIS NASSER	STAND	ORTI				
PHALARIS ARUNDINACEA FILIPENDULA ULMARIA LEMNA MINOR VERONICA BECCABUNGA IRIS PSEUDACORUS AGROSTIS STOLOMIFERA RANUNCULUS REPENS LYCOPUS EUROPAEUS VALERIAMA OFFICINALIS COLL LYTHRUM SALICARIA EQUISETUM ARVENSE BIDENS SPEC. PHRAGMITES AUSTRALIS		r 		313222221		

3. Gehölzfreie Gesellschaften

3.1. Thermophile Saum- und Dichtungsgesellschaften, Origanetalia vulgaris Th. Müll. 61, Atropetalia Vlig. 37, (Tab. 7. Aufn. 1-5)

Wie oben erwähnt, finden sich verschiedene Kenn- und Trennarten der wärmebedürftigen Saumgesellschaften immer wieder in den Eichen-Hainbuchenwäldern des AG. Ihren Schwerpunkt, was Vitalität und Artmächtigkeit angeht, besitzen sie aber im Übergangsbereich zwischen Wald(mantel) und Kulturland, eben im "Saum". Sie treten aber auch <u>flächenhaft</u> als Lichtungsgesellschaft in Waldblößen auf, die durch Windbruch (wie im Urwald!) oder menschliche Tätigkeit entstanden sind. Unmittelbarer als Strauch- und Krautarten des Waldes den klimatischen Bedingungen ausgesetzt, reagieren sie empfindlich auf Standortsunterschiede (vgl. DIERSCHKE 1974,ZEIDLER 1983).

Aus insgesamt über 70 Aufnahmen, die aus Zeitgründen nicht vollständig ausgewertet werden konnten, sollen hier ganz kurz einige typische, häufig mit ähnlicher Artenkombination wiederkehrende Saum- und Lichtungsgesellschaften vorgestellt werden.

Als Grund für die floristische Differenzierung kommt der Exposition der Bestände nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Vielmehr scheint der Basen- und Wasserhaushalt der Böden die entscheidende Rolle zu spielen.

Charakteristisch für mesotrophe, wechselfrische Standorte im Bereich des Galio-Carpinetum luzuletosum und G.-C. potentilletosum (Terrassensedimente, Flugsand/Keuperton, Oberer Sandstein) sind im AG Gesellschaften des Trifolion medii Th. Müll. 61. Das seltene, nur einmal angetroffene Trifolio-Agrimonietum Th. Müll. 62 wird vom östlich-verbreiteten Agrimonio-Vicietum cassubicae Pass. 67 (n. inv.) vertreten (Tab. 7, Aufn. 3,4). Die Kassuben-Wicke wächst hier in großen Herden, begleitet von Trifolium medium, Agrimonia eupatoria, Viola hirta, Calamintha clinopodium, Coronilla varia und anderen Origanetalia-Arten (der sonst in solchen Beständen häufige Origanum vulgare fehlt meist!). Wechselfeuchtezeiger sind reichlich vorhanden, hier sollen nur Serratula tinctoria, Melica picta, Molinia arundinacea, Selinum carvifolia, Stachys officinalis und Genista tinctoria genannt sein. Als floristische Besonderheit findet sich mehrfach die kontinentale Potentilla thuringiaca in dieser Gesellschaft.

Wechseltrockene, basenreiche Böden (sandige Deckschichten/Keuperton) im Kontaktbereich der Asarum europaeum-SA-Gruppe des Galio-Carpinetum besiedelt die am weitesten verbreitete Assoziation des Geranion sanguinei Tx. in Th. Müll. 61, das Geranio-Peucedanetum cervariae Th. Müll. 61 (Tab. 7, Aufn. 1-2). Der im Hochsommer absolut aspektbestimmende Hirschhaarstrang, Veronica teucrium, Melampyrum cristatum, Bupleurum falcatum, Chrysanthemum corymbosum, Campanula persicifolia, sind als Kenn- und Trennarten des Verbandes häufig. Der Blutrote Storchenschnabel, ansonsten in der entsprechenden Gesellschaft in Mainfranken recht verbreitet, fehlt den meisten Beständen (Sommertrockenheit/Spätfröste?). Wieder erreichen die nie fehlenden Wechselfeuchtezeiger hohe Artmächtigkeiten. Außer den oben schon genannten Vertretern Serratula tinctoria, Sta-

Tab. 7: Thermophile Saum- und Lichtungsgesellschaften

Aufnahmen 1-2: Geranio-Peucedanetum, wechselfeuchte Serratula tinctoria-Ausbildung

Aufnahmen 3-4: Agrimonio-Vicietum cassubicae, wechselfeuchte Serratula tinctoria-Ausbildung

Aufnahme 5: Calamagrostio-Digitalietum grandiflorae

	Laufende Nummer:	1	2	3	4	5
	Deckungsgrad (%):	75	80	70	75	80
	Neigung (°):	ź	_	· 1	2	4
	Exposition:	W	-	SW	S	NE
	Geologie:	T	F	S	F/T	S
	Bodenart (Oberboden):	Tu	Su	Us	Su	Uε
	Artenzahl:	46	35	50	23	22
					-	
	Kennzeichnende Arten der	lokal	en Lichtu	ngs	gesellscha	ft:
	Digitalis grandiflora			r		2
	Calamagrostis arundinacea	ı .				4
	Kenn-(K) und Trennarten(T) des	Geranion	sa.	nguinei:	
K	Peucedanum cervaria	2	2			
	Geranium sanguineum		3			
	Veronica teucrium	+	+			
	Melampyrum cristatum	1		1		
	Bupleurum falcatum		1			
T	Chrysanthemum corymbosum	1	2		+	
٠	Primula veris	1				
	Aster linosyris	2				
	Campanula persicifolia	+				
	Lathyrus niger				+	
	Kenn-(K) und Trennarten(T) des	Trifolio	n m	edii:	
ĸ	Vicia cassubica			3	3	
"	Trifolium medium	2		3	3 2	
	Agrimonia eupatoria	2		+		
T	Achillea millefolium	+	1	1		
•	Dactylis glomerata	+	1			+
	Vicia sepium	+			1	1
	Veronica chamaedrys	+		2		
	Centaurea j.angustifol.	2		+		
	Galium a.mollugo	-	+			

Senecio	jacobaea
Wechself	euchtezeiger:

Mecupertedcure SerBer.					
Serratula tinctoria	2	1	1	1	
Melica picta	2	2	2		
Stachys officinalis	+	+	2		
Molinia arundinacea				3	
Inula salicina	4 .			1	
Genista tinctoria	2		2		
Filipendula vulgaris	1	1			
Selinum carvifolium			r	1	
Silaum silaus	+		+		
Pulmonaria mollis				1	
Potentilla alba		1	•	•	
Carex tomentosa	2				
Ranunculus polyanthemoi	des1	•	•		
Carex flacca	1				
Gymnadenia conopsea	1			•	
Trifolium montanum	1		•		
Allium scorodoprasum	+	+			

je einmal in 1: Ononis spinosa 1. Viola mirabilis +, Poa pratensis +, Festuca pratensis +, Phleum pratense +, Lorus corniculatus +, Alopecurus pratensis +, Viola cracca +; in 2: Festuca rubra 1, Calamagrostis epigejos 1, Aegopodium podagraria 1, Quercus robur j. +, Sedum m.telephium +, Agrostis tenuis +, Polygonum dumetorum +, Pyrus pyraster j. +, Polygonatum multiflorum +, Elymus caninus +, Taraxacum officinale r; in 3: Festuca rubra 2, Lysimachia nummularium 2, Stellaria holostea 1, Linaria spec., Carex hirta +, Melampyrum pratense +, Lathyrus linifolius +, Pimpinella saxifraga +, Campanula rotundifolia r. Crepis biennis r; in 4: Heracleum sphondylium +, Brachypodium sylvaticum +, Lathyrus vernus +; in 5: Stellaria holostea 2, Eurrhynchium striatum 2, Convalaria majalis 2, Anemone nemorosa v, Dryopteris filixmas 1, Senecio fuchsii 1, Festuca heterophylla 1, Dryopteris carthusiana +, Luzula luzuloides +, Holcus mollis r

chys officinalis, Melica picta, trifft man öfters auf Filipendula vulgaris, Ranunculus n.polyanthemophyllus, R. polyanthemoides, aber auch, in einer besonderen Ausbildung, Vicia cassubica, Potentilla alba und Digitalis grandiflora.

In Lichtlücken von Waldbeständen, die dem Galio-Carpinetum luzuletosum und G.-C. typicum zuzuordnen sind, fast nie an Waldrändern, trifft man gelegenlich auf sandig-schluffigen, schwach wechselfeuchten Böden das Calamagrostio-Digitalietum grandiflorae Sill. em. Oberd. 57 (Tab. 7, Aufn. 5), das in klimatisch kontinental-getönten Gebieten das im westlichen Mitteleuropa verbreitete Epilobio-Digitalietum purpureae Schwick. (33) 44 ersetzt. Waldreitgras und Großblütiger Fingerhut stellen die dominanten Glieder der Gesellschaft dar; sie werden von Waldpflanzen und einigen Wechselfeuchtezeigern begleitet.

Im Vergleich zu Aufnahmen, die von der im Westen angrenzenden Fränkischen Platte stammen (ULLMANN 1977, MEISTER 1983), fällt das deutliche Zurücktreten submediterraner Arten auf. Geranium sanguineum, Vicia tenuifolia, Melampyrum arvense, Fragaria viridis, Origanum vulgare, Inula conyza fehlen oder sind selten. Vertreter des subkontinentalen Geoelements sind dagegen im AG viel stärker vertreten; hier ist an Melica picta, Lathyrus niger, Chrysanthemum corymbosum, Campanula persicifolia, die fast keinem Bestand der Origanetalia-Gesellschaften fehlen, zu denken. Mit Digitalis grandiflora, Potentilla alba, Vicia cassubica, Centaurea pseudophrygia, Peucedanum oreoselinum, Filipendula vulgaris, Potentilla thuringiaca, Ranunculus n.polyanthemophyllus u.a. zusammen kennzeichnen diese Arten wohl besondere Rassen der genannten Gesellschaften.

3.2. <u>Euphorbia palustris-Carex acutiformis-Gesellschaft</u> (Magnocaricion W.Koch 26 ?), (Tab. 8, Aufn. 1-3)

Im Gipskarstbereich der Unteren Myophorienschichten finden sich mehrfach Waldlichtungen mit einer Großseggengesellschaft, in der die Sumpfsegge absolut dominiert, ohne allerdings optimale Vitalität zu erreichen. Ihr gesellen sich verschiedene nässeholde Arten bei; hier sind Galium palustre, Agrostis canina, Scutellaria galericulata, Calamagrostis canescens u.a. zu nennen. Als floristische Besonderheit tritt mehrfach Euphorbia palustris auf; sie gelangt hier auch zur Blüte. Einmal fand sich ein steriles Exemplar von cf. Veronica longifo-

Die Gesellschaft besiedelt flache Mulden, die wahrscheinlich kolluvial-gefüllte Dolinen darstellen. In den äußerst tonreichen (Tongehalte > 80%!) Substraten hat sich ein Boden entwickelt, der wohl am ehesten als Pelosol-Gley mit tiefhumosen Oberboden (sommerliche Spaltenbildung --> Humuseinspülung!) anzusprechen ist (siehe Profil 13!).

Außer einzelnen krüppelwüchsigen Exemplaren von Stieleiche und Esche fehlt Baumwuchs. Möglicherweise sind Dynamik und Wasserhaushalt der Böden (völlige Vernässung im Frühjahr, scharfes Austrocknen des Oberbodens im Sommer) schon für Baumkeimlinge ungünstig. Darauf deutet auch das Fehlen der in der Nachbarschaft vorhandenen Erle hin. Es dürfte sich hier um lokal waldfreie Stellen handeln, die auch im Urwaldzustand lichtliebenden Arten Lebensmöglichkeiten boten.

Tab. 8 : Euphorbia palustris-Carex acutiformis-Gesellschaft

Laufende Nummer:	1	2	3	
Deckung (%):	90	70	80	
Bodenart (Oberboden):	Tu	Tu	Tu	
Artenzahl:	17	16	14	
<i>Carex acutiformis</i>	4	3 2	5	
Euphorbia palustris	2 2 2		•	
<i>Galium palustre</i>	2	1	${f r}$	
Agrostis canina		•	+	
Scutellaria galericulata	1	\mathbf{r}	•	
Calamagrostis canescens	+	2	•	
Glechoma hederacea	1	•	1	
<i>Dryopteris carthusiana</i>	r	•	+	
Filipendula ulmaria	${f r}$	\mathbf{r}	•	
Melica picta	•		r	
Calamagrostis epigejos	2		•	
Agrostis stolonifera	2	•	•	
<i>Poa trvialis</i>	+		•	
<i>Lathyrus pratensis</i>	r		•	
Galium aparine	r		•	
Acrocladium cuspidatum		2	•	
Lysimachia vulgaris		1	•	
Carex acuta		+		
Alopecurus pratensis		+		
Rubus caesius		+	•	
Phalaris arundinacea		+	•	
Carex elongata		${f r}$	•	
Gehölzkeimlinge:				
Fraxinus excelsior	1	1	1	
Quercus robur	+	+	1	
Euonymus europaeus	r	•	+	
<i>Ulmus minor</i>	•		1	
<i>Quercus petraea</i>	•		+	
Tilia cordata	r	•	•	
<i>Populus tremula</i>	•	r	•	
Prunus avium	•	•	r	
Carpinus betulus		•	r	

Profil 13: Holzspitze; Waldlichtung; 225 m NN; Schwache Mulde

Euphorbia palustris-Carex acutiformis-Gesellschaft

 $\textbf{Pelosol-Gley}, \ \textbf{Oberboden stark humos, aus toniger Dolinen-füllung}$


+5 cm Humusform: F-Mull

0-13 cm $G_0 A_h$ grünschwarzer, orange marmorierter, humoser schluffiger Ton; gut durchwurzelt; Krümelgefüge

13-60 cm **PG**or schwarzgrüner, stark orange marmorierter, humoser, schluffiger Ton; schwach durchwurzelt: Polyedergefüge

Analyseergebnisse:

		Korngrößenzu- sammensetzung			Humusge- halt			Sorptions- verhältnisse		
	S%	U%	Т%	C%	C/N	pН	T mv	S	V%	
G _Q A _h PG _{or}	3 3	15 12	82 85	13.4 9.3		4.95 5.03	46.0 45.7	25.3 27.8	55.0 60.8	



IV. ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG DER WALDGESELLSCHAFTEN

1. Stetigkeitstabelle

Die Stetigkeitstabelle im Anhang soll eine Übersicht der unterschiedenen Waldgesellschaften vermitteln.

2. Ökologische Zeigerwerte (Abb. 7)

Aufgrund seiner Erfahrung hat ELLENBERG (1982) versucht, das ökologische Verhalten der in Mitteleuropa vorhandenen Arten gegenüber bestimmten Standortsfaktoren in Zahlen ("Ellenbergzahlen") zu fassen. Problematisch ist dabei die Tatsache, daß eine Pflanzenart je nach herrschendem Großklima unterschiedliche Konkurrenzkraft besitzt und deshalb ein verändertes ökologisch-soziologisches Verhalten zeigt.

Allgemein kann festgestellt werden, daß die Standortsaussagen, die aufgrund der Auswertung der Ellenbergzahlen für die verschiedenen Pflanzengesellschaften zustandekommen, die bereits im Gelände zu erkennenden Schlüsse bestätigen. Bei der Berechnung der Werte für einen bestimmten Standortsfaktor wurden alle Strauch- und Krautschichtarten aller zu der betreffenden Vegetationseinheit gehörender Aufnahmen ausgewertet. Deckungsgrad und Baumschicht wurden gemäß den Empfehlungen von ELLENBERG (1982) nicht berücksichtigt.

Zur Bedeutung der verwendeten Zahlen vergleiche ELLENBERG (1982).


Aus Gründen der Abkürzung wird hier für das Pruno-Fraxinetum, $Allium\ ursinum$, Trennartenfreie, und $Carex\ acutiformis$ -Ausbildung die Bezeichnung $P.-F.\ allietosum$, typicum und caricetosum verwendet.

Lichtzahl:

Bei den lichten, sonnendurchfluteten Beständen der Kiefernforste erreichen die Werte ihr Maximum. Aber auch im Quercion roboris erlaubt es der ungenügende Kronenschluß noch vielen lichtbedürftigen Arten zu wachsen. Hier ist beispielsweise an das Pfeifengras (Molinia arundinacea) zu denken, das zwar einzeln und steril immer wieder in Carpinion-Gesellschaften wechselfeuchter Böden zu finden ist, aber erst im offenen Luzulo-Quercetum molinietosum optimal gedeiht. Mit in gleicher Richtung zunehmender Standortgüte werden auch die Bestände des Galio-Carpinetum potentilletosum, G.-C. luzuletosum, G.-C. typicum, G.-C. asaretosum, G.-C. aretosum, G.-C. allietosum, Stellario-Carpinetum aretosum, St.-C. allietosum, Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum allietosum immer geschlossener. Wasserüberschuß führt zu einer geringwüchsigeren Baumschicht und damit zu lichteren Verhältnissen, was sich in einer Zunahme der Lichtzahlenwerte in Richtung Pruno-Fraxinetum typicum, P.-F. caricetosum, Carici elongatae-Alnetum, Salicetum cineraee bemerkbar macht.

Temperaturzahl:

Die Werte variieren innerhalb der Gesellschaften kaum. Sie liegen im Bereich um $5,0\,$ d.h. mäßig warme Verhältnisse herrschen vor. Erwartungsgemäß liegt die Temperaturzahl beim Ga-



Mittlere ökologische Zeigerwerte der Waldgesellschaften (Gestaltung in Anlehnung an WELSS 1985) Abb. 7.

lio-Carpinetum potentilletosum, das ja waldrandnahe Standorte einnimmt, am höchsten (5,7). Den geringsten Wert (4,7) weist das Salicetum cinereae auf. Wasserüberschuß und Muldenlage (Kaltluftstau!) dürften hier lokal kühlere Bedingungen schaffen, was sich ja auch im Vorkommmen des nordischen Comarum palustre zeigt.

Kontinentalitätszahl:

Die Werte unterliegen stärkeren Schwankungen. Die höchsten Zahlen besitzen das Galio-Carpinetum potentilletosum, auf dessen wechseltrockenen Standorten zahlreiche subkontinental verbreitete Arten zu finden sind, und das Salicetum cinereae mit wenigen, aber vor allem im Osten siedelnden Arten (Comarum palustre, Calamagrostis canescens, Peucedanum palustre u.a.). Niedriger liegen die Werte bei den frische bis feuchte Böden besiedelnden Gesellschaften (Stellario-Carpinetum, Galio-Carpinetum allietosum, Querco-Ulmetum, Pruno-Fraxinetum, Carici elongatae-Alnetum). Die gegenüber den Angaben bei WELSS (1985) sehr niedrigen Werte für die Ferste erklären sich aus der Tatsache, daß der genannte Autor die Baumschicht, hier vor allem die kontinentale Kiefer, bei der Berechnung mitverwendet hat.

Feuchtezahl:


Innerhalb der Forste weist der auf trockenen Böden stockende Trennartenfreie KF, die Ersatzgesellschaft des Luzulo-Quercetum typicum, nierigere Werte auf als der das Galio-Carpinetum luzuletosum ersetzende Stellaria holostea-KF. Das Luzulo-Quercetum molinietosum wechselfeuchter Böden erreicht höhere Werte als das bodentrockene L.-Q. typicum. Ansonsten steigen die Feuchtezahlen vom Galio-Carpinetum potentilletosum (4,5 = "mäßig frisch") bis zum Salicetum cinereae (7,0 = "mäßig naß") mit Zunahme der Bodenfeuchte stetig an, wie aus Abb. 11 zu ersehen.

Reaktionszahl:

Die Werte verhalten sich weitgehend übereinstimmend mit den Feuchtezahlen. Vom Galio-Carpinetum asaretosum bis zum Carici elongatae-Alnetum liegen sie alle ungefähr bei 6,5-7,0. ("gute Basenversorgung"). Erwartungsgemäß erreichen sie beim früher durch Überflutungen "gedüngten" Querco-Ulmetum ihr Maximum. Bei dem auf mesotrophem Standort siedelnden Salicetum cinereae liegt die Reaktionszahl wieder deutlich niedriger.

Stickstoff zahl:

Während die Böden der Forsten, der Quercion roboris-Gesellschaften und des Salicetum cinereae nur über geringe Stickstoffreserven (3,5-4,3) verfügen, wobei sich der Nitrophytenreichtum (Lichtpflanzen!) der Forsten in den erhöhten Werten gegenüber dem Quercion roboris bemerkbar macht, liegen die Stickstoffzahlen bei den Eichen-Hainbuchenwäldern schon bedeutend höher, um beim Querco-Ulmetum ihren Maximalwert (7,0) zu erreichen. Überschüssige Bodenfeuchte bis -nässe dokumentiert sich in der erneuten Abnahme vom Pruno-Fraxinetum bis zum Carici elongatae-Alnetum.



3. Reaktion-Feuchte-Diagramm (Abb. 8)

Das Reaktion - Feuchte-Diagramm der im Schweinfurter Becken vorhandenen Waldgesellschaften läßt einmal ihre Abhängigkeit von den wichtigen Standortsfaktoren Wasser und Basengehalt, zum anderen aber auch ihre gegenseitige Verwandtschaft erkennen. Auf den Achsen des Koordinatensystems sind die errechneten "Ellenbergzahlen" für die einzelnen Gesellschaften aufgetragen.

Trockenheit und (damit teilweise gekoppelt) Basenarmut des Standorts erreichen im Trennartenfreien KF und in seiner Ausgangsgesellschaft, dem <u>Luzulo-Quercetum</u> typicum, die extremsten Werte. Deutlich ist auch die Verwandtschaft zwischen dem <u>Galio-Carpinetum luzuletosum</u> und seiner Ersatzgesellschaft, dem <u>Stellaria holostea-KF</u>, zu erkennen. Die nach Ausweis der Zahlen etwas weniger gute Basenversorgung des letzteren dürfte eine Folge der mit dem Kiefernanbau einhergehenden verstärkten Basenauswaschung sein. Ebenfalls anthropogen (Streunutzung!) ist wohl der geringe Basengehalt des (gegenüber dem <u>L.-Q. typicum</u> insgesamt frischere, eigentlich wechselfeuchte, Standorte einnehmenden) <u>Luzulo-Quercetum molinietosum</u>, dessen Ausgangsgesellschaft im Bereich wechselfeuchter Ausbildungen des <u>Galio-Carpinetum luzuletosum</u> (z.B. Tab. 3, Aufn. 50) zu suchen ist.

Besser basenversorgte, aber trockenere (wechseltrockene) Standorte als das G.-C. luzuletosum nimmt das $\underline{Galio-Carpine-tum}$ potentilletosum ein. Deutlich sichtbar ist die vermittelnde Stellung des $\underline{Galio-Carpinetum}$ typicum zwischen dem reichen und dem ärmeren Flügel der Gesellschaft.

Wie oben besprochen, besiedelt die <u>Asarum europaeum-SA-Gruppe</u> <u>des Galio-Carpinetum</u>, das <u>Stellario-Carpinetum</u>, das <u>Querco-Ulmetum</u>, das <u>Pruno-Fraxinetum</u> und das <u>Carici elongatae Alnetum</u> Böden mit günstiger Basenversorgung. Die Differenzierung erfolgt hier deutlich sichtbar durch die Wasserversorgung, die sich in der angegebenen Reihenfolge von mäßig frischen zu nassen Verhältnissen ändert.

Das nasse, aber nur mäßig basenversorgte Böden besiedelnde <u>Salicetum cinereae</u> nimmt eine deutlich isolierte Stellung im Diagramm ein.

4. Die Verteilung der (Abb. 9,10,11,12) Waldgesellschaften im Gelände

Ziel vegetationskundlicher Arbeit sollte neben der reinen Inventarisierung auch immer eine ökologische Begründung der erkannten Vegetationseinheiten sein (ELLENBERG 1939,1982). Bei der Beschreibung der Waldgesellschaften wurde der Versuch unternommen, die Abhängigkeit der unterschiedenen Typen von einigen "entscheidenden Standortsfaktoren" (MOOR 1952), wie geologischer Untergrund, Boden, Exposition, zu erklären, wobei sich der Verfasser der Unmöglichkeit bewußt ist, alle wirksamen Faktoren zu erkennen und zu verstehen.

Im folgenden Teil der Arbeit sollen die erkannten Zusammenhänge in geologisch-pedologisch-vegetationskundlichen Transekten verdeutlicht werden.




Abb.9. Vegetationsprofil "Auerestgehölz"

100m

50

Vegetationsprofil "Riedholz"




Abb. 10. Vegetationsprofil "Riedholz"

Abb.11. Vegetationsprofil "Ansbach"

			-	— П			1 <i>i</i> .		1	
	NNE Esch Erl T.K:				و ال	Tscher. nitza	Pruno-Fr xinetum allieto-	and s	ŀ	
	StE: Es Wil: HBu				9,45,49 B. III.	Braunerde (mesotroph)	Galio - Carpine-Pruno-Fa tum typicum, xinetum trennartenfreie allieto-	Variante		Talfüllung
	Esch 945 Wili	,			10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Tschernitza		Stachys sylva. Variante ticos - Variont		Flugsand
=	ii StEi I WLi HBv HBv						Galio-Gatio-Carpinetom typicom, Beschamp-Stellario-Galio-Carpine-Puno-In Garp, sia cespitoso-Variante Asaron curpaa-Carpinetom tom typicom, innetom panaloyom - und trennantenfeix-Ausbildung allielosoun, trennantenfeix allielos	•		Fließerde
Vegetationsprofil "Ansbach"	S4E				AS III	Bravnerde- Pseudogley	Galio-Galio-Carpinetum typicum, Desako Carp. sia cespitoso-Pariante, Asarum cura osaeto um - und trennantentreie Auslildung	(Mosaik)		Obere Schiefer- Oberer Gelbkalk-Folgm Sandstein
ationsprof	słe: Wil:			//	O. II P. II m.C.,	Pelosol- Braun- erde		som , trennar- ten fr K		Obere Schi Gelbkalk-
Vegel	SE Wili HB				9, 5, (4) By m(y	Pilosol-Brannerde-Brannerde Braun-Pseudogley (meso-eutroph) erde	Balio- Galio-Carpine-Balio-Balio-Galio-Carpine- Rapine-lum luzulelosum/Arpinepinelum by-lum typicum, Impoble+ typicum, translum asapicum, trens asterfreie	Variante	4004	
	Wili HBu	AT TO			25.00 18.54 18.54	Pelosol-Bravnerde Bravnerde Bravn-Pseudogley (meso-eutr erde	Galio-Gar- (repinetum ty-t sopicum,	illetoum artenfreie Vainante leefosum Deschamp- Variante albae (Mosaik) trongar-sia cespV. tronfrey.	300	
	SE: Wil:			'	S E E		oine - Galio Iosum(arpin trenn-lum a	nante retosu trenna tenfre	900 700	
	∑				ر د (را) ا	Ranker- Braunerde	satio - Gatio - Carpine - Gatio - Gatio - Gatio - Ca arpine tim tuzuletosum Carpine pinetum t um pola + 17 pic vm, tren tum asopicum,	artenfreie Vari (Mosaik)	100	
	SSV				S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Brauner- de-Pseu- dogley	Galio- Carpine- tum poka	tilletosum	£ 770	
			 -	eologie -	Bodentyp (**)		Vegetation			

Vegetationsprofil "Kapitelwald-Kammerholz"

ш =	, 1	T	e a	
Esd Sig. ENE	١,	22	Acker flächen Stellario Gapinelum areloum, Stadys sylvelia - Yar	- 6 un
	Ι.	o Galanti Tschernit za	Acker flächen Stellario- Grpinetum arel Stadys sylvelica	Talfüllung "f
	, 1	- T	Acke Stell Garpii Stacky	
	1 1			, a
# 27	Ι.	Ad Barrello	Luzulo - Buercetum molinie tosum	Flugsan Düne , S, a
	, 1	* & 5	L v.i	÷ [177] F O
E CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	' I			milt sse ter)
	i i	i	ירמייי	-
Mr.	\ '	qe	retos	ories A
	\ 1	ותעפיי	lozi ietum	I May ten in the second of the
. SE . SE .	1.	Adresses Brannerde	etum o-Vic	Dalere Myor Schichten er Trundgips km M
	\	A	arpini	
Page 1997	1	Pod	Galio - Carpinetum Tuzuletosum Saum: Agrimonio-Vicietum cassubicae	Bere Schiefer relbkalk-Folg inschl. Grenzde kv2 + kvD
# XF	۱ ا		Gali	 Bere Schiefer
	N .		-ag # (#2	_
Ki xie Esa Fil	<u> </u>	C. Y	Carici elonga- Gal. tae-Alnetum Carn glutinosae Loz. (Enlwässe- rungsstadium)	900 4000 m
iii iii ii i	뵛╷	By Go. 61 (C) (Gr. Bods. Anmoo	Lar. (En	l l
		Act Of Comments of the St.	Neigh Li	88 -
	. 1	Are Bsy Bsy By LC Pod sol - (al trophe) Braw	Luzulo. Quercetum typicum + Trennarten Kiefernforst	00.
a a	0	Manual M	Sell Luzulo. Gario elango (Gap. Galio. Querestum Gal kar-Alnetum allietus, Carpinetum typicum + Cerp glutinosae (Gryda: Irsuletosum Trennartenfrichter, (En lwässe- lis inter medio. V.	009
¥	•] [ge(mess	elum Iosum	8 -
* 3	0	Achariting By [C]	Stell Gapio - Gapiolo allictos, Carpinelum Grides Loruletosum Lisinke	§ -
(1 / 24)		Ot. By IC IC Stranke P	Stell Carp. allietos, Coryda- Lis inter media-Y	9g -
Esd 3G	=	ν	Ackerstäcken Stell Guerco- alliets, Ulmetum Gorda- Lis inker	90 -
F	<u> </u>	6 - 5 le	Ackerflächen Querco- Ulmetum	8 -
MSM.				المتتا
	١.	0 t d	Vegetation	
	فيموامعر	Bodentyp	geta	
	و	Bg F	ا کی	

Abb. 12. Vegetationsprofil "Kapitelwald - Kammerholz"


Abb. 9. gibt die Verhältnisse in den "Auenrestgehölzen" im Maintal wieder. Inmitten der nach Entwässerung ackerbaulich genutzten Kulturfläche umgeben Waldreste feuchte Senken, die ehemalige Mainläufe ("Altmaine") darstellen. Die höher gelegenen Teile werden von Restbeständen des Hartholzauenwaldes (Querco-Ulmetum, auf Gley-Vega) eingenommen. Ihm ist als Saum das Chaerophylletum bulbosi Tx. 37, als Mantel die Humulus lupulus-Sambucus nigra-Gesellschaft Th. Müll. 74 vorgelagert. Tiefer gelegene, feuchtere Standorte bestockt ein Erlen-Eschenwald, das Pruno-Fraxinetum (auf Vega-Gley), während der bis in den Sommer hinein überstaute Muldengrund von einer silberweidenreichen Gesellschaft (Salicetum albae, auf Naß-gley) besiedelt wird.

Stellvertretend für die ähnlichen Zusammenhänge im "Schopfig " und "Eichig" soll die Gesellschaftsverteilung im "Riedgezeigt werden (Abb. 10). Alle drei Wäldchen ähneln sich im geologischen Unterbau. Flugsanddecken, Talfüllungssedimente und Gipskeuper (Untere Myophorienschichten) folgen streifenförmig aufeinander. Auf schwarzerdeähnlichem Boden (aus Flugsand) findet sich ein Gehölzbestand, der anthropogen fast ausschließlich aus Winterlinde besteht; er läßt sich dem <u>Galio-Carpinetum asaretosum</u> zuordnen. Am Waldrand und in Lichtungen wächst eine bunte Staudengesellschaft, das <u>Geranio</u>-Peucedanetum, hier in einer an subkontinental verbreiteten Arten reichen Ausbildung mit Digitalis grandiflora, Potentilla alba u.a.. Eine <u>Berberidion-Gesellschaft</u> bildet den Mantel. Den Übergang zum Erlen-Eschenwald der Unkenbachaue besiedelt die frischezeigerreiche Variante des genannten Eichen-Hainbuchenwaldes (<u>Galio-Carpinetum</u> <u>asaretosum</u>, <u>Stachys</u> <u>sylvatica-Variante</u>), in der die Esche schon eine gewisse Rolle spielt. In der Aue stockt der Wald auf echtem, vom Erlenbruchwald (Carici elongatae-Alnetum) geschaffenem Niedermoortorf, der durch Entwässerung und Bachregulierung heute von einem Erlen-Eschenwald (<u>Pruno-Fraxinetum</u>) eingenommen wird. Entlang der Waldwege findet man hier eine übermannshohe <u>Hochstaudenge</u>sellschaft mit Sonchus paluster und zahlreichen Convolvulion-Arten. Über eine deutliche Randstufe gelangt man in die höher gelegenen (ehemaligen) Teile der Aue. Die hier anstehende Seekreide zeigt eine unterschiedlich mächtige (10-30 cm), vererdete Niedermoordeckschicht, eine eindrucksvolle Folge der Entwässerung! Der Bodentyp könnte als "Phäno-Rendzina" bezeichnet werden. Der hier wachsende Eichen-Hainbuchenwald läßt sich dem *Galio-Carpinetum asaretosum* zuordnen. In Lichtungen stößt man auf pfeifengrasreiche Wiesen (Molinion) mit zahlreichen seltenen Arten. Der östlich angrenzende Gipskeuperausstrich (Bodentyp: Pelosol) zeigt wüchsige Waldbilder. Die Gesellschaften gehören zum Galio-Carpinetum allietosum (Hang) und zum <u>Galio-Carpinetum</u> <u>aretosum</u> (Kuppe). Eingeschaltete Gipslinsen äußern sich in zahlreichen Dolinen, die eine interessante Sumpfvegetation mit Thelypteris palustris zeigen. Der nach Osten hin bald mächtiger werdende Flugsandschleier (Braunerde-Pelosol) führt noch zu keiner Gesellschaftsänderung. Den Abschluß gegen die Ackerfläche bildet wieder eine Berberidion-Gesellschaft (mit Lactuca quercina).

Typisch für die Verhältnisse im Bereich des Oberen Lettenkeupers mit Oberem Sandstein, wie sie großflächig am Südrand des AG auftreten, ist die Verteilung der Waldgesellschaften im *Ansbach* (Abb. 11). Ähnliches gilt auch für "Kämmlingsberg" und "Gehäu". Anstehender Oberer Sandstein (Härtlingskuppen!)

führt zu einem charakteristischen Nebeneinander von Galio-<u>Carpinetum luzuletosum</u> (Hangkante: Ranker-Braunerde), <u>Galio-Carpinetum typicum</u> (Verebnungen: Braunerde) und <u>Galio-Car</u> <u>pinetum potentilletosum</u> (Ackerrandnähe, Südexposition, Ton-linsen: Braunerde-Pseudogley). Im Steilhangbereich unterhalb seines Ausstrichs liegt nur eine dünne Deckschicht (Erosion!) über den Tonsteinen des Lettenkeupers (Pelosol-Braunerde). Anspruchsvollere Arten können hier in den Beständen des <u>Ga-lio-Carpinetum</u> asaretosum gedeihen. Ausgedehnte Fließerdedek-ken, an denen der Frostschutt des Sandsteins maßgeblich beteiligt ist, überziehen die anschließenden Hänge. Je nach ihrer Mächtigkeit haben sich alle Übergänge zwischen Braunerde und Pseudogley entwickelt, die von wüchsigen Eichen-Hainbuchenwäldern (<u>Galio-Carpinetum</u> <u>typicum</u>, <u>Deschampsia</u> <u>cespito-</u> <u>sa-Variante</u>) besiedelt werden. Talfüllungssedimente am Hangfuß (Tschernitza, Humusgley) betockt der Eschen-Stieleichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum allietosum, Stachys sylvatica-Variante). Nach einem schmalen Flugsandstreifen (Braunerde, Galio-Carpinetum typicum) trifft man in der Marbachaue auf Tschernitza einen Erlen-Eschenwald an, in dem der Bärlauch im Frühlingsaspekt absolut vorherrscht (Pruno-Fraxinetum, Allium ursinum-Ausbildung).

Zuletzt soll noch auf die Gesellschaftsverteilung im Bereich der ausgedehnten Terrassensedimente eingegangen werden, wie sie uns im "Kapitelwald" und "Kammerholz" begegnen (Abb. 12). An die Mainaue mit Resten des Hartholzauenwaldes (Querco-Ulme-Vega-Gley) grenzt im Osten die Niederterrasse an. Ihren deutlich ausgeprägten Steilabfall gegen die Aue besiedelt ein Eichen-Hainbuchenwald mit zahlreichen subkontinentalen Arten (Stellario-Carpinetum allietosum, Corydalis intermedia-Variante). Im nun folgenden Dünengürtel bestimmen Kiefernforsten (KF) das Bild. Einzelne Laubwaldreste (*Galio-Carpinetum luzu*letosum) auf podsoliger Braunerde grenzen an ihre Ersatzgesellschaft, den Stellaria holostea-KF. Hänge und Köpfe höherer Dünen (Podsol-Braunerde) werden von Beständen des Trennartenfreien KF eingenommen, den der Mensch auf den Standorten des <u>Luzulo-Quercetum</u> typicum geschaffen hat. Auf Anmoorgley, der vielleicht schon als Tschernitza anzusprechen ist, im Bereich eines alten Mainlaufs findet man Entwässerungsstadien eines Erlenbruchwaldes (<u>Carici elongatae-Alnetum</u>). Absterbende Erlen, Winterlinden und Stieleichen in der Umgebung lassen sich wohl auf die Grundwasserabsenkung zurückführen. Die im Osten folgende, ausgedehnte Fläche der (flugsandschleierbedeckten) Nieder- und Mittelterrasse (podsolige Braunerde) gehört zum Herrschaftsbereich des Eichen-Hainbuchenwaldes mittelgut basenversorgter Böden (Galio-Carpinetum luzuletosum). Waldwegen wachsen öfters schöne Bestände des <u>Agrimonio-Vi-cietum cassubicae</u>. Basenarmes Hangzugwasser und menschliche Bodendegradation haben parkartig lichte, moorbirkenreiche Stieleichenwälder geschaffen, in deren Krautschicht im Sommer und Herbst das Pfeifengras dominiert. Sie lassen sich dem <u>Luzulo-Quercetum molinietosum</u> zuordnen. Nach einem schmalen Übergangsbereich mit besserwüchsiger Stieleiche, Stellaria holostea sowie Anemone nemorosa in der Krautschicht grenzt im auffälligen Kontrast ein artenreicher Eichen-Hainbuchenwald an, der soziologisch zum Stellario-Carpinetum aretosum gehört.



O Eichen-Hainbuchen (-Winterlinden)-Gebiete

Q > 30

Die Rotbuche spielt in den Wäldern kaum eine Rolle und fehlt vielfach ganz. Vor allem in den östlichen Landschaften ist die Winterlinde am Aufbau des Waldes wesentlich beteiligt. Vorherrschende natürliche Waldgesellschaft: Galio-Carpinetum, z. T. in einer subkontinentalen Rasse mit Melica picta.

Steigerwald-Vorland und südliches Maindreieck Grabfeld

Maintal zwischen Marktbreit und Karlstadt (heute waldfrei) Taubergebiet um Tauberbischofsheim

Eichen-Buchen-Hainbuchen-Gebiete

Q = 21 - 30

Von Natur aus spielt die Rotbuche eine bedeutende Rolle und herrscht auf weiten Strecken vor (Luzulo-, Melico- und Carici-Fagetum). Der Eichen-Hainbuchen-Wald (Galio-Carpinetum) ist jedoch edaphisch, lokalklimatisch oder durch die Mittelwaldwirtschaft bedingt, ehenfalls weit verbreitet.

 Δ a) Gebiete, in denen schon geringe edaphische Unterschiede und anthropogene Einflüsse den Buchenwald zugunsten des Eichen-Hainbuchen-Waldes zurückdrängen. Q=26-30

Fränkische Platte östliches Bauland Südsteigerwald

lack a b) Gebiete, in denen die Buche schon recht vital ist, daneben aber auch die Hainbuche noch häufig vorkommt. Q=21-25

Mittlerer und nördlicher Steigerwald

Haßberge

Spessart-Rhön-Vorland

westliches Bauland

einige hochgelegene Gebiete der Fränkischen Platte (z. B. Hesselbacher Waldland)

■ Buchen(-Eichen)-Gebiete

Q = 15 - 20

Von Natur herrscht die Buche vor, die Eiche ist wohl beigemengt, heute aber z. T. anthropogen überrepräsentiert. Natürliche Waldgesellschaft: Luzulo-Fagetum, auf reicheren Böden Melico-Fagetum.

Spessart

Südrhön

höchste Teile des Nordsteigerwaldes (ohne Klimastation)

Abb. 13. Ellenbergquotienten in Mainfranken (aus HOFMANN 1968)




Abb.14. Potentielle natürliche Vegetation im südlichen Schweinfurter Becken

V. POTENTIELLE NATURLICHE VEGETATION (Abb. 14)

Auf Anregung von Herrn Dr. Bohn (Bonn) hin, soll hier der Versuch unternommen werden, Aussagen über die "(heutige) potentielle natürliche Vegetation" (p.n.V., TÜXEN 1956) des südlichen Schweinfurter Beckens zu machen. Das ist relativ leicht möglich, da auf beinahe allen geologisch-pedologischen Substraten, die im AG vorhanden sind, auch naturnahe Waldgesellschaften vorkommen, die Rückschlüsse auf die potentielle natürliche Bestockung zulassen.

Nach HOFMANN (1968,1985, vgl. Abb. 13) liegt das AG mit einem "Ellenbergquotienten": $Q = \frac{\text{mittlere Temperatur des wärmsten Monats}}{Jahresaumme der Niederschläge} \text{mal } 1000$

von 32 schon ganz im Eichen-Hainbuchen(-Winterlinden)-Gebiet, in dem die Rotbuche in der p.n.V. keine oder nur eine geringe Rolle spielen würde. In Übereinstimmung damit findet sich keine Verjüngung bei den wenigen forstlich eingebrachten Rotbuchenhorsten.

So dürften Eichen-Hainbuchenwälder in einem Großteil des AG die p.n.V. darstellen. Ihr mögliches Siedlungsgebiet ist heute durch Grundwasserabsenkungen beträchtlich vergrößert worden. Das Stellario-Carpinetum würde heute wohl auch größere Teile der Maintalaue und des Talfüllungsbereichs einnehmen. Feuchtere Stellen blieben hier Pruno-Fraxinetum, Querco-Ulmetum sowie <u>Carici elongatae-Alnetum</u> vorbehalten. Zwar besitzt das <u>Stellario-Carpinetum</u> auch im **Gipskeuperbereich** einige Wuchsorte auf feuchten-frischen Böden, hier dürften aber die frühjahrsfeuchten Ausbildungen des Gallo-Carpinetum (G.-C. allietosum, G.-C. aretosum) bei weitem vorherrschen. Eingestreut kämen das Carici elongatae-Alnetum in Dolinen, das Clematido-Quercetum im sonnenexponierten Steilhangbereich vor. Der Komplex von Nieder- und Mittelterrasse sowie die mächtigeren **Flugsande** stellt die Domäne des <u>Galio-Carpinetum luzule-</u> <u>tosum</u> dar, nur im Bereich höherer Dünen vom <u>Luzulo-Quercetum</u> typicum begleitet. Galio-Carpinetum typicum im gesetzmäßigen Wechsel mit Galio-Carpinetum asaretosum sind als potentielle Waldgesellschaften im Ausstrichbereich des Oberen Lettenkeupers (Obere Tonstein-Gelbkalk-Folgen + Oberer Sandstein) anzusehen. Da der großflächig oberflächlich anstehende Grenzdolomit fast zur Gänze unter Ackernutzung liegt, bereitet die Ansprache der p.n.V. hier einige Schwierigkeiten. Die wenigen Restwäldchen zeigen das <u>Galio-Carpinetum asaretosum</u>, teilweise auch das Galio-Carpinetum aretosum.

Eine Zusammenschau der Geologie, Böden, Nutzung und heutigen potentiellen natürlichen Vegetation des südlichen Schweinfurter Beckens gibt noch einmal Abb. 15.

VI. GEDANKEN ZUM NATURSCHUTZ

Wie bereits erwähnt, befinden sich fast alle Waldungen im AG in ± geregelter Überführung. Aus wissenschaftlichen Gründen ist das natürlich interessant, weil zu beobachten ist, daß dabei nicht wie in anderen Gebieten die Rotbuche die Führung übernimmt, sondern sich geschlossene, optimalphasenähnliche Eichen-Hainbuchen-Hallenwälder entwickeln. Andererseits werden lichtbedürftigere Pflanzenarten – hier ist vor allem an Origanetalia- und Molinietalia-Arten zu denken – in lichtere

Bereiche abgedrängt. Hier erlangen Waldränder, Forstwege, Windwurflücken etc. größte Bedeutung als Rückzugs- und Reproduktionsgebiete! Weisen diese Strukturen eine bestimmte Mindestausdehnung auf und sind sie beispielsweise durch einen - nicht befestigten! - Wirtschaftsweg von der landwirtschaftlichen Nutzfläche getrennt, so enthalten sie im AG fast immer floristisch wie vegetationskundlich interessante Pflanzengesellschaften, eine Feststellung, die für Bestände auf sämtlichen geologischen Substrate gilt.

Eine gezielte Unterschutzstellung solcher Kleinbiotope dürfte nur in Ausnahmefällen möglich sein. Wichtig ist daher, sich ihrer Bedeutung bewußt zu sein und sie wenn immer möglich durch eine Pufferzone vor Eutrophierung und Herbizideinwirkung zu schützen. Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang vor allem den erwähnten unbefestigten Wirtschaftswegen zu. Auf ihre Erhaltung ist deshalb besonderer Wert zu legen. Das Offenhalten kleinerer Lichtlücken in geschlossenen Waldungen, die Herausnahme einzelner Bäume und Sträucher im Waldrandbereich, um Saumbuchten zu schaffen, und die Beibehaltung der Mittelwaldwirtschaft auf kleinerer Fläche (wie im "Riedholz" versucht wird) sind relativ bescheidene Mittel, um neuen oder vergrößerten Lebensraum für zahlreiche seltene photophile Tier- und Pflanzenarten zu schaffen, die anderswo längst verschwunden sind.

Hier noch eine Liste derjenigen Wälder, in deren Bereich die angesprochenen Maßnahmen besonders dringend, aber auch lohnend sein dürften; hier kommen einerseits noch interessante Pflanzensippen vor, andererseits wurden durch die Intensivierung der Landwirtschaft waldrandnahe Kleinstrukturen, wie Waldmäntel, Raine und unbefestigte Wege beschädigt oder ganz entfernt:

- "Spitalholz": alle Ränder und Lichtungen im und um den Wald gleichermaßen interessant; thermophile Saumgesellschaften (Geranion sanguinei mit Ranunculus polyanthemoides, Potentilla rupestris, Potentilla thuringiaca u.v.a.), bodenfeuchte Hochstaudenfluren (Filipendulion mit Veronica longifolia); Molinion-Gesellschaften mit Crepis m.succisifolia; Gefährdung durch Verlust der Pufferzonen: Ackerflächen grenzen unmittelbar an Wald!
- "Kammerholz" (Südrand): Waldränder gegen bebaute Gebiete in Schwebheim; schönes Beispiel, wie auf den hier vorhandenen wechselfeuchten Böden durch gezielte Auflichtungsmaßnahmen Lebensraum für heliophile Pflanzengesellschaften geschaffen wurde: Geranion sanguinei mit Potentilla alba, basikline Molinion-Gesellschaften etc.;
- "Esbachholz": Waldränder v.a. gegen Westen und Süden; thermophile Saumgesellschaften (*Geranion sanguinei*), schön und großflächig entwickelt! Unbefestigte Wirtschaftswege beibehalten!
- "Eichig/Schopfig": Waldränder und Lichtungen; auf schweren, wechselfeuchten Tonböden Molinion-Gesellschaften mit lichtem Baumschirm (vgl. Selino-Quercetum Meusel et Niemann 71!); Geranion sanguinei-Säume mit Wechselfeuchtezeigern (ehemaliger Wuchsorte von Cnidium dubium!); Gefährdung durch Aufforstung mit standortsuntauglichen Nadelhölzern; wegbegleitende Gräben lassen zu wenig Raum für photophile Arten!

"Kapitelwald" (Südrand gegen Röthlein): Waldrand mit sandigem Boden; Wuchsorte von Omphalodes verna, Corydalis intermedia, Gagea minima, Gagea pratensis; Reste von Sandtrockenrasen; unbedingt auf Erhalt der waldrandbegleitenden Wege achten!

"Gehäu" (v.a. Westrand): thermophile Saumgesellschaften (Geranion sanguinei) mit Potentilla alba, Digitalis grandiflora, Vicia cassubica u.a.; Vorsicht bei Straßenmanagement-Maßnahmen (Herbizideinsatz, zu häufiges Mähen!);

"Ansbach" (v.a. Südrand): thermophile Mantelgesellschaften (Pruno-Ligustretum, selten im AG!); Geranion sanguinei-Säume; Vorsicht bei Anlage neuer Wege!

VII. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit werden die Waldgesellschaften des südlichen Schweinfurter Beckens – ein in 200-230 m NN liegender Teilbereich der "Fränkischen Platte" mit tonig-lehmigen Keuper- sowie sandigen Terrassenböden und trocken-warmem Klima – beschrieben. Sommertrockenheit und häufige Spätfröste erklären das fast völlige Fehlen der Rotbuche in den Wäldern; nach pollenanalytischen Untersuchungen (ZEIDLER 1939) war die Baumart in der Postglazialzeit nur unerheblich im AG vertreten. Als für die Bundesrepublik seltener Fall bilden hier Eichen-Hainbuchenwälder die zonale Vegetation.

Insgesamt ca. 250 Vegetationsaufnahmen nach der Methode von BRAUN-BLANQUET, die in vollständigen Tabellen wiedergegeben werden, bilden die Grundlage für die Gesellschaftsbeschreibungen. Bodenkundliche Untersuchungen dienten der standörtlichen Charakterisierung der unterschiedenen Vegetationseinheiten.

In einem einleitenden Teil werden die topographischen, geologischen, pedologischen, klimatischen und pflanzengeographischen Verhältnisse des Arbeitsgebietes besprochen, außerdem wird ein Überblick über den Besiedlungsgang und die Waldbewirtschaftung gegeben.

Folgende Waldgesellschaften konnten im Schweinfurter Becken nachgewiesen werden:


Die bei weitem größte Fläche nehmen in der realen wie potentiellen natürlichen Vegetation die Gesellschaften des *Carpinion* ein, das einer subkontinentalen Rasse angehört. Der Verband ist vertreten durch das:

- Stellario-Carpinetum auf ganzjährig frischen, basenreichen Böden. Die Allium ursinum-SA nimmt dabei noch basenreichere, oft kalkbeeinflußte Standorte ein als die Arum maculatum-SA.
- <u>Galio-Carpinetum</u> auf Böden mit sommerlicher Oberbodenaustrocknung. Die Gesellschaft läßt sich in drei durch den Basengehalt der besiedelten Böden differenzierte Gruppen gliedern, innerhalb derer sich mehrere wasserhaushaltsbedingte Varianten ausscheiden lassen.

Die <u>Asarum europaeum-SA-Gruppe</u> besiedelt basenreiche Standorte, deren Trophie in Richtung G.-C. allietosum ursini -->

Böden und Potentielle natürliche Vegetation im Südlichen Schweinfurter-Becken	ine), (()	Podsolige Barm Ranker - Brannerden, Meso-Erlenphe Brannerden (Beerer Sandstein ensids) Extrophe erder, on Dineral Brannerder - Perudoglogo (Filiparden), Pelande, Brannerde - Perudoglogo Brannerden, Federalizen Radiol-Brannerde - Federalizen	MONDON MANAGEMENT OF THE PARTY	verbreild Flug- verbreild schiffig-sandige fließerden, verbreild sandige verbreild tehnig-lanige fließerden, sand, örllich flugsand Deckschichten Orlich i Bichmischer Orlich i Bichmischer Dinen Indonen falozaine falozain	\mathcal{A}
Geologie , Böden und Polentielle na	Acker Acker west solved) Foots (Meles) Galio- Carpinelum öllich Punno-Frasinelum (Allmaine), Carpinelum e dsardosum Querco-Umelum intelum önlich Luzudosum, n Guerco-Umelum önlich Luzudosum, n Guercelum fyp. Garcelum fyp. Garcelum fyp.	Parchamerdon Rogen, Parchamer Rassentinen, Glege (Altmane) erden, on Dinner Braner Badent Braner Bra	Montallatoria Ministralia	t Flug-	Popil 10-fach überhähl

Abb.15. Geologisch - pedologisch - vegetationskundliches Transekt durch das südliche Schweinfurter Becken



G.-C. aretosum --> G.-C. asaretosum langsam abnimmt.

Innerhalb dieser Subassoziationen lassen sich eine Serratula tinctoria-Variante auf wechselfeuchten, eine Trennartenfreie Variante auf mäßig frischen, eine Stachys sylvatica-Variante auf frischen und eine Filipendula ulmaria-Variante auf mäßig feuchten Böden unterscheiden.

Das <u>Galio-Carpinetum typicum</u> besiedelt Böden mit einer Basenversorgung, die zwischen mittel und gut steht. Hier läßt sich eine Trennartenfreie Variante auf mäßig frischen von einer <u>Deschampsia cespitosa-Variante</u> auf frischen Böden trennen.

Die \underline{Luzula} $\underline{luzuloides}$ -SA-Gruppe findet sich auf Böden mittlerer Basenversorgung. Es kann ein G.-C. luzuletosum luzuloides (Ersatzgesellschaft: Stellaria holostea-Kiefernforst) auf mäßig trockenen von einem G.-C. potentilletosum albae auf wechseltrockenen Standorten abgetrennt werden.

Gesellschaften des **Alno-Ulmion** finden sich lokal in grundwassernahen Bereichen. Es kommen vor das:

- Querco-Ulmetum in der Mainaue auf ganzjährig frischen bis feuchten, nährstoff- und basenreichen Böden, die früher durch Überflutungen episodisch gedüngt wurden.
- <u>Pruno-Fraxinetum</u> auf feuchten, nie oder nur selten überfluteten Böden guter Basenversorgung. In Richtung P.-F. allietosum ursini --> P.-F. typicum --> P.-F. caricetosum nimmt dabei der Feuchtegrad des Bodens zu.

Quercion robori-petraeae-Gesellschaften findet man nur sehr lokal. Vorhanden sind das:

- <u>Luzulo-Quercetum molinietosum arundinaceae</u> auf ursprünglich mesotrophen, durch anthropogene Degradation basenverarmten, wechselfeuchten Böden. Warscheinlich handelt es sich um Ersatzgesellschaften von *Carpinion*-Wäldern.
- <u>Luzulo-Quercetum typicum</u> auf den trockenen, oligotrophen Böden von Flugsanddünen. Heute großflächig durch den Trennartenfreien Kiefernforst ersetzt.

Quercion pubescenti-petraeae-Gesellschaften fanden sich nur mit einem Beispiel. Es handelt sich um das:

<u>Clematido-Quercetum</u> auf flachgründigem, eutrophen, wechseltrockenen Tonboden'im sonnenexponierten Steilhangbereich des Gipskeupers.

Ganzjährig nasse Böden mittlerer bis guter Basenversorgung besiedeln *Alnetalia*-Gesellschaften. Im AG sind sie vertreten durch das:

- <u>Salicetum cinereae</u> (**Salicion cinereae**) mit einem Beispiel aus dem Randbereich eines Großseggenbestandes auf mesotrophem Torfboden und durch das:
- <u>Carici elongatae-Alnetum</u> (**Alnion glutinosae**) mit einer Trennartenfreien Ausbildung auf meso-eutrophen, anmoorigen Böden im Bereich von Dolinen und einer <u>Calystegia sepium-Ausbildung</u> auf durch ziehendes Grundwasser beeinflußten, eutrophen mineralischen und organischen Naßböden.

Kleinere Restbestände von Silberweidenwäldern ($\underline{Salicetum}$ \underline{al} - \underline{bge}) sind noch im Maintal anzutreffen. Ihre Böden werden heute nicht mehr überflutet, was sich in einer sichtbaren Umwandlung in Richtung Pruno-Fraxinetum bemerkbar macht.

Gehölzfreie Pflanzengesellschaften, die im Kontakt zu Wäldern stehen, werden kurz erwähnt. Basenreiche Keuperböden besiedelt eine subkontinentale Rasse des <u>Geranio-Peucedanetum</u>, während für mesotrophe Sandböden das für subkontinentale Gebiete bezeichnende <u>Agrimonio-Vicietum cassubicae</u> typisch ist. Tonreiche Dolinenfüllungen im Gipskeuperbereich zeigen eine <u>Fuphorbia palustris-Carex acutiformis-Gesellschaft</u>; möglicherweise handelt es sich hierbei um natürliche, baumfreie Lichtungen.

In einem weiteren Abschnitt wird eine Zusammenschau der unterschiedenen Waldgesellschaften versucht. Eine Stetigkeitstabelle verdeutlicht die soziologischen, ein Reaktion-Feuchte-Diagramm die ökologischen Verwandtschaftsverhältnisse. Mit Hilfe der Ellenbergzahlen werden ökologische Kenngrößen für die einzelnen Gesellschaften berechnet und miteinander verglichen. Mehrere geologisch-pedologisch-vegetationskundliche Transsekte verdeutlichen die Anordnung der Gesellschaften im Gelände. Bemerkungen zur heutigen potentiellen natürlichen Vegetation beenden dieses Kapitel. Die abschließenden Gedanken zum Naturschutz enthalten Hinweise auf die bei den Geländeuntersuchungen aufgefallenen floristisch wie vegetationskundlich besonders interessanten Lokalitäten; Vorschläge für deren Erhaltung werden unterbreitet.

VII. LITERATUR

- ARBEITSKREIS FÜR BODENSYSTEMATIK DER DEUTSCHEN BODENKUNDLI-CHEN GESELLSCHAFT (1985): Systematik der Böden der Bundesrepublik Deutschland - Kurzfassung - . Mitt. Deutsche Bodenk. Ges. 44, 90 S., Hannover
- ARBEITSGRUPPE BODENKUNDE (1982): Bodenkundliche Kartieranleitung. 3. Aufl., 331 S., Münster-Hiltrup
- BOHN, U: (1981): Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200000. Potentielle natürliche Vegetation. Blatt CC 5518 Fulda. Schr. Reihe Vegetationskunde 15, 330 S., Bonn - Bad Godesberg
- BODEUX, A. (1955): Alnetum glutinosae. Mitt. flor.-soz. Arbeits-gem. N.F. 5: 114-137, Stolzenau/Weser
- BORNKAMM, R. und W.EBER (1967): Pflanzengesellschaften der Keuperhügel bei Friedland (Kreis Göttingen). Schr. Reihe Vegetationskunde 2: 135-160, Bonn Bad Godesberg
- BRACKEL, W. v. und R.ZINTL (1983): Die Pflanzengesellschaften der Ehrenbürg bei Forchheim. Hoppea. Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 41: 205-288, Regensburg
- BRAUN-BLANQUET, J. (1932): Zur Kenntnis nordschweizerischer Waldgesellschaften. Beih. Bot. Cbl. 49: 7-42, Dresden
- (1964): Pflanzensoziologie. 3. Aufl., 865 S., Wien New York
- DINTER, W. (1982): Waldgesellschaften der Niederrheinischen Sandplatten. Dissertationes Botanicae 64, 111 S., Vaduz
- DIERSCHKE, H. (1974): Saumgesellschaften im Vegetations- und Standortsgefälle an Waldrändern. Scripta Geobotanica 6, 221 S., Göttingen
- (1986): Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in Wäldern Süd-Niedersachsens III. Syntaxonomische Gliederung der Eichen-Hainbuchenwälder, zugleich eine Übersicht der Carpinion-Gesellschaften Nordwest-Deutschlands. Tuexenia 6: 299-323, Göttingen
- EHWALD, E. (1950): Ergebnisse einer Standortskartierung im südthüringischen Keupergebiet. Forstwiss. Cbl. **69**: 299-348, Hamburg und Berlin
- ELLENBERG, H. (1939): Über Zusammensetzung, Standort und Stoffproduktion bodenfeuchter Eichen- und Buchen-Mischwaldgesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. Niedersachsen 5, 129 S., Hannover
- (1956): Aufgaben und Methoden der Vegetationskunde. In:
 H.WALTER: Einführung in die Phytologie 4: Grundlagen der Vegetationsgliederung 1. Teil. 136 S., Stuttgart
- (1982): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. 3. Aufl., 989 S., Stuttgart

- EMMERT, F. und G.v.SEGNITZ (1852): Flora von Schweinfurt, Schweinfurt
- ETTER, H. (1943): Pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen an schweizerischen Laubwäldern. Mitt. schweiz. Anst. forstl. Versuchswesen 23(1): 7-132, Zürich
- FABER, A. (1933): Pflanzensoziologische Untersuchungen in Süddeutschland. Über Waldgesellschaften in Württemberg. Bibliotheca Botanica 108, 68 S., Stuttgart
- FIEBINGER,S. (1982): Pflanzengesellschaften. In: W.KÜNNETH (Hrsg.): Das Ökosystem Wald in Westmittelfranken am Beispiel des Kehrenberges. Mitt. Staatsforstverw. Bayerns 42: 24-40, München
- FÖRSTER, M. (1979): Gesellschaften der xerothermen Eichenmischwälder des deutschen Mittelgebirgsraumes. Phytocoenologia 5(4): 367-446, Stuttgart - Braunschweig
- FRAHM, J.-P. und W. FREY (1983): Moosflora. 522 S., Stuttgart
- GAUCKLER, K. (1957): Die Gipshügel in Franken, ihr Pflanzenkleid und ihre Tierwelt. Abh. NHG Nürnberg 29(1), 92 S., Neustadt/Aisch
- GIESSNER, K. (1982): Mainfranken, ein hydrologisches Problem. In: Regionalgeographische Untersuchungen in Mainfranken. Würzburger Geogr. Arb. 57: 109-140, Würzburg
- GRÜNBERG, H. und H. SCHLÜTER (1957): Waldgesellschaften im Thüringischen Schiefergebirge. Archiv für Forstwesen 6(11/12): 861-932, Berlin
- HARTMANN, F.K. (1968): Über die pflanzengeographisch-systematische Abgrenzung und synökologische Stellung der Assoziationen und Subassoziationen der Eichen-Hainbuchenwälder im westlichen und mittleren deutschen Berg- und Hügelland einschließlich des fränkisch-thüringischen Raumes. Feddes Rep. 79(1/2): 87-97, Berlin
- (1974): Mitteleuropäische Wälder. 214 S., Stuttgart
- HEROLD, A., HÜMPFER, W., LAMPING-WEBER G. und H. PHILIPP-SCHAU-WECKER (1969): Der Landkreis Schweinfurt. Bd. 1., 128 S., Schweinfurt
- HERRMANN, A. (1984): Geologischer Aufbau und Oberflächenformen. In: Landkreis Kitzingen: 26-35, Kitzingen
- HESMER, H. (1932): Die Entwicklung der Wälder des nordwestdeutschen Flachlandes. Zugleich ein Beitrag zur Frage seiner natürlichen Waldgesellschaften. Zeitschr. Forst- und Jagdwes. 64(10): 577-607, Berlin
- HOFMANN, W. (1964/65): Laubwaldgesellschaften der Fränkischen Platte. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 5/6: 3-194, Würzburg

- (1967): Laubwaldgesellschaften des Spessarts, der Fränkischen Platte und des nördlichen Steigerwaldvorlandes Vegetationskundliche Ergebnisse und Probleme. Unveröffentliche Vorträge des Vereins für Forstliche Vegetationskunde 1965-1967: 1-31. (vorhanden in der Bibliothek des Geographischen Instituts der Universität Würzburg)
- (1968): Vitalität der Rotbuche und Klima in Mainfranken.
 Feddes Rep. 78(1/3): 135-137, Berlin
- (1983): Thesen zur potentiellen Vegetation der Mainfränkischen Platten und der umgebenden Landschaften. Naturwiss. Jahrbuch 1: 11-18, Schweinfurt
- (1985): Führer zur vegetationskundlichen Exkursion zum Anstieg des Steigerwalds bei Gerolzhofen. Unveröff. Mskr.,
 22 S. (vorhanden in der Bibliothek des Geogr. Inst. Univ. Würzburg)
- JAHN.G. (1984): Eichenmischwälder in Nordwestdeutschland naturnah oder anthropogen? Phytocoenologia 12(2/3): 363-372, Stuttgart und Braunschweig
- KAISER, E. (1958): Das Grettstädter Reliktengebiet bei Schweinfurt, Tempe Grettstadtiensia. Ber. Bayer. Bot. Ges. 32: 25-43. München
- KAPPEN, L. und E.D. SCHULTZE (1979): Auenwaldreste des Mains im Garstädter Holz und Elmuß bei Schweinfurt (Unterfranken). Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 21: 181-195, Göttingen
- KNOCH, K. (1952): Klima-Atlas von Bayern. 195 S., Bad Kissingen
- KORNECK,D. (1962a): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet I. Das Molinietum medioeuropaeum. Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl. 21(1): 55-77. Karlsruhe
- (1962b): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet II. Die Molinieten feuchter Standorte. Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl. 21(2): 165-190, Karlsruhe
- (1963): Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet III. Kontaktgesellschaften. Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl. 22(1): 19-44, Karlsruhe
- KRAUSCH, H.D. (1970): Die Pflanzengesellschaften des Stechlinsee-Gebietes. V. Wälder, Hecken und Saumgesellschaften. Limnologica 7(2): 397-454. Berlin
- KREH, W. (1938): Verbreitung und Einwanderung des Blausterns (Scilla bifolia) im mittleren Neckargebiet. Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württ. 94: 41-94, Stuttgart

- KRISO, K. (1958): Entstehung, Aufbau und Leistung von Eichen-Hainbuchenwäldern in Süddeutschland. Forstwiss. Forsch. 9, 78 S., Hamburg und Berlin
- KÜNNE, H. (1969): Laubwaldgesellschaften der Frankenalb. Dissertationes Botanicae 2, 177 S., Lehre
- LANDKREIS SCHWEINFURT (1985): 128 S., Schweinfurt
- LANGE, O.L. und H.KANZOW (1965): Wachstumshemmung an höheren Pfanzen durch abgetötete Blätter und Zwiebeln von Allium ursinum. Flora, Abt.B. **156**: 94-101, Jena
- LIBBERT, W. (1932/33): Die Vegetationseinheiten der Neumärkischen Staubecken-Landschaft. Teil 2. Verh. Bot. Ver. Brandenburg 74: 229-348, Berlin-Dahlem
- (1939): Pflanzensoziologische Untersuchungen im mittleren Kocher- und Jagsttale. Veröff. Württ. Landesstelle f. Naturschutz 15: 65-102, Stuttgart
- LOHMEYER, W. (1951): Die Pflanzengesellschaften der Eilenriede bei Hannover. Angewandte Pflanzensoziologie 3, 72 S., Stolzenau/Weser
- (1967): Über den Stieleichen-Hainbuchenwald des Kern-Münsterlandes und einige seiner Gehölz-Kontaktgesellschaften. Schr.Reihe Vegetationskunde 2: 161-180, Bonn -Bad Godesberg
- (1970): Über einige Vorkommen naturnaher Restbestände des Stellario-Carpinetum und des Stellario-Alnetum im westlichen Randgebiet des Bergischen Landes. Schr. Reihe Vegetationskunde 5: 67-74, Bonn Bad Godesberg
- MARSTALLER, R. (1976): Zur Kenntnis der Bacheschenwälder (*Alno-Padion-*Verband) im Muschelkalkgebiet Ost- und Mittelthüringens. Veröff. Mus. Gera, Naturwiss. R. 4: 25-41, Gera
- (1978): Die Waldgesellschaften des Ostthüringer Buntsandsteingebietes. Teil 1. Wiss. Ztschr. Friedrich-Schiller-Univ. Jena, Math.-Nat. R. 27(1): 35-65; Jena
- (1981): idem, Teil 3: Die Wälder des Carpinion-Verbandes.
 ibid. 30(5): 671-729, Jena
- (1984): idem, Teil 4: Die Wälder des Alno-Padion-Verbandes ibid. 33(3): 329-369, Jena
- (1985): idem, Teil 5: Die Wälder des Quercion robori-petraeae-Verbandes. ibid. 34(4): 537-583, Jena
- MATUSZKIEWICZ, W. und A. (1985): Zur Syntaxonomie der Eichen-Hainbuchenwälder in Polen. Tuexenia 5: 473-489, Göttingen
- MAYER, H. (1977): Waldbau auf soziologisch-ökologischer Grundlage. 483 S., Stuttgart und New York
- MEIEROTT, L. (1987): Neues und Bemerkenswertes zur Flora Unterfrankens. Ber. Bayer. Bot. Ges. 57: 81-94, München

- MEISTER, H.-P. (1983): Vegetationskundliche Untersuchungen unterfränkischer Biotope. Sukzessionsstadien in Weinbergsbrachen des Werntals. Diplomarbeit, 62 S., Würzburg
- MERKEL, J. (1982): Die Vegetation der Naturwaldreservate in Oberfranken. Ber. ANL 6: 135-230, Laufen
- MEUSEL, H. (1935): Die Waldtypen des Grabfeldes und ihre Stellung innerhalb der Wälder zwischen Main und Werra. Beih. Bot. Cbl. 53(1): 175-251, Dresden
- (1951/52): Die Eichenmischwälder des mitteldeutschen Trokkengebietes. Wiss. Z. Univ. Halle - Math.-Nat. R. 1(1/2): 49-72, Halle
- (1954): Über die Wälder der mitteleuropäischen Löß-Ackerlandschaft. Wiss. Z. Univ. Halle Math.-Nat. R. 4(1): 21-55, Halle
- MEUSEL, H. und E. NIEMANN (1971): Der Silgen-Stieleichenwald (Selino-Quercetum roboris) Struktur umd pflanzengeo-graphische Stellung. Archiv Naturschutz u. Landschaftsforsch. 11(4): 203-233, Berlin
- MÖLLER, H. (1970): Soziologisch-Ökologische Untersuchungen in Erlenwäldern Holsteins. Mitt. Arbeitsgem. Floristik Schleswig-Holstein u. Hamburg 19, 109 S., Kiel
- MOOR, M. (1952): Die Fagion-Gesellschaften im Schweizer Jura. Beitr. geobot. Landesaufnahme Schweiz 31, 201 S., Bern
 - (1958): Pflanzengesellschaften schweizerischer Flußauen. Mitt. schweiz. Anst. forstl. Versuchswesen **34**(4): 221-363, Zürich
- MRAZ, K. (1958): Beitrag zur Stellung des *Potentillo-Quercetum*. Archiv für Forstwesen **7**(9): 703-728, Berlin
- und A.SIKA (1965): Böden und Vegetation der Auewaldstandorte. Feddes Rep., Beih. 142: 5-65, Berlin
- MÜLLER, Th. (1962): Die Saumgesellschaften der Klasse *Trifolio-Geranietea sanguinei*. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 9: 95-140, Stolzenau/Weser
- (1966): Die Wald-, Gebüsch-, Saum-, Trocken- und Halbtrokkenrasen des Spitzbergs. In: Der Spitzberg. Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs 3: 278-475, Ludwigsburg
- (1967): Die geographische Stellung des Galio-Carpinetum und des Stellario-Carpinetum in Südwestdeutschland. Beitrnaturk. Forsch. SW-Deutschl. 26(1): 47-65, Karlsruhe
- (1968a): Die Waldvegetation im Naturschutzgebiet Schenkenwald. Veröff. Landesst. Natursch. und Landschaftspf. Baden-Württemberg 36: 55-64, Ludwigsburg
- (1968b): Die südwestdeutschen *Carpinion*-Gesellschaften. Feddes Rep. **77**(2): 113-116, Berlin

- (1974): Gebüschgesellschaften. In: Das Taubergießengebiet.
 Natur- und landschaftsschutzgebiete Baden-Würrtembergs.
 Bd. 7: 400-421, Ludwigsburg
- und S.GÖRS (1958): Zur Kenntnis einiger Auewaldgesellschaften im Württembergischen Oberland. Beitr. naturk.
 Forsch. SW-Deutschland 17: 88-165, Karlsruhe
- MÜLLER-HOHENSTEIN, K. (1971): Die natürlichen Grundlagen der Landschaften Nordostbayerns. In H.HELLER (Hrsg.): Exkursionen in Franken und Oberpfalz. 3. Aufl., S. 1-20, Erlangen
- NEUHÄUSL,R. und Z.NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA (1967): Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teil der Tschechoslowakei. Folia Geobot. Phytotax. 2: 2-41, Prag
- -- (1969): Übersicht der Carpinion-Gesellschaften der Tschechoslowakei. Feddes Rep. 78: 39-56, Berlin
- (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. Folia Geobot. Phytotax. 7: 225-258, Prag
- NEUHÄUSLOVA-NOVOTNA,Z. (1979): Beitrag zur Kenntnis des *Pruno-Fraxinetum* in der Tschechischen Sozialistischen Republik. Folia Geobot. Phytotax. **14**: 145-166, Prag
- (1965): Waldgesellschaften der Elbe- und Egerauen. Vegetace CSSR A1: 387-517; Prag
- NOIRFALISE, E. (1968): Le *Carpinion* dans 1' Ouest de l'Europe. Feddes Rep. **79**(1/2): 69-85, Berlin
- OBERDORFER, E. (1953): Der europäische Auenwald. Beitr. naturk. Forsch. SW-Deutschl. 12(1): 23-70, Karlsruhe
- (1957): Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Pflanzensoziologie 10, 564 S., Jena
- (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. 5. Aufl.,
 1051 S., Suttgart
- PASSARGE, H. (1953): Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes. Archiv für Forstwesen 2: 1-58, 182-208, 340-383, 532-551, Berlin
- (1956a): Vegetationsuntersuchungen in Wäldern und Gehölzen der Elbaue. Archiv für Forstwesen 5: 339-358, Berlin
- (1956b): Die Wälder des Oberspreewaldes. Archiv für Forstwesen 5: 46-95, Berlin
- (1956c): Die Wälder von Magdeburgerforth (NW-Fläming).
 Wiss. Abh. DAL 18, 112 S., Berlin
- (1957): Waldgesellschaften des nördlichen Havellandes.
 Wiss Abh. DAL 26, 139 S., Berlin
- (1959): Vegetationskundliche Untersuchungen in den Wäldern der Jungmoränenlandschaft um Dargun/Ostmecklenburg. Archiv für Forstwesen 8(1): 1-74, Berlin

- (1960): Waldgesellschaften NW-Mecklenburgs. Archiv für Forstwesen 9(6): 499-541, Berlin
- (1961): Zur soziologischen Gliederung der Salix cinerea-Gebüsche Norddeutschlands. Vegetatio 10: 209-228, Den Haag
- (1962): Waldgesellschaften des Eichenwaldgebietes von SW-Mecklenburg und der Altmark. Archiv für Forstwesen 11(2): 199-241, Berlin
- (1964): Beobachtungen zur soziologischen Gliederung masurischer Eichen-Hainbuchenwälder. Archiv für Forstwesen 13(13): 667-689, Berlin
- (1966): Waldgesellschaften der Prignitz. Archiv für Forstwesen **15**(5/6): 475-504, Berlin
- (1967): Über Saumgesellschaften im nordostdeutschen Flachland. Feddes Rep. 74(3): 145-158, Berlin
- (1977): Potentillo-Quercetum s.1. an der NW-Grenze. Studia phytologica in honorem jubilantis A. O. Horvat,
 S. 101-106, Pecs
- (1979): Über azidophile Waldsaumgesellschaften. Feddes Rep. **90**(7/8): 465-479, Berlin
- und G.HOFMANN (1968b): Pflanzengesellschaften des nordostdeutschen Flachlandes II. Pflanzensoziologie 16, 298 S., Jena
- PESCHECK,C., ROTH,H. und H.W.BÖHME (1975): Einführung in die Vor- und Frühgeschichte am mittleren Main. In: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern. Bd. 27: 22-120, Mainz
- PHILIPPI, G. (1982): Erlenreiche Waldgesellschaften im Kraichgau und ihre Kontaktgesellschaften. Carolinea 40: 15-48, Karlsruhe
- (1983): Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte
 1:25000 6323 Tauberbischofsheim-West. 83 S., Stuttgart
- PRITZEL, E. (1917): Die Grettstädter Wiesen. Ber. Fränk. Ver. Pflanzengeogr. 1917: 83-108, Würzburg
- RABL, A. (1982): Beiträge zur forstgeschichtlichen Entwicklung am Kehrenberg. In: W.KÜNNETH: Das Ökosysthem Wald in Westmittelfranken am Beispiel des Kehrenberges. Mitt. Staatsforstverw. Bayerns 42: 52-61, München
- REICHEL, G. und O. WILMANNS (1973): Vegetationsgeographie. Das Geographische Seminar. Praktische Arbeitsweisen. 210 S., Braunschweig
- REIF, A. (1983): Nordbayerische Heckengesellschaften. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 41: 3-204, Regensburg
- RODI, D. (1959/60): Die Vegetations- und Standortsgliederung im Einzugsgebiet der Lein (Kreis Schwäbisch Gmünd). Veröff. Landesst. Natursch. u. Landschaftspf. Baden-Württemberg 27/28: 76-167, Stuttgart

- RUBNER, H. (1960): Die Hainbuche in Mittel- und Westeuropa. Forsch. zur deutsch. Landesk. 121. 72 S., Bad Godesberg
- RÜHL, A. (1955): Über die Standortsansprüche und das soziologische Verhalten der Schattensegge (*Carex umbrosa*). Allgem. Forst- und Jagdzeitung 126: 204-207, Frankfurt/Main
- RUNGE, F. (1940): Die Waldgesellschaften des Innern der Münsterschen Bucht. Abh. Landesmus. Naturk. Prov. Westfalen 11(2): 71 S., Münster
- RUTTE, E. und N. WILCZEWSKI (1983): Mainfranken und Rhön. Sammlung Geologischer Führer 74, 217 S., Berlin und Stuttgart
- SACHSE, U. (1984): Die Ulmen im Südwesten Berlins (Zehlendorf und Steglitz). Verh. Berl. Bot. Ver. 3: 107-122, Berlin
- SCAMONI, A. (1953): Über lerchenspornreiche Waldgesellschaften im Bereich des Diluviums der DDR. Archiv für Forstwesen 2: 232-244. Berlin
- (1955): Einführung in die praktische Vegetationskunde. 1. Aufl. 222 S. Berlin
- (1960): Waldgesellschaften und Waldstandorte. 3. Aufl.,
 236 S., Berlin
- (1982): Unsere Wälder. 176 S., Berlin
- und H.PASSARGE (1959): Gedanken zu einer natürlichen Ordnung der Waldgesellschaften. Archiv für Forstwesen 8(5): 386-426, Berlin
- SCHIRMER, H. (1955): Die räumliche Struktur der Niederschlagsverteilung in Mittelfranken. Forsch. deutsch. Landesk. 81, 62 S., Remagen
- (1969): Langjährige Monats- und Jahresmittel der Lufttemperatur und des Niederschlages in der BRD für die Periode 1931-1969. Ber. deutsch. Wetterd., Offenbach
- SCHLENKER,G. (1940): Erläuterungen zum pflanzensoziologischen Kartenblatt Bietigheim. 80 S., Stuttgart
- SCHLÜTER, H, (1955): Das Naturschutzgebiet Strausberg. Feddes Rep. Beih. 135: 260-350, Berlin
- (1967): Buntlaubhölzer in kollinen Waldgesellschaften Mittelthüringens. Kulturpflanze 15: 115-138, Berlin
- (1968): Zur systematischen und räumlichen Gliederung des Carpinion in Mittelthüringen. Feddes Rep. 77(2): 117-141, Berlin
- SCHMALE, W. (1984): Untersuchungen zur Floristik und Soziologie der Mittelwälder und Säume am Südostrand der Windsheimer Bucht. Diplomarbeit, Mskr. 115 S., Erlangen
- SCHRETZENMAYR, M. (1950): Die Leitgesellschaft. Forstwiss. Cbl. 69: 662-669, Hamburg und Berlin

- (1961): Die Leitgesellschaft. Archiv für Forstwesen 10(11/12): 1269-1278. Berlin
- SCHUBERT, R. (1972): Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. III. Wälder. Hercynia N.F. 9: 1-34, 106-136, 197-228, Leipzig
- SCHWARZMEIER, J. (1981): Erläuterungen zur geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6027 Grettstadt. 126 S., München
- (1982): Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5927 Schweinfurt. 139 S., München
- SCHWENZER, B. (1968): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 140 Schweinfurt. 47 S.. Bad Godesberg
- SEIBERT, P. (1962): Die Auenvegetation an der Isar und ihre Beeinflussung durch den Menschen. Landschaftspf. und Vegetationsk. 3: 1-120, München
- (1966): Der Einfluß der Niederwaldwirtschaft auf die Vegetation. Anthropogene Vegetation. Ber. Int. Symp. Stolzenau/Weser 1961: 336-346. Den Haag
- STAMM, E. (1938): Die Eichen-Hainbuchenwälder der Nordschweiz. Beitr. geobot. Landesaufn. Schweiz 22. 163 S., Bern
- STÜRZENBERGER, H.A. (1981): Vegetationsanalyse der Auenwaldrestgebiete Elmuß und Garstädter Holz am Main. Zulassungsarbeit, Mskr. 91 S., Würzburg
- TITZE,P. (1969): der Erlensumpfwald im Naturschutzgebiet "Brucker Lache" im Rahmen seiner Kontakt- und Ersatzgesellschaften. Ein floristisch-pflanzensoziologisches Bild. Erlanger Bausteine fränk. Heimatforsch. 16: 135-228, Erlangen
- TRACZYK,T. (1968): Grundriß der regionalen Differenzierung der Eichen-Hainbuchenwälder Polens. Feddes Rep. **79**(1/2): 99-114. Berlin
- TRAUTMANN, W. und W.LOHMEYER (1960): Gehölzgesellschaften in der Flußaue der mittleren Ems. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 8: 227-247, Stolzenau/Weser
- TÜRK, W. (1987): Der Falknershügel bei Tennenlohe Ein bemerkenswerter Fundort anspruchsvoller Pflanzengesellschaften am Rande des Nürnberger Reichswaldes. J. Mitt. NHG Nürnberg 1987, Nürnberg (im Druck)
- TÜXEN,R. (1929/30): Über einige nordwestdeutsche Waldassoziationen von regionaler Verbreitung. Jahrb. Geogr. Ges. Hannover 1929/1939: 55-116, Hannover
- (1937): Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. Niedersachsen 3: 1-170, Hannover
- (1956): Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. Angew. Pflanzensoziologie 13: 4-42, Stolzenau/Weser

- und W.H.DIEMONT (1936): Weitere Beiträge zum Klimaxproblem des westeuropäischen Festlandes. Veröff. Naturwiss.
 Ver. Osnabrück 23: 129-184, Osnabrück
- ULLMANN,I. (1972): Das Zeubelrieder Moor. Pflanzensoziologische und vegetationskundliche Untersuchungen des Naturschutzgebietes. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 13: 5-88, Würzburg
 - (1977): Die Vegetation des südlichen Maindreiecks. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. **36**: 5-190, Regensburg
- und E.BRUMM (1979): Naturschutzprobleme in Unterfranken; dargestellt am Beispiel des NSG Wurmberg-Possenberg. Ber. ANL 3: 76-83, Laufen
- und K.RÖSSNER (1983): Zur Wertung gestörter Flächen bei der Planung von Naturschutzgebieten - Beispiel Spitalwald bei Bad Königshofen im Grabfeld. Ber. ANL 7: 131-140. Laufen
- und R.VÄTH (1978): Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der verschiedenen Gewässertypen im Schweinfurter Raum (Östliches Maindreieck). Ber. Bayer. Bot. Ges. 49: 137-163, München
- VÄTH,R. (1976): Pflanzensoziologische Untersuchungen der Wasserund Ufervegetation verschiedener Gewässertypen im Raum Schweinfurt - Volkach. Zulassungsarbeit, Mskr. 105 S., Würzburg
- WALTER, H. und H.STRAKA (1971): Einführung in die Phytologie. Bd. III/2: Arealkunde. 2. Aufl., 478 S., Stuttgart
- WATTENDORF, J. (1964): Über Hartholz-Auenwälder im nordwestlichen Münsterland (Kreis Steinfurt/Westfalen). Abh. Landesm. Naturk. 26: 3-32, Münster
- WEINERT, E., GROßE, E. und F.SCHABERG (1973): Flora und Vegetation des Bergholzes bei Halle. Hercynia N.F. 10(3): 276-306, Leipzig
- WELSS, W. (1985): Waldgesellschaften im nördlichen Steigerwald Dissertationes Botanicae 83, 175 S., Vaduz
- WILMANNS, O. (1978): Ökologische Pflanzensoziologie. 2. Aufl., 351 S., Heidelberg
- (1980): Rosa arvensis-Gesellschaften mit einer Bemerkung zur Kennarten-Garnitur des Carpinion. Mitt. flor.soz. Arbeitsgem. N.F. 22: 125-134, Göttingen
- WÖRZ, A. (1983): Waldsümpfe und Waldmoore im Mittelmaingebiet. Diplomarbeit, Mskr. 143 S., Würzburg
- ZEIDLER, H. (1939): Untersuchungen an Mooren im Gebiet des mittleren Mainlaufs. Zeitschrift für Botanik 34: 1-66, Jena

- (1957): Vegetationskundliche Fragen im Steigerwaldgebiet.
 Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. 6/7: 264-275, Stolzenau/Weser
- (1982): Waldgesellschaften im Steigerwald. Unveröffentliches Manuskript, Würzburg
- (1983): Boden und Klima auf kleinem Raum. Tuexenia 3: 455-461, Göttingen
- (1984): Pflanzengesellschaften. In: Landkreis Kitzingen: 55-74, Kitzingen
- H.LEIPPERT und R.STRAUB (1969): Die wichtigsten Waldgesellschaften am Schwanberg in ihrer klimatischen und bodenkundlichen Aussage. Mitt. flor.-soz. Arbeitsgem.
 N.F. 14: 398-415, Todenmann über Rinteln
- und R.STRAUB (1959): Die Pflanzendecke. In: BRUNNACKER, K.: Erläuterungen zur Bodenkarte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6227 Iphofen. 162 S., München
- (1967): Waldgesellschaften mit Kiefer in der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation des mittleren Maingebietes. Mitt. flor.-soz. Arbeitgemeinschaft N.F. 11/12: 88-126. Todenmann über Rinteln
- ZÜNDORF, H.-J. (1980): Vegetationskundliche Untersuchungen im oberen Werratal bei Themar. Teil 2: Waldentwicklung und naturnahe Waldgesellschaften. Hercynia N.F. 17: 144-177, Leipzig

IN DEN WALDAUFNAHMEN ERSCHEINEN FOLGENDE ARTEN:

INULA SALICINA
IRIS PSEUDACORUS
JASIONE MONTANA
JUNCUS CONGLOMERATUS
LACTUCA QUERCINA
LAMIUM G. GALEOBDOLON
LAMIUM G. GALEOBDOLON
LAMIUM G. GALEOBDOLON
LAMIUM G. MONTANUM
LAPSANA COMMUNIS
LATHYRUS LINIFOLIUS
LATHYRUS ILINIFOLIUS
LATHYRUS SYLVESTRIS
LATHYRUS SYLVESTRIS
LATHYRUS VERNUS
LEUCORPYUM GLAUCUM
LEUCOJUM VERNUM
LEUCOJUM VERNUM
LIGUSTRUM VULGARE
LILIUM MARTAGON
LISTERA OVATA
LITHOSPERNUM OFFICINALE
LONICERA OVATA
LITHOSPERNUM OFFICINALE
LONICERA OVATA
LITHOSPERNUM CONTENTION
LUZULA CAMPESTRIS
LUZULA DUZULO DIOES
LUZULA MULTIFLORA
LYCHNIS FLOS-CUCULI
LYCHNIS FLOS-CUCULI
LYCHNIS FLOS-CUCULI
LYCHNIS VISCARIA
LYCOPUS EUROPAEUS
LYSIMACHIA NUMMULARIA

LYSIMACHIA VULGARIS
LYTHRUM SALICARIA
MAIJANTHRUM SIFOLIUM
MALUS SYLVESTRIS
MELAMPYRUM PRATENSE
MELAMPYRUM PRATENSE
MELAMPRUM PRATENSE
MELAMPRUM PRATENSE
MELICA PICTA
MELICA PICTA
MELICA PICTA
MENTHA AQUATICA
MENTHA AQUATICA
MENTHA MEVENSIS
MERCURIALIS PERENNIS
MILIUM EFFISUM MERCURIALIS PEKENNIS
MILIUM EFFUSUM
MOENRINGIA TRINERVIA
MOLINIA ARUNDINACEA
MUSCARI BOTRYOIDES
MYCELIS MURALIS
MYOSOTIS SYLVATICA
PARIS QUADRIFOLIA
PARIS QUADRIFOLIA
PEUCEDANUM CHERARIA
PEUCEDANUM CERSELINUM
PEUCEDANUM CERSELINUM
PEUCEDANUM CHERARIA
PICEA BABIES
PIMPINELLA SAVIFRAGA
PINHINELLA SAVIFRAGA
POLATICIOUM SCREEBERI
POA REVIOLIS
POA TRIVIALIS
POLATORIOM SUBSTORTA
POLYGONUM BISTORTA
POLYGONUM
POLYGONUM BISTORM
POLYGONUM BISTORTA
POLYGONUM
POLYGONUM
POLYGONUM
POLYGONUM
POLY

RUMEX ACETOSELLA AGG.
RUMEX SANGUINEUS
SALIX ALBA
SALIX CAPREA
SALIX CINEREA
SALIX CINEREA
SANGUINENT
SALIX CINEREA
SANGUINENT
SCILLA BIFOLIA
SCILLA BIFOLIA
SCIEROPODO JUM PURUM
SCORZONERA HUMILIS
SCIEROPHOLIATIA NODOSS
SCUPELLARIA GALERICULATA
SENDUM T. MANIHUM
SENECIO FUCHSII
SERDATULA TINCTORIA
SILAUM SILAUS
SILENE MULVIANAMARA
SOLINARO VIRGAUREA
SORBUS JULVIANAMARA
SOLINARO VIRGAUREA
SORBUS JULVIANAMARA
SOLINARO
SONCHUS ASPER
SORBUS JONDESTICA
SORBUS JONDESTICA
SORBUS JONDESTICA
SORBUS TORNINALIS
STACHYS PALUSTRIS
STACHYS PA




Abb. 16. Verzeichnis der Lage der Aufnahmeflächen

1985

WITTERUNGSBEDINGTE VERHALTENSÄNDERUNGEN DER ERDKRÖTE (Bufo bufo L.) WÄHREND DES LAICHZUGES (Frühjahr 1984)

von

Rudolf Malkmus

Die Erdkröte ist infolge ihrer alljährlichen Massenwanderzüge zum Laichgewässer die Amphibienart, der zur Zeit die meisten Schutzmaßnahmen gelten (Kartierung der Laichzüge, Sicherung von Straßenübergängen durch Schutzzäune und Eimerfallen, Einbau von Krötentunnels unter die Straßendecke). Die Zahl der diese Migrationen beschreibenden Veröffentlichungen ist inzwischen beträchtlich angewachsen (z.B. EIBL-EIBESFELDT 1950; MOORE 1954; HEUSSER 1958, 1968; SANDER et al. 1977; BREHM 1982; SCHLÜPMANN 1982; KUHN 1984).

Die zeitlich weiter gestreute Rückwanderung aus dem Laichgewässer, die Herbstwanderung zu den Winterquartieren, insbesondere aber die schwer verfolgbare Abwanderung der winzigen Jungtiere nach der Metamorphose sind vergleichsweise wenig bekannt.

Unabhängig von irgendwelchen exogenen Einflüssen sind stets 4 Phasen in der Abfolge des Laichzuges zu beobachten (vgl. BREHM 1982):

- Zunächst erscheinen fast nur Männchen, die in Spähstellung auf unverpaarte Weibchen lauern.
- Das Gros beider Geschlechter wandert zum Laichgewässer und beginnt mit dem Ablaichen der Eischnüre.
- Nach dem Absetzen des Laichgutes gehen die Weibchen sofort an Land, während immer noch Männchen und Weibchen, die in größerer Entfernung vom Laichgewässer überwinterten, zuwandern.
- 4. Männchen wandern aus dem Laichgewässer ab; letzte Einzeltiere wandern noch zu.

Die Weibchen verbleiben durchschnittlich 5, die Männchen 9 Tage im Laichgewässer.

Unter den klimatischen Bedingungen, die den langjährigen Mittelwerten entsprechen und bei Vorhandensein der hormonell gesteuerten Wanderbereitschaft, sind die Zeitgeber für die Tagesrhythmik des Wanderablaufes:

Einbruch der Dämmerung im Zusammenhang mit dem Fortschritt der Jahreszeit (die Gonadenreifung ist tageslängenabhängig), Temperaturen von mindestens + 4° C bis + 5° C, Niederschläge bzw. hohe relative Luftfeuchte (< 60 %). Dabei kommt es häufig vor, daß sich im Sinne der Reizsummenregel (SEITZ 1940) bestimmte Parameter-Kombinationen verstärkend, hemmend oder kompensierend auf die Wanderintensität auswirken. So erwähnt bereits HEUSSER 1967, daß z.B. Regen einige Temperaturgrade ausgleichen könne.

Die Weibchen stellen dabei höhere Anforderungen an diese Bedingungen als die Männchen. Jene wandern im Mittel erst bei + 8,5° C, diese bereits bei + 7,9° C.

Die nachfolgenden Ausführungen sollen nicht dazu dienen, erneut einen Krötenzug darzustellen, sondern einige im Zusammenhang mit den Migrationen neue Beobachtungen zu publizieren.

Beschreibung der Population

Das Laichgewässer der untersuchten Krötenpopulation, ein ca. 0,2 ha großer Fischteich, liegt unterhalb des Weilers Unterlohrgrund im Wiesental des obersten Lohrbaches/Zentralspessart, 330 m über NN (Meßtischblatt Nr. 5922/ 25r 45h). Die Untersuchung beschränkt sich ausschließlich auf die aus den östlich gelegenen Wäldern wandernden Tiere, die durch eine 50 - 100 m breite Wiese und eine Fahrstraße vom Laichgewässer getrennt sind. Im Frühjahr 1984 dauerte hier der Wanderzug zum Gewässer vom 27. März bis zum 25. April. Die dank eines Kröten-

tunnels recht übersichtliche Situation kam einer Zählung der aus Osten einwandernden Populationsgruppe sehr entgegen, wobei allerdings alle zwischen Straße und Teich überwinternden Tiere in die Zählung nicht miteingingen. Erfaßt wurden 1474 Männchen und 653 Weibchen.

Der verhältnismäßig geringe Anteil der Männchen (auf 1 Weibchen kommen im Durchschnitt nur 2,26 Männchen), ist einmal darauf zurückzuführen, daß die Männchen häufig in unmittelbarer Nähe des Laichgewässers überwintern. Wie bereits oben erwähnt, konnte dieser Bereich nicht in die Zählung mitaufgenommen werden. Ferner ist die Überlebenschance beim Überqueren der Straße – der Tunnel deckt nur partiell die Zugbreite – für die Männchen deshalb geringer, weil die Einzeltiere sich im Gegensatz zu den Weibchen vermutlich alljährlich an den Laichzügen beteiligen.

Der Verlauf des Wanderzuges

Abb. 1 zeigt einen 4wöchigen Wanderablauf mit für beide Geschlechter 3 Aktivitätsgipfeln. Normalerweise wäre – wie langjährige Beobachtungen belegen – eine Kurve mit e i n e m Kulminationspunkt Ende März, bzw. im ersten Aprildrittel zu erwarten gewesen.

Während die Hauptzugphase sich in der Regel über nur 4 Tage erstreckt, dauerte sie hier vom 14.04. bis zum 22.04. mit einer Unterbrechung vom 16. bis 19.04. infolge eines Kälte-einbruches. Allerdings entspricht die Zahl der Massenzugtage (6) wieder dem Durchschnitt in deutschen Mittelgebirgen (vgl. BREHM 1982).

Die Graphik bestätigt auch, daß die Weibchen höhere Anforderungen an die exogenen Faktoren als Wanderauslöser stellen. So waren zwischen dem 7. und 13.04. (an diesen Tagen wurden zur Wanderzeit nur maximal + 4° C erreicht) nur an 3 Tagen

einzelne Weibchen zu beobachten, während Männchen in Einzelfällen noch bei nur + 2° C und darunter wanderten. Während des gesamten Zuges wurden zwischen + 2° C und + 3° C 37, zwischen + 1,5° C und 2° C 9, zwischen + 1° C und + 1,5° C 10 wandernde Männchen, aber nie einzelne Weibchen angetroffen. Am Morgen des 11.04. fanden wir 3 erfrorene Männchen, am 19.04. zwei erfrorene Pärchen inmitten der Wiese. Am 10.04. überquerte ein Männchen bei nur + 0,2° C und 65 % rel. Luftfeuchte in zeitlupenhaft schleichenden Bewegungen die Straße!


Daß bereits in der ersten Zugphase, in der in der Regel nur Männchen zu beobachten sind, zahlreiche Weibchen mitwanderten, ist vermutlich auf die vor Wanderbeginn herrschende 3wöchige Frostperiode zurückzuführen. In sie hätte unter durchschnittlichen Witterungsbedingungen der erste Wanderschub fallen müssen, so daß zum Zeitpunkt der 1984 realisierten 1. Zugphase der Sollzeit entsprechend die zweite Phase bereits wirksam wurde.

Wie sind diese Abweichungen zu erklären?

Tab. 1 und Abb. 1 bringen eine auffallende Parallelität von Temperaturgang und Migrationsdichte zum Ausdruck. Dabei werden nicht die wenig aussagekräftigen Tagesmaxima bzw. -minima mit dem Zug in Korrelation gesetzt, sondern der zur Wanderzeit aktuelle Temperaturverlauf.

Hingegen scheinen von der zweiten Aprilhälfte an die völlig fehlende Niederschlagstätigkeit im Verein mit extrem niederen Luftfeuchteverhältnissen (42 bis 65 %) – Parameter, die Ende März, Anfang April einen stark einschränkenden Einfluß auf die Wanderaktivität ausgeübt hätten – den Zug überhaupt nicht zu beeinflussen.

Als weitere Besonderheit war zu verzeichnen, daß sich vom 15.04. an kleine Wanderzüge auch tagsüber bei intensiver Insolation und böig austrocknendem Wind (30 bis 40 % Luftfeuchte) den Laichgewässern zubewegten. So beobachtete ich am 23.04.,



Zugzeit: 27.03. bis 25.04.1984

..... maximale Temperatur während der Beobachtungszeit (20.00 bis 24.00 Uhr) in 10 cm - minimale Temperatur) Höhe über dem Boden am Waldrand

Bodentemperatur in 10 cm Tiefe, gemessen im Wald um 20.00 Uhr

Zahl der wandernden Kröten (rechte Ordinate)

obere Graphik: Angaben zur relativen Luftfeuchte (10 cm über dem Boden, 20.00 Uhr) und der Tagesniederschlag

Tabelle 1: Wanderaktivität der Erdkröte: Beobachtungszeit in Stundenphasen differenziert, mit jeweiliger Angabe der Durchschnittstemperatur und Zahl der wandernden Kröten in den einzelnen Zeitintervallen

	20.00-21.00	21.00-22	.00	22.00-23.00	23.00-24.00	24.00-1.00
27.03.	+ 4° C 4	+ 3° C	2	+ 4° C -	+ 5° C 6	
28.03.	+ 7,5° C 49	+ 7,5° C	54	+ 7° C 34	+ 6,5° C 20	
29.03.	+ 4° C 13	+ 3° C	6	+ 2,5° C 1	+ 2° C -	
30.03.	+ 2° C -	+ 2° C	-	+ 1,5° C -	+ 1,5° C -	
31.03.	+ 4° C -	+ 3° C	-	+ 2,5° C -	+ 2° C -	
01.04.	+ 2° C 1	+ 1,5° C	-	+ 1,5° C -	+ 1° C -	
02.04.	+ 0,5° C -	+ 0,5° C	-	0° C -	0 ° C -	
03.04.	0° C -	o° c	-	- 0,5° C -	- 1° C -	
04.04.	+ 0,5° C -	+ 0,5° C	-	0° C -	- 0,5° C -	
05.04.	+ 2,5° C -	+ 2° C	-	+ 1,5° C -	+ 1° C -	
06.04.	+ 2° C -	+ 2° C	-	+ 1° C -	+ 1° C -	
07.04.	+ 3,8° C 1	+ 3,6° C	8	+ 3,4° C 11	+ 3° C 4	
08.04.	+ 4° C 3	+ 3° C	4	+ 2,5° C -	+ 2° C -	
09.04.	+ 4° C 2	+ 2,5° C	-	+ 2,5° C -	+ 2° C -	
10.04.	+ 3,8° C 3	+ 2,5° C	7	+ 1° C 8	+ 0,2° C 1	
11.04.	+ 3,2° C 2	+ 2,3° C	2	+ 1,5° C 2	+ 1° C -	
12.04.	+ 3,6° C 2	+ 3,4° C	8	+ 3,1° C 4	+ 3° C 4	
13.04.	+ 3,5° C 1	+ 2,8° C	5	+ 1,6° C 6	+ 1° C 1	
14.04.	+ 5° C 2	+ 4,6° C	121	+ 4,3° C 104	+ 3,7° C 92	+ 3,2° C 45
15.04.	+ 8° C 32	+ 7,5° C	216	+ 6° C 213	+ 5,1° C 161	+ 4,6° C 85
16.04.	+ 4° C 30	+ 4° C	59	+ 2° C 2	+ 1,5° C -	+ 1° C -
17.04.	+ 1,7° C -	+ 0,8° C	-	- 0,2° C -	- 1° C -	- 1° C -
18.04.	+ 1° C -	+ 0,8° C	-	0° C -	- 0,5° C -	- 1° C -
19.04.	+ 3,5° C -	+ 2,8° C	3	+ 1,5° C -	+ 1° C -	+ 0,5° C -
20.04.	+ 7,5° C 15	+ 7° C	100	+ 6,5° C 105	+ 5,8° C 44	+ 4° C 18
21.04.	+ 8,5° C 3	+ 7,6° C	64	+ 6,6° C 81	+ 5,5° C 28	+ 4° C 12
22.04.	+ 12° C -	+ 11° C	48	+ 10° C 66	+ 9° C 60	+ 7,5° C 30
23.04.	+ 11° C -	+ 9° C	9	+ 7,2° C 4	+ 6,5° C -	+ 6° C -
24.04.	+ 11° C -	+ 9,5° C	4	+ 9° C 2	+ 8,5° C -	+ 7° C -
25.04.	+ 10° C -	+ 6,5° C	-	+ 5° C -	+ 4° C -	+ 3,5° C -

wie verpaarte Tiere die Straße gegen 13.00 Uhr überquerten. Die Temperatur betrug unmittelbar über der Teerdecke + 32° C! Der Rückzug fand in geradezu fieberhafter Hektik zwischen dem 20.04. und 24.04. statt, wobei wiederum viele Exemplare tagsüber wanderten. Tagwanderungen werden zwar bereits von JUNGFER (1943) erwähnt, doch ist bei ihm, wie bei anderen Autoren (z.B. BREHM 1982; KUHN 1984) immer nur von Einzeltieren die Rede.

Diese Beobachtungen zeigen deutlich, daß die saisonale Wanderdynamik der fortpflanzungsbereiten Kröten durch die von der Norm erheblich abweichenden Witterungsverhältnisse des Frühjahrs 1984 modifiziert wurde. Die als exogener Auslöser dominante Rolle der Temperatur, auf die schon HEUSSER 1967 hinwies, wird durch diese Untersuchung eindrucksvoll belegt.

Die Erdkröte besitzt eine popular-spezifische Sollzeit für die Frühjahrsmigration (HEUSSER 1967; MALKMUS 1975). Diese Sollzeit ist nach HEUSSER (1967) der "Zeitpunkt der durchschnittlich frühesten Eignung des Laichplatzes unter Bedingungen, die die Anwanderung zu diesem Platz gestatten". Wird diese Sollzeit durch Wetterverhältnisse, die den Wanderbeginn blockieren, überschritten, so verlieren die einzelnen Witterungselemente als Auslösefaktoren für die Migration zunehmend an Bedeutung: selbst bei trockenster Witterung mit nächtlichen Luftfeuchte-Werten unter 50 % und ungünstigen Windverhältnissen bewegen sich die Wanderzüge offensichtlich problemlos dem Laichplatz zu. Da schließlich die nächtlichen Temperaturen in Gefrierpunktnähe bei poikilothermen Tieren jede Lokomotion zum Erliegen bringen, werden die Wanderungen unter solchen Voraussetzungen in ihrer Spätphase zeitlich z.T. auf den Tag verschoben. Während unter normalen Bedingungen Kröten, die im Offenland durch absinkende Temperaturen überrascht werden, in den Wald zurückkehren, um sich zu vergraben bzw. die Waldrandgrenze gar nicht erst überschreiten (vgl. HEUSSER 1964; KUHN 1984), kann man bei Spätwanderern auch gelegentlich erfrorene Exemplare finden.

Aus den vorliegenden Daten geht hervor, daß die Erdkröte zur Realisierung ihres Laichzuges durch Verhaltensmodifikationen flexibel auf klimatisch ungünstige Zustandsvoraussetzungen zu reagieren versteht. Die spontane und ohne Komplikationen erfolgende Umgehung (Abwandlung des Tagesrhythmus)bzw. Bewältigung meteorologischer Barrieren zeigen, daß unsere heimischen Populationen an solche uns aufgrund unserer kaum über hundert Jahre zurückreichenden Wetteraufzeichnungen extrem abweichend erscheinenden Witterungsverhältnisse, wie sie das Frühjahr 1984 brachte, bestens adaptiert sind.

Bemerkungen zur Rückwanderung

Es wurde bereits oben erwähnt, daß die Rückwanderung am 20.04. einsetzte, zu einem Zeitpunkt, da der letzte Schub des Hinzugs seine maximale Dichte erreicht hatte. Es trafen also zwangs-läufig rückwandernde Weibchen, die bereits abgelaicht hatten mit noch paarungsbereiten Männchen auf dem Hinzug zusammen. Dabei konnte zweimal eine Verhaltensweise beobachtet werden, die bisher in der Literatur noch nicht dokumentiert zu sein scheint:

- 21.04.: Ein rückwanderndes Weibchen wird von einem lauernden Männchen angesprungen und geklammert. Das Weibchen stellt sich hochbeinig mit eingezogenem Kopf auf, wobei seine Schnauzenspitze den Boden berührt und zieht dabei die Flanken extrem ein. Die Stellung erweckt den Eindruck, als wolle es seinen "Reiter" nach vorne kippen und abwerfen. Erst nach ca. 15 Minuten, in denen das Weibchen kaum einen Meter weiter, teils in Kreisbewegung gewandert ist, löst das Männchen plötzlich ohne erkennbare Ursache den Amplexus.
- 22.04.: Ca. 80 m vom Laichplatz entfernt entdeckte ich gegen 24.00 Uhr ein rückwanderndes Pärchen. Da beide z.T. mit Wasserlinsen bedeckt sind, wurde das Weibchen möglicherweise bereits nach dem Ablaichen geklammert und das Männchen mit an Land getragen. Ich beobachtete es über

40 Minuten lang, wie es in ähnlicher Weise wie das Weibchen am Vortag vergeblich versuchte, des Männchens ledig zu werden: es bewegt sich zeitlupenhaft mit hochgestreckten Beinen, den Kopf so weit eingezogen, daß sogar die Schnauzenspitze des Männchens den Boden erreicht; die Flanken konkav eingezogen. Beim Durchwandern von Fallholz wird das Männchen einmal gegen einen tiefliegenden Ast gedrückt. Sofort versucht das Weibchen durch ruckartige Vorwärtsbewegung seine Last vom Rücken zu schieben. Als dies mißlingt, wandert es zügig weiter.

Bemerkenswert ist, daß diese Abwehrreaktion nicht der beim Erfassen hinter den Vorderbeinen provozierbaren üblichen entspricht, die sich in einer hustenartigen, beim Weibchen stumm vorgetragenen Flankenbewegung äußert (EIBL-EIBESFELDT 1950). Die Flanken werden vielmehr extrem eingezogen und bleiben es wie in einer Starre. Das Tier stellt dann gestaltlich gewissermaßen den Gegenpol zum prall laichvollen und paarungsbereiten Weibchen dar und man meint erwarten zu dürfen, daß der dadurch auf das Männchen ausgeübte, anders geartete taktile Reiz, dessen Klammerversuche blockiere.

Nachdem sich in beiden beobachteten Fällen das Männchen aber trotz aller Abstreif-Bemühungen der Partnerin nicht von ihr löste, müssen wir davon ausgehen, daß für diesen Fall im Verhaltensinventar der weiblichen Kröte kein Signal zur Verfügung steht, das geeignet wäre, den männlichen Partner über seinen Irrtum zu informieren.

Literatur

BREHM, J. (1982): Zum Frühjahrszug der Erdkröte, Bufo bufo (L.).-Beitr. Naturk. Osthessen <u>18</u>: 115 - 136. Fulda

EIBL-EIBESFELDT, I. (1950): Ein Beitrag zur Paarungsbiologie der Erdkröte (Bufo bufo L.).- Behaviour, 2: 217 - 236

- HEUSSER, H. (1958): Über die Beziehung der Erdkröte (Bufo bufo L.) zu ihrem Laichplatz I.- Behaviour, <u>12</u>: 208 232
- HEUSSER, H. (1964): Zur Laichplatzorientierung der Erdkröte, Bufo bufo L.- Mitt. Nat. forsch. Ges. Schaffhausen <u>28</u> (1963/66): 101 - 112
- HEUSSER, H. (1967): Wanderungen und Sommerquartiere der Erdkröte (Bufo bufo L.).- Inaugural-Diss. Univ. Zürich, 40 S.
- HEUSSER, H. (1968): Die Lebensweise der Erdkröte, Bufo bufo (L.); Laichzeit, Umstimmung, Ovulation, Verhalten.- Vierteljahreszeitschr. Naturf. Ges. Zürich 113: 257 - 289
- JUNGFER, W. (1943): Beiträge zur Biologie der Erdkörte (Bufo bufo L.) mit besonderer Berücksichtigung der Wanderung zu den Laichgewässern.- J. Morph. Oekol. Tiere 40: 117 - 157
- KUHN, J. (1984): Eine Population der Erdkröte (Bufo bufo L.) auf der Ulmer Alb: Wanderungen, Straßentod und Überlebensaussichten 1981.- Jh. Ges. Naturh. Württ. <u>139</u>: 123 - 159
- MALKMUS, R. (1975): Zur Biologie und Verbreitung der Kröten im Spessart.- Abh. Naturw. Ver. Würzburg 18: 49 - 73
- MOORE, H.J. (1954): Some observations on the migration of the toad (Bufo bufo L.).- Brit. J. Herpet. 1: 194 224
- SANDER, K., HOFFRICHTER, O. und E. KLUG (1977): Die Erdkrötenwanderung am Waldsee in Freiburg i.Br. Beobachtungen 1974 – 1977 und Schutzvorschläge.- Veröff. Natursch. Landschaftspf. Bad-Württ. <u>46</u>: 161 – 181
- SCHLÜPMANN, M. (1982): Bestand, Lebensraum und Lebensweise der Erdkröte (Bufo bufo) im Hohenlimburger Raum (MTB 4611).-Nat. und Heimat 42: 65 - 81

	Abh.Naturw.Verein Würzburg	Band 26	S.117-140	1985
--	----------------------------	---------	-----------	------

Die Bedeutung des Ackerrandstreifenprogrammes für den Artenschutz seltener Ackerunkräuter in Unterfranken

von

Gabriele Ritschel-Kandel Kornelia Marzini Sigrun Happel

Einleitung

Der Naturwissenschaftliche Verein Würzburg führt im Auftrag der Regierung von Unterfranken begleitende Untersuchungen zu den Naturschutzförderprogrammen für landwirtschaftliche Flächen durch. Dadurch soll gewährleistet werden, daß die Fördermittel des Naturschutzes sinnvoll eingesetzt werden und daß die ökologischen Zielsetzungen der Programme erreicht werden. Erste Ergebnisse aus Untersuchungen zur Effektivität des Ackerrandstreifenprogrammes in Unterfranken werden im folgenden dargestellt.

1. Ausgangslage

Unterfranken weist ein sehr großes Spektrum an Ackerunkräutern auf und stellt in dieser Hinsicht auch heute noch einen Schwerpunkt in Bayern dar. Einige Regionen des nördlichen Unterfranken zählen nach neueren Untersuchungen zu den am reichlichsten mit seltenen Unkrautarten ausgestatteten Landschaften Bayerns (MEIEROTT 1983, 1986).

Auf den kalkarmen Sandäckern stellen sich die Gesellschaften des Verbandes Aphanion ein, auf den kalkreichen Lehmäckern die Gesellschaften der Verbandes Caucalidion. Einen besonderen Schwerpunkt haben in Unterfranken die Arten des Caucalido-Adonidetums, die auf flachgründigen Muschelkalk- und Gipskeuperäckern mit einem hohen Steinanteil im Boden vorkommen. Das Caucalido-Adonidetum ist durch einen hohen Anteil mediterraner bzw. subkontinentaler Florenelemente ausgezeichnet. Obwohl viele Arten, wie Adonis flammea und Bupleurum rotundifolium regional (z.B. Lkr. Würzburg) fast verschwunden sind, konnten sich diese Arten in den extensiver bewirtschafteten Zonen Unterfrankens (z.B. Lkr. Rhön-Grabfeld, Lkr. Haßberge) bis heute halten.

Die immer noch vorhandene Artenfülle in Unterfranken ist insofern erstaunlich, als mehrere Arten in verschiedenen Gebieten Deutschlands bereits ausgestorben oder verschollen sind. Es besteht somit ein dringender Handlungsbedarf, um die noch verbliebene Segetalflora in der freien Landschaft an möglichst vielen dafür geeigneten Stellen zu erhalten.

In Unterfranken sind 55 Ackerunkrautarten in einer der Gefährdungskategorien der Roten Liste von Unterfranken genannt.

Auch viele ehemals häufige Ackerunkräuter, die in den Roten Listen noch nicht in einer der Gefährdungskategorien genannt werden, sind deutlich seltener geworden, wie z.B. Kornblume (Centaurea cyanus), Ackerröte (Sherardia arvensis), Ackerlichtnelke (Melandrium noctiflorum) und viele andere.

Der auffällige Rückgang unserer Ackerunkräuter läßt sich nicht auf eine einzige Ursache zurückführen, auch wenn der Einsatz von Herbiziden vielfach als Hauptursache genannt wird, sondern er hängt mit der gesamten Entwicklung der Landwirtschaft in den vergangenen 30 bis 40 Jahren zusammen. Vorgegeben durch die Zielsetzungen einer produktionsorientierten Agrarpolitik haben sich u.a. folgende Faktoren bei der Bewirtschaftung von Äckern gewandelt:

Änderung der Fruchtfolgen
zunehmender Mineraldüngereinsatz
Verbesserung der Züchtung
Vergrößerung der Ackerparzellen
Änderung der Bodenbearbeitung
Änderung der Erntemethoden
Einsatz von chemischen Mitteln zur Unkraut- und
Schädlingsbekämpfung

Der Einsatz chemischer Mittel wird durch den Rückgang des Arbeitskräftebesatzes und durch das übermäßige Wachstum von Problemunkräutern zwingend notwendig. Dieses Überhandnehmen von Problemunkräutern ist eine Folge starker Düngung, eingeengter Fruchtfolgen, anderer Bodenbearbeitung und anderer Erntemethoden.

Die Intensivierung in der Landwirtschaft führte einerseits zu beachtlichen Produktionssteigerungen bei der Erzeugung von Kulturpflanzen, andererseits zum Rückgang empfindlicher Ackerunkräuter. Die Veränderungen der Ackernutzung haben zwar im Prinzip überall in Unterfranken stattgefunden, jedoch lassen sich hinsichtlich des Umfanges der Intensivierung je nach den naturräumlichen Voraussetzungen, wesentliche Unterschiede beobachten. In Unterfranken hat die Entwicklung zu folgender Zonierung geführt:

- a) Die ertragsschwächeren Bereiche der Mittelgebirge und andere Grenzertragsböden werden vergleichsweise wenig intensiv bewirtschaftet. Der Einsatz ertragssteigernder Mittel ist weniger rentabel, so daß u.a. auch Herbizide in geringerem Umfang angewendet werden.
- b) Die ertragreicheren, guten Ackerbauzonen (z.B. Ochsenfurter Gau) werden in jeder Hinsicht mit höchster Intensität bewirtschaftet. Infolge weitergehender Spezialisierung und Intensivierung (sehr eingeengte Fruchtfolgen, starke Düngung) wird eine immer umfassendere Anwendung von Herbiziden erforderlich.

Die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Artenbestände der Segetalflora sind deutlich erkennbar: Während in den ertragsreicheren Ackerbaugebieten die typischen Ackerunkräuter seit langem so gut wie verschwunden sind, häufen sich die Standorte seltener Arten in allen ertragsschwachen Zonen. Für den effektiven Einsatz eines Artenschutzprogrammes zur Verbesserung der ökologischen Situation gefährdeter Ackerunkräuter ist es wesentlich, diese Unterschiede in der heutigen Situation der landwirtschaftlichen Flächen entsprechend zu berücksichtigen.



Abb. 1: Die Behandlung mit Herbiziden beeinflußt nicht nur die Ackerflächen, sondern auch alle anderen Biotope der Kulturlandschaft.

2. Vorgaben des Ackerrandstreifenprogrammes

Nach einem Modellvorhaben, das seit 1977 in den Kalkgebieten der Nordeifel (Nordrhein-Westfalen) durchgeführt wurde, kann die gebietstypische Segetalflora, insbesondere alle gefährdeten Arten, dadurch erhalten werden, daß Randstreifen von Äckern in einer Breite von 2 Metern von der Herbizidanwendung verschont bleiben, im übrigen aber unverändert wie bisher bewirtschaftet werden. Der Ertragsausfall wurde dabei den an dem Vorhaben beteiligten Landwirten erstattet (SCHUMACHER 1980).

Ein Pilotprojekt auf ausgewählten Flächen in Oberfranken bestätigte diese Ergebnisse.

Daher wurde ab 1985 durch Bereitstellung von entsprechenden Fördermitteln des Bayerischen Umweltministeriums eine landesweite Umsetzung des Ackerrandstreifenprogrammes in Bayern ermöglicht. Im Rahmen dieses Naturschutzprogrammes für die Landwirtschaft wurden von den Naturschutzbehörden Verträge mit Landwirten geschlossen. In den Bewirtschaftungsvereinbarungen verpflichten sich Landwirte auf freiwilliger Basis für einen Randstreifen von 2 bis 5 Meter Breite zu einer extensiven Bewirtschaftung, die insbesondere den Verzicht auf Herbizide beinhaltet, und erhalten für den Ertragsausfall eine Ausgleichszahlung aus dem Ackerrandstreifenprogramm.

Nach nunmehr 3-jähriger Versuchsphase in allen Regionen Unterfrankens liegen umfassende Erfahrungen zu dem Problemkreis vor und ermöglichen Aussagen, ob herbizidfreie Ackerrandstreifen von wenigen Metern Breite ein ausreichendes Mittel sind, um den Rückgang gefährdeter Ackerunkräuter wirksam aufzuhalten, oder ob dieses Artenschutzprogramm in einzelnen Punkten modizifiert werden sollte.

3. Vertragsabschlüsse des Ackerrandstreifenprogrammes in Unterfranken

Für die Umsetzung des Ackerrandstreifenprogrammes in Unterfranken wurden Vertragsflächen in allen Landkreisen und in sämtlichen Naturräumen ausgewählt (siehe Tab. 2). Die Entwicklung des Förderprogrammes von 1985 bis 1987 zeigt eine kontinuierliche Zunahme der Vertragsnehmer, eine Tendenz, die auch 1988 noch anhalten wird (siehe Tab. 1).

Tabelle 1: Die Entwickung des Ackerrandstreifenprogrammes in Unterfranken von 1985 bis 1987

	Vertrags-	Anzahl	Rands	Randstreifen		
	nehmer	der Flächen	Länge (m)	Breite(m)	mittel (DM)	
1985	63	71	16 481	3,03	5.000,00	
1986	168	361	155 959	2,64	41.175,80	
1987	377	741	233 817	5,20	121.545,15	

Tabelle 2: Verteilung der Mittel auf die Landkreise in Unterfranken im Jahr 1987

Landkreis	Vertrags-	Anzahl d.	Randstreifen	
	nehmer	Flächen	Gesamtlänge	mittel (DM)
Aschaffenburg	8	17	7.470 m	2.450,00
Haßberge	6	14	3.754 m	3.087,00
Bad Kissingen	77	159	46.747 m	21.829,30
Kitzingen	5	12	3.187 m	1.473,30
Miltenberg	10	27	7.348 m	2.661,50
Main-Spessart	36	58	11.002 m	11.532,40
Rhön-Grabfeld	125	165	68.788 m	33.664,55
Schweinfurt	30	89	37.755 m	18.613,50
Würzburg	80	200	47.766 m	26.233,60
Unterfranken	377	741	233.817 m	121.545,15

4. Vorauswahl der Vertragsflächen für das Ackerrandstreifenprogramm

Nach ökologischen Kriterien wurde eine Vorauswahl der für eine Teilnahme am Ackerrandstreifenprogramm geeigneten Flächen getroffen. Dabei wurde darauf geachtet, daß alle Randstreifen mindestens eine der nachfolgenden ökologischen Funktionen im Naturhaushalt aufweisen, bzw. daß sie nach Möglichkeit sogar mehrere Funktionen abdecken können:

Tabelle 3: Übersicht über die ökologischen Funktionen von Ackerflächen im Naturhaushalt

- a) Funktion als aktueller Standort von gefährdeten Arten (Gefährdete Ackerunkräuter der Roten Listen kommen zumindest in Einzelexemplaren auf dem Acker oder in der näheren Umgebung vor)
- b) Funktion als ehemaliger Standort von gefährdeten Arten (Für gefährdete Ackerunkräuter der Roten Listen liegen Nachweise aus früherer Zeit vor)
- c) Funktion als Standort typischer Unkrautgesellschaften (Gesellschaften der Verbände Aphanion und Caucalidion)
- d) Funktion als Standort besonders artenreicher Unkrautgesellschaften
- e) Funktion als Pufferzone für Naturschutzgebiete (Extensivierung von intensiv genutzten Ackerflächen, die direkt an Naturschutzgebiete angrenzen)
- f) Funktion als Pufferzone für schutzwürdige Biotope (Extensivierung von intensiv genutzten Ackerflächen die unmittelbar an schutzwürdige Biotope angrenzen)
- g) Funktion in einem Biotopverbundsystem (Extensivierung von Agrarflächen, die zu einer Vernetzung isolierter Biotope beitragen können)

Da das Ackerrandstreifenprogramm in erster Linie ein Artenschutzprogramm zum Schutz gefährdeter Ackerunkräuter ist, hat die Funktion als aktueller oder ehemaliger Standort gefährdeter Arten eine vorrangige Bedeutung bei der Auswahl von Vertragsflächen.

5. Ergebnisse in den ertragsschwächeren Bereichen von Unterfranken

Die Entwicklung der Landwirtschaft mit ihren durch Intensivierung und Spezialisierung bedingten Veränderungen hat sich in den ertragsschwächeren Gebieten langsamer und nicht bis zu der Intensität wie in guten Ackerbaugebieten vollzogen. Denn in den benachteiligten Zonen kann trotz aller Intensivierungsmaßnahmen vergleichsweise wenig erwirtschaftet werden, Produktionssteigerungen sind aufgrund schlechterer edaphischer und klimatischer Voraussetzungen nur in begrenztem Ausmaß möglich. Die Bewirtschaftung kann zwar nicht mehr als extensiv bezeichnet werden, sie ist aber auch nicht so intensiv wie in den guten Ackerbauzonen.

Insgesamt findet ein vergleichsweise geringerer Dünge- und Biozidaufwand statt. Wesentlich für den Erfolg des Ackerrandstreifenprogrammes ist, daß häufig noch vielseitige, abwechslungsreiche Fruchtfolgen vorherrschen, die den Unkrautbestand auf natürliche, herkömmliche Weise in Grenzen halten und somit keinen übermäßig hohen Herbizideinsatz erforderlich machen. Die kleinflächige Zersplitterung einiger Ackerbaugebiete mit ihren zahlreichen Randstrukturen steht ebenfalls allen Intensivierungsbestrebungen entgegen. Auch ein gewisser Zusammenhang mit der Betriebsstruktur ist erkennbar. In den ertragsschwächeren Zonen, die insbesondere die Landkreise Rhön-Grabfeld, Bad Kissingen und Haßberge kennzeichnen, gibt es vergleichsweise viele Nebenerwerbslandwirte, darunter zahlreiche sehr kleine Betriebe, die Landwirtschaft teilweise noch in traditioneller, nahezu extensiver Art betreiben (Lkr. Bad Kissingen: 2.768 Nebenerwerbslandwirte, 566 Haupterwerbslandwirte). Demgegenüber überwiegen in den ertragsreicheren Gebieten, wie sie besonders die Landkreise Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen kennzeichnen, die großen Haupterwerbsbetriebe (Lkr. Würzburg: 1.611 Nebenerwerbslandwirte, 1.742 Haupterwerbslandwirte).

Die Umsetzung des Ackerrandstreifenprogrammes, insbesondere der Verzicht auf Herbizide, konnte aufgrund der Vorauswahl geeigneter Flächen vergleichsweise problemlos verwirklicht werden, und erforderte vom Landwirt nur in Einzelfällen geringfügige Änderungen in

der Bewirtschaftung, wie z.B. eine mechanische Unkrautbekämpfung durch Striegeln. Besonders positiv wirken sich aus Sicht des Artenschutzes diejenigen Anbaufolgen aus, die sich an der alten oder an der verbesserten Dreifelderwirtschaft orientieren, und Klee Luzerne, Grassamen oder Kartoffeln bzw. Brache in der Fruchtfolge enthalten, z.B.:

1. Jahr: Kartoffeln oder Kleegras oder Brache

Jahr: Wintergetreide
 Jahr: Sommergetreide

Bereits im 1. Jahr des Ackerrandstreifenprogrammes (1985) wirkte sich der Verzicht auf Herbizide auf allen Randstreifen der ertragsschwächeren Zonen unmittelbar und sehr eindrucksvoll auf die Ackerunkrautflora und -vegetation aus. Die ungespritzten Randstreifen unterscheiden sich durch ihren Reichtum an buntblühenden Arten bereits optisch sehr augenfällig von den gespritzten Ackerflächen (siehe Abb. 2). Insgesamt wurden bei den Bestandsaufnahmen auf Ackerrandstreifen 187 Arten registriert, wobei etwa ein Viertel auf übergreifende Arten angrenzender Gesellschaften entfällt. Die Auswertung der Arten- und Individuenzahlen gespritzter und ungespritzter Flächen gleicher Größe ergibt deutliche Unterschiede. Bei nicht gespritzten Flächen liegen die Artenzahlen bei 37 pro Quadratmeter, die Zahl der Individuen bis zu 700 pro Quadratmeter. Bei angrenzenden gespritzten Flächen sinken diese Zahlen stark ab. Im Mittel sind dann nur noch ein Drittel der Arten und ein Fünftel der Individuen vorhanden, die zudem nur noch vegetativ und verkümmert vorkommen. Pflanzensoziologisch wurden alle typischen Unkrautgesellschaften des unterfränkischen Raumes in artenreichen Ausbildungen dokumentiert. Über die besondere Bedeutung des Ackerrandstreifenprogrammes für die Erhaltung gefährdeter Ackerunkräuter wird nachfolgend berichtet.

5.1 Funktion der Randstreifen als Standort gefährdeter Arten

1987 wurden auf 496 Randstreifen (= 67 % der Vertragsflächen) Rote-Liste-Arten der Gefährdungskategorien 0 bis 3 gefunden.

Hervorgehoben werden soll das Wiederauftreten von Legousia hybrida, die in Unterfranken als ausgestorbene Art galt. 1986 und 1987 trat die Art in mehreren tausend Individuen vergesellschaftet mit Bupleurum rotundifolium und anderen Arten des Caucalido-Adonidetums in einem Kalkscherbenacker bei Oberwaldbehrungen (Lkr. Rhön-Grabfeld) auf.

Folgende Arten der Gefährdungsstufe 1 (Vom Aussterben bedroht) wurden im vergangenen Jahr auf 42 herbizidfreien Randstreifen registriert:

Adonis flammea
Androsace elongata
Arnoseris minima
Bupleurum rotundifolium
Euphorbia falcata
Linaria arvensis
Mibora minima
Nigella arvensis
Nonea pulla
Scandix pecten-veneris
Thymelaea passerina

Besonders häufig wurde Bupleurum rotundifolium nachgewiesen; allein im Lkr. Rhön-Grabfeld wurde die Art in 12 verschiedenen Vertragsflächen gefunden.

Auch alle anderen Rote-Liste-Arten der Gefährdungsgrade 2 und 3 wurden in Vertragsflächen des Ackerrandstreifenprogrammes registriert. Bemerkenswert ist vor allem die hohe Individuenzahl einiger Arten; von Caucalis platycarpos und Adonis aestivalis wurden bis zu 25 Individuen pro Quadratmeter gezählt.

Diese Ergebnisse demonstrieren anschaulich, daß in solchen Gebieten, trotz aller Einwirkungen der modernen Landwirtschaft, noch ein hoher Samenvorrat auch seltener Arten vorhanden ist. Damit wird bestätigt, daß die extensive Bewirtschaftung von Ackerflächen durch Landwirte im Prinzip geeignet ist, um den Rückgang gefährdeter Arten wirksam aufzuhalten. Allerdings ist aus den später genannten Gründen (siehe S.134) eine Erweiterung der Randstreifen-Verträge dringend erforderlich.





Abb. 2: Herbizidfreier Ackerrandstreifen mit blühendem Ackersenf (Sinapis arvensis) bei Mühlbach (Lkr. Rhön-Grabfeld).

5.2 Funktion der Randstreifen als Pufferzone für Biotope

61 % der Vertragsflächen des Ackerrandstreifenprogrammes grenzen direkt an schutzwürdige Biotope (einschließlich Schutzgebiete) an und erfüllen somit bei einer extensiven Bewirtschaftung neben der Artenschutzfunktion gleichzeitig eine Pufferfunktion für diese Biotope. Der Einsatz von Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden und Dünger hat stets auch negative Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierwelt angrenzender Lebensräume. Aus gesamtökologischer Sicht wurde daher in allen Fällen eine völlig extensive Nutzung unter Verzicht auf sämtliche ertragssteigernden Mittel für sinnvoll gehalten, auch wenn tierökologische Aspekte in den Ackerrandstreifen bisher nicht untersucht worden sind.

In Unterfranken sind besonders häufig 6d-Trockenstandorte und Ackerflächen unmittelbar benachbart. Bei den Äckern handelt es sich im allgemeinen um landwirtschaftliche Grenzertragsböden, in denen der Getreidedeckungsanteil weniger als 50 % beträgt. Kennzeichnend für Grenzbereiche zwischen diesen beiden Lebensräumen ist das Vorkommen gemeinsamer lichtliebender Arten, wie Melampyrum arvense und Ajuga chamaepitys, die sowohl im Acker wie auch im Trockenrasen wachsen. Im Idealfall liegt ein abwechslungsreiches Vegetationsmosaik vor, das bei einer anzustrebenden extensiven Bewirtschaftung der gesamten Ackerflächen die Vorstellungen einer artenreichen vielfältigen Kulturlandschaft in nahezu optimaler Weise realisiert.

Ein flächendeckendes Konzept dieser Art wird unter Einsatz des Ackerrandstreifenprogrammes und des Magerrasenprogrammes am Saupürzel bei Karlstadt in Teilschritten verwirklicht (siehe Abb. 3). Der Reichtum an gefährdeten Arten sowohl in den Magerrasen wie auch in den Ackerflächen (Thymelaea passerina, Nonea pulla) und die Vielzahl der Pflanzengesellschaften dokumentiert die Bedeutung derartiger Gebiete für den Arten- und Biotopschutz. Die Optimierung für den Artenschutz ist allerdings erst durch den Einsatz der Naturschutz-Förderungsprogramme möglich, da sonst die unbedingt erforderlichen extensiven Nutzungsformen nicht verwirklicht werden können.



tationsmosaik aus Trocken- und Halbtrockenrasen, Sandgrasheiden, wärmeliebenden Gebüschen, Sand- und Kalkäckern sowie Ackerbrachen bedeckt, das durch die Wiedereinführung der extensiven Nutzung eine einmalige Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz bekommt (schraffiert: Vertragsflächen des Ackerrandstreifenprogrammes). Abb. 3: Der Saupürzel bei Karlstadt/Main wird von einem abwechslungsreichen Vege-

5.3 <u>Funktion der Randstreifen als Pufferzone für Naturschutzge-</u> biete

Alle Schutzgebiete, die in der Agrarlandschaft liegen, werden durch die heutige landwirtschaftliche Nutzung negativ beeinflußt und gefährdet. Das bisherige Konzept der Ausweisung von Naturschutzgebieten hat sich bei Gebieten, die unmittelbar an landwirtschaftliche Flächen angrenzen, als nicht ausreichend erwiesen, um die Lebensräume vor weiterer Zerstörung und Artenschwund zu bewahren. Die Änderungen in der Landwirtschaft haben dazu geführt, daß die Agrarlandschaft ein lebensfeindlicher Bereich geworden ist. In dieser lebensfeindlichen, intensiv genutzten Umgebung liegen die Naturschutzgebiete wie Inseln. Der intensive Einsatz ertragssteigernder Mittel auf angrenzenden Ackerflächen hat stets auch verheerende Folgen für das Schutzgebiet; der Artenschwund und die Entwertung der schutzwürdigen Flächen kann nicht wirksam aufgehalten werden.

Zur Verbesserung der ökologischen Situation in den Naturschutzgebieten ist eine Extensivierung der Nutzung aller angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen erforderlich. Diese Extensivierung einer Pufferzone ist durch Bewirtschaftungsvereinbarungen im Rahmen des Ackerrandstreifenprogrammes möglich.

Verträge über die extensive Nutzung von Randstreifen, die direkt an Schutzgebiete angrenzen, wurden bisher in folgenden Fällen geschlossen:

- NSG "Sulzheimer Gipshügel" Gem. Sulzheim, Lkr. Schweinfurt
- NSG "Weyhershauck" Gem. Ostheim, Lkr. Rhön-Grabfeld
- NSG "Grainberg-Kalbenstein" Gem. Gambach, Lkr. Main-Spessart
- NSG "Grohberg" Gem. Faulbach und Breitenbrunn, Lkr. Miltenberg
- NSG "Trockengebiete und Hangwälder bei der Ruine Homburg"

 Gem. Karsbach und Gössenheim, Lkr. Main-Spessart

 (siehe Abb. 4)
- NSG "Riedholz und Grettstädter Wiesen" Gem. Schwebheim,
 Lkr. Schweinfurt

Alle Randstreifen haben gleichzeitig eine Funktion als aktuelle oder ehemalige Wuchsorte von gefährdeten Ackerunkrautarten.




Abb. 4 Halbtrockenrasen des NSG "Trockengebiete und Hangwälder bei der Ruine Homburg" (rechts) und angrenzende Ackerflächen (schraffiert: Vertragsflächen des Ackerrandstreifenprogrammes)

5.4 Funktion der Randstreifen in einem Biotopverbundsystem

Charakteristisch und von besonderem ökologischem Wert für die unterfränkische Kulturlandschaft ist die Vielzahl sehr kleinflächiger schutzwürdiger Biotope. Sie liegen heute inselartig isoliert in ackerbaulich genutzter Umgebung, die bei der heutigen Nutzungsintensität für viele Arten eine nicht mehr überwindbare Biotopgrenze darstellt. Das Arteninventar kleiner Restbiotope, die von Ackerflächen umgeben sind, ist langfristig nicht lebensfähig, es findet ein unaufhaltsamer Artenrückgang statt. Dafür ist einerseits die geringe Flächengröße vieler Biotope, andererseits die Isolation der Flächen verantwortlich. Das Minimalareal ist im allgemeinen weit unterschritten, was zur erhöhten Aussterbewahrscheinlichkeit führt. Ein Austausch bzw. eine Wiederbesiedlungsmöglichkeit von Arten ist durch die Isolation der Lebensräume nicht mehr gegeben.

Eine wesentliche Verbesserung der ökologischen Situation kann durch die Extensivierung von angrenzenden und verbindenden Ackerflächen entstehen. Extensiv genutzte Ackerrandstreifen können bei ausreichender Breite als Korridore zwischen Biotopen dienen, sie können zu einer Vernetzung isolierter Biotope und letztlich zu einem Biotopverbundsystem beitragen.

Die Extensivierung von verbindenden Randstreifen wurde im Rahmen des Ackerrandstreifenprogrammes u.a. in Urspringen/Rhön (siehe Abb. 5), Ostheim/Rhön und Oberlauringen (Lkr. Schweinfurt) schrittweise verwirklicht. Bei den schutzwürdigen Biotopen handelt es sich jeweils um eine Vielzahl kleinflächiger, meist langgestreckter 6d-Magerrasenreste, die allseitig von Ackerflächen umgeben sind. Alle Vertragsflächen mit Vernetzungsfunktion haben gleichzeitig eine Funktion als aktuelle Wuchsorte von gefährdeten Ackerunkrautarten.



Abb. 5: Isolierte 6d-Halbtrockenrasenflächen in ackerbaulich genutzter Umgebung am Hundsrück bei Urspringen (Lkr. Rhön-Grabfeld) (schraffiert: Vertragsflächen des Ackerrandstreifenprogrammes, die zu einer Verbindung der Biotope beitragen)



Abb. 6: Durch Nutzungsaufgabe gefährdeter Acker mit Caucalido-Adonidetum unterhalb von verbuschten Magerrasen an der Altenburg bei Oberlauringen (Lkr. Schweinfurt) (schraffiert: Vertragsflächen des Ackerrandstreifenprogrammes)

5.5 Gefährdung durch Nutzungsaufgabe

Die akute Gefährdung besteht bei allen untersuchten Standorten der Grenzertragslagen, insbesondere bei den aus Sicht des Artenschutzes so bedeutsamen basenreichen Scherbenböden der trocken-warmen Hanglagen, nicht in einer Intensivierung der Nutzung - denn eine Steigerung der Produktion ist auf derartigen Standorten nicht rentabel - sondern die Gefährdung besteht in erster Linie darin, daß derartige Ackerflächen völlig aus der Nutzung genommen werden (siehe Abb. 6). Aus landwirtschaftlicher Sicht zahlt sich eine ackerbauliche Nutzung, insbesondere bei der aktuellen Entwicklung des Agrarmarktes, nicht mehr aus. Diese Entwicklung führt in Unterfranken zu einem Rückgang aller Unkrautarten mit extremen Ansprüchen an den pH-Wert und aller Magerkeitszeiger. Zunehmend werden solche Standorte aufgeforstet und können so auch nicht mehr als Rückzugsgebiete für Ackerunkräuter fungieren. Aus Gründen des Artenschutzes wäre es unbedingt erforderlich, die ackerbauliche Nutzung, insbesondere den Anbau von Getreide, in extensiver Form weiter zu betreiben.

Aus fachlicher Sicht wäre in allen Fällen die Bewirtschaftung eines herbizidfreien Randstreifens durchaus ausreichend für die Erhaltung der seltenen Ackerunkräuter. Allerdings reichen die für einen Randstreifen gezahlten Beträge als Anreiz für eine weitere Bewirtschaftung der Flächen offensichtlich nicht aus. Eine Förderung ganzer Ackerflächen war bisher in Unterfranken aufgrund der Vielzahl der Antragsteller nicht möglich, obwohl die Flächengröße im allgemeinen nur zwischen 0,3 und 1,2 Hektar liegt. Inzwischen wurden bereits 14 % der Standorte gefährdeter Arten, die 1985 in das Ackerrandstreifenprogramm aufgenommen wurden, von den Landwirten wegen Nutzungsaufgabe gekündigt.

Als Beispiel sei der einzige aktuelle Standort von Androsace elongata (Langgestielter Mannsschild) in Bayern genannt, der sich in einer extensiv bewirtschafteten Ackerfläche auf Schilfsandsteinverwitterung am Südrand des Poppenholzes (Herbstadt, Lkr. Rhön-Grabfeld) befindet. Der Eigentümer der Fläche war zwar 1985 bereit, sich am Ackerrandstreifenprogramm zu beteiligen. Er will jedoch die ackerbauliche Nutzung der Fläche aufgeben, da es sich um eine ortsfern gelegene und schwer zu bewirtschaftende Hangfläche handelt. 1986 wurde auf dem Acker Klee angesät; Androsace elongata wurde seitdem aufgrund fehlender Bodenbearbeitung zunehmend seltener. Bei einer Ausgleichszahlung für die gesamte Fläche wäre der Landwirt vermutlich bereit, die extensive Bewirtschaftung wieder aufzunehmen.

In ähnlicher Form haben viele Landwirte in Unterfranken bereits angedeutet, daß sie nur auf entsprechende Förderprogramme der Flächenstillegung warten. Die Flächenstillegung hätte katastrophale Auswirkungen auf die Situation des Artenschutzes gefährdeter Ackerunkräuter; es ist zu befürchten, daß fast alle Wuchsorte gefährdeter Arten, die derzeit am Randstreifenprogramm beteiligt sind, verloren gehen würden.

Das Förderungsprogramm für schmale Randstreifen von 2 bis 5 Meter Breite ist in den benachteiligten Agrarzonen Unterfrankens nicht ausreichend, um die notwendige Bewirtschaftung der Flächen sicherstellen zu können. Auf allen geeigneten Ackerflächen mit Wuchsorten der stark gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Ackerunkräuter müssen Möglichkeiten zum Vertragsabschluß für einen breiteren Randstreifen (20 bis 30 Meter) oder für die gesamte Fläche geschaffen werden.

6. Ergebnisse in hochwertigen Ackerbaugebieten Unterfrankens

Die hochwertigen, guten Ackerbaugebiete, wie sie insbesondere in den Landkreisen Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen großflächig vorkommen, werden äußerst ertragsintensiv bewirtschaftet. Auf den ertragreicheren Standorten erfolgt ein vergleichsweise hoher Aufwand ertragssteigernder Mittel (z.B. Dünger), da hier die höchsten Gewinne erwirtschaftet werden können. Infolge weitestgehender Intensivierung und Spezialisierung (z.B. stark eingeengte Fruchtfolgen) wird eine immer umfassendere Anwendung von Bioziden erforderlich.

Bei der Vorauswahl von potentiell für das Ackerrandstreifenprogramm geeigneten Ackerrändern wurden nur Flächen aufgenommen, die mit einer Seite an Biotope angrenzen, und auf denen früher nachweislich seltene Arten vorkamen. Aus dem Schweinfurter Becken sind ehemalige Standorte von Nigella arvensis, Scandix pecten-veneris, Arnoseris minima und Androsace elongata bekannt, und auch für die Würzburger Umgebung geben alte Floren Arten an, die hier inzwischen längst verschwunden sind, wie Nigella arvensis und Orlaya grandiflora. SCHENK bezeichnet in seiner "Flora der Umgebung von Würzburg" (1948) Caucalis platycarpos und Conringia orientalis als "gemein" und Legousia Speculum-veneris und Bupleurum rotundifolium als "nicht selten". Infolge der klimatischen Begünstigung kam das Caucalido-Adonidetum mit seinen floristischen Raritäten, das sich heute auf die Kalkscherbenböden des nördlichen Unterfranken zurückgezogen hat, früher auch auf den tiefgründigen Lößböden des Würzburger Raumes vor (ULLMANN 1977).

Die Ergebnisse sind aus Sicht des Artenschutzes auf allen untersuchten herbizidfreien Randstreifen völlig unbefriedigend. Selbst nach 3jährigem Verzicht auf Herbizide traten gefährdete oder seltene Unkrautarten ebensowenig auf wie typische Ackerunkrautgesellschaften. Ein Verzicht auf Herbizide unter Beibehaltung aller anderen heute üblichen Bewirtschaftungsfaktoren brachte demnach nicht den erhofften Erfolg für den Artenschutz. Statt dessen kam es regelmäßig zu Massenvermehrungen von ganz wenigen, häufigen Allerweltsunkräutern, insbesondere von stickstoffliebenden Arten

wie Stellaria media, Galium aparine, Lamium amplexicaule und L. purpureum, Chenopodium album, Polygonum aviculare und P. convolvulus. Vielfach wurde ein geradezu explosionsartiges Auftreten von Problemunkräutern festgestellt, das bis zum völligen Ertragsausfall führen konnte, und mit zunehmender Versuchsdauer auch eine wachsende Gefahr für angrenzende Ackerflächen darstellt. Viele Problemunkräuter, die früher zumindest regional unbekannt waren, insbesondere die Grasarten Windhalm, Flughafer und Ackerfuchsschwanz, haben sich durch das Mähdruschverfahren überall stark ausgebreitet. Auf den ungespritzten Randstreifen war ein von Jahr zu Jahr zunehmender Unkrautdruck zu beobachten, was zur Folge hatte, daß angrenzende Flächen noch stärker gespritzt wurden, um eine Ausbreitung der Problemunkräuter auf größere Flächen zu verhindern. In solchen Fällen erscheint die Durchführung des Ackerrandstreifenprogrammes ökologisch eher bedenklich, da insgesamt keine Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation erreicht wird.

Es besteht kein Zweifel, daß gerade in der intensiv genutzten Agrarlandschaft die Schaffung von Refugien für gefährdete Arten dringend notwendig wäre. Dieses Ziel ist allerdings durch den Verzicht auf Herbizide im Rahmen des Ackerrandstreifenprogrammes nicht zu verwirklichen. Auch der zusätzliche Verzicht auf Düngung ist nicht ausreichend, denn die Extensivierung darf sich hier nicht auf Einzelfaktoren beschränken; langfristig erfolgversprechend wäre nur eine Rückkehr zur völlig extensiven Nutzung, was eine weitgehende Änderung der gesamten heute üblichen Bewirtschaftung erfordern würde. Neben dem Verzicht auf Biozide und Düngung ist die Wiedereinführung geeigneter abwechslungsreicher Fruchtfolgen, insbesondere mit Anbau von Feldfutterpflanzen (Klee, Luzerne) oder die Wiedereinführung einer zwischengeschalteten einjährigen Brache unerläßlich. Bei der Bodenbearbeitung sollte auf schwere Maschinen verzichtet werden, um eine weitere Bodenverdichtung zu vermeiden. Zweckmäßig wären Änderungen der Zeitpunkte der Bodenbearbeitung, z.B. Verzicht auf Stoppelbearbeitung, weil einige Arten (z.B. Kickxia) sich erst nach der Ernte voll entfalten.

Zu derartigen umfassenden Umstellungen sind einige Landwirte zwar grundsätzlich bereit; jedoch läßt sich eine so wesentlich veränderte Bewirtschaftung verständlicherweise nicht auf schmalen Randstreifen von 2 bis 5 Metern Breite realisieren. Auf geeigneten Standorten wäre eine Mindestbreite der Randstreifen von 20 bis 30 Metern erforderlich; noch besser wäre natürlich eine extensive Bewirtschaftung ganzer Flächen. Nur in dieser erweiterten Form kann das Ackerrandstreifenprogramm langfristig in hochwertigen Anbaugebieten für den Artenschutz Erfolge bringen.

Sehr vereinzelt können auch heute noch Reste einer ehemals reichen Segetalflora vorkommen. Auf Flächen, die bereits sehr lange extensiv bewirtschaftet werden, können tatsächlich noch gefährdete Arten und seltene Pflanzengesellschaften nachgewiesen werden, die sonst aus der Umgebung längst verschwunden sind, z.B. Legousia speculum-veneris in Thüngersheim, Bupleurum rotundifolium in Leinach (Lkr. Würzburg). Dies beweist, daß die seltenen Arten auch aus Gebieten, die besonders stark vom Artenrückgang betroffen sind, noch nicht völlig verschwunden sind, und daß auch hier die Möglichkeit zu einer Sicherung des Artenpotentials besteht.

7. Zusammenfassung und Empfehlungen für den zukünftigen Einsatz des Ackerrandstreifenprogrammes

Durch das Ackerrandstreifenprogramm ist eine Integration landwirtschaflicher Nutzung und der Zielsetzungen des Arten- und Biotopschutzes in optimaler Weise möglich geworden. Bewirtschaftungsvereinbarungen mit Landwirten sind das einzige geeignete Mittel, um in einer lebendigen Kulturlandschaft die Existenz gefährdeter Arten zu sichern. Der große Anklang, den das Ackerrandstreifenprogramm bei den Landwirten in Unterfranken gefunden hat, belegt die Bereitschaft der Landwirte zur aktiven Mitarbeit bei naturschutzfachlichen Problemen. Grundsätzlich ist die Mehrzahl der Landwirte daran interessiert, durch naturschonende extensive Bewirtschaftung zu einer dauerhaften Lösung der anstehenden Probleme des Arten- und Biotopschutzes beizutragen.

Bei extensiver Bewirtschaftung sind auf den Vertragsflächen des Ackerrandstreifenprogrammes in Unterfranken alle gefährdeten Arten der Roten Listen aufgetreten. Gleichzeitig erfüllen die Vertragsflächen Puffer- und Vernetzungsfunktionen für angrenzende schutzwürdige Biotope. Damit wird bestätigt, daß eine extensive Bewirtschaftung von Ackerflächen durch Landwirte sowohl aus Sicht des Artenschutzes die angestrebten Zielsetzungen erfüllt, wie auch zu einer allgemeinen Verbesserung der ökologischen Situation in der Kulturlandschaft beiträgt.

Allerdings stellt das Ackerrandstreifenprogramm in Unterfranken durch seine bisherige Beschränkung auf sehr schmale Streifen von 2 bis 5 Meter Breite auf Dauer kein ausreichendes Mittel dar, um den Rückgang von gefährdeten Arten wirksam aufzuhalten. In den ertragsschwächeren Bereichen ist die Nutzungsaufgabe als Hauptgefährdungsursache anzusehen. Diese Entwicklung ist mit den begrenzten finanziellen Möglichkeiten des Randstreifenprogrammes nicht aufzuhalten. In den intensiver genutzten Bereichen ist eine weitgehende Umstellung der Bewirtschaftung erforderlich, die sich ebenfalls auf schmalen Randstreifen nicht realisieren läßt.

Für eine effektive Sicherung des Artenpotentials gefährdeter Ackerunkräuter ist daher eine Modifizierung des Ackerrandstreifenprogrammes notwendig. Auf geeigneten Standorten mit besonderer Bedeutung für den Artenschutz ist eine Mindestbreite des Randstreifens von 20 bis 30 Metern erforderlich, noch besser wäre jedoch eine extensive Bewirtschaftung ganzer Flächen.

Die genannte dringend erforderliche Erweiterung der bisher abgeschlossenen Randstreifen-Verträge mit Artenschutzfunktion kann mit den vorhandenen Fördermitteln in Unterfranken nicht verwirklicht werden. Ebenso ist eine entsprechende Berücksichtigung der neu dazu kommenden fachlichen Vorgaben des Arten- und Biotopschutzprogrammes mit den bisherigen Fördermitteln nicht möglich.

Eine finanzielle Aufstockung des Ackerrandstreifenprogrammes ist somit vordringlich, da man den Erfolg eines Artenschutzprogrammes letztlich nicht nach der Länge der Randstreifen beurteilen wird, sondern danach, ob es gelingt, den Artenrückgang aufzuhalten.

8. Literatur

MEIEROTT, L. (1983): Zur aktuellen Verbreitung seltener Ackerunkräuter im nordöstlichen Unterfranken. Naturw. Jahrb. Schweinfurt $\underline{1}$: 34-61

MEIEROTT, L. (1986): Neues und Bemerkenswertes zur Flora Unterfrankens. Ber. Bayer. Bot. Ges. $\underline{57}$: 81-94

RITSCHEL-KANDEL, G. (1985): Lebensräume in Unterfranken - Der Getreideacker. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 23/24:: 37-60

SCHENK, A. (1848): Flora der Umgebung von Würzburg. Regensburg

SCHUMACHER, W. (1980): Schutz und Erhaltung gefährdeter Ackerwildkräuter durch Integration von landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz. Natur und Landschaft $\underline{55}$: 447-452

ULLMANN, I. (1977): Die Vegetation des südlichen Maindreiecks. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 36: 5-190

1. Mitgliederstand

Am 1.1.1984: 311, am 31.12.1984: 312 Mitglieder.

2. Veranstaltungen

a) Vorträge

- 13. 1.84 Prof. Dr. Wilhelm Simonis, Würzburg"Ökologie der Altwässer in botanischer Sicht"
- 27. 1.84 Ministerialrat Dr. Moser, München
 "Die Agrarleitplanung"
- 10. 2.84 Dr. Peter Titze, Erlangen
 "Die fränkische Teichlandschaft im Spannungsfeld
 zwischen wirtschaftlicher Nutzung, Naturschutz und
 Naherholung"
- 24. 2.84 Prof. Dr. Günter Witsch, Erlangen
 "Weltentwicklungsmodelle"
- 25. 5.84 Dipl.-Geogr. Bernd M. Schmitt, Würzburg "Landschaftsökologische Untersuchungen im Raum der Stadt Würzburg"
- 29. 6.84 Hans-Heinrich von Hagen, Lutterbeck b. Göttingen "Biologie und Schutzmöglichkeiten der Hornissen"
- 13. 7.84 Dr. Eberhard Schneider, Göttingen "Chancen und Voraussetzungen für die Wiederansiedlung des Bibers in Mitteleuropa"
 - 9.11.84 Dipl.-Forstw. Wolfgang Dietzen, München "Birkwild in der Hohen Rhön"
- 30.11.84 Veterinärdirektor Dr. Eberhard Saupe, Würzburg
 "Parasitäre Erkrankungen des Igels"
- 14.12.84 Landschaftsarchitekt Harald Braun, Veitshöchheim
 "Die Pflanzenwelt der Halbtrocken- und Trockenrasen,
 der Gebüsche und Säume der Mainfränkischen Platten"
 Vor der Vortragsveranstaltung Verleihung des Unter=
 fränkischen Naturschutzpreises an Prof. Dr. Hans
 Zeidler

b) Exkursionen und andere Veranstaltungen

- 18. 2.84 Besuch der Ziegenhaltung von Georg Götzelmann, Teilheim
- 10. 3.84 Seminar "Rettet die Frösche". Biologie und Schutz der Amphibien mit praktischen Anweisungen
- 7./8. 4.84 Exkursion Rhein-Main-Donaukanal: Eine Landschaft ändert ihr Gesicht
 - 5. 5.84 Wanderung in den Alandsgrund. Führung: Dipl.-Biol. Sigrid Ulrich
 - 6. 5.84 Botanische Exkursion zur Muschelkalkflora und -vege=
 tation des Kalbenstein (Blütenpflanzen und Flechten).
 Leitung: Dr. Gabriele Ritschel
- 27. 5.84 Botanische Exkursion in den Steigerwald (Mahlholz Murrleinsnest Stollberg). Leitung: Prof. Dr. Hans Zeidler
 - 3. 6.84 Vogelkundliche Exkursion zu den Gerolzhofener Seen. Leitung: StDir. Hermann Kneitz, Emil Götz
 - 6. 6.84 Vogelkundlicher Abendspaziergang im Raum Thüngersheim. Führung: StDir. Hermann Kneitz, Emil Götz
- 11. 6.84 Waldmeisterexkursion zum Sodenberg. Heimat- und natur= kundliche Wanderung (Reichenbuch Aschenroth Höllrich). Führung: Dr. Elmar Ullrich
- 8. 7.84 Botanische Exkursion zum Schwanberg. Leitung: Prof. Dr. Hans Zeidler
- 14. 7.84 Fahrt in das Schondratal und den Spessart. Erkundung von möglichen Biberstandorten
- 26.12.84 Vogelkundlicher Spaziergang in Würzburgs Anlagen. Führung: StDir. Hermann Kneitz, Emil Götz

c) Botanische Vereinigung Unterfranken mit Arbeitskreis Heimische Orchideen

d) Aquarienabteilung

- Die Veranstaltungen fanden jeweils am Dienstag um 20 Uhr im Vereinslokal "Bayerischer Hof", Sanderstraße, statt:
- 17.01.84 Ausspracheabend
- 31.01.84 Lichtbildervortrag von Bezirksfreund Kahn:
 "Die Haltung von Niederen Tieren im Seewasseraquarium"
- 14.02.84 Ausspracheabend
- 28.02.84 Vortrag von Vereinsfreund Mayer, Bezirksreferent für Fischkrankheiten:

 " Krankheiten der Aquarienfische was ist zu tun? "
- 13.03.84 Lichtbildervortrag von Bezirksfreund Krach, Bezirksreferent für Wasserpflanzen:
 " Die Pflanzenwelt des Aquariums "
- 27.03.84 Ausspracheabend
- 10.04.84 Lichtbildervortrag von der VDA-Zentralbildstelle:
 " Tropische Fische und ihre Lebensräume in Ostasien und Amazonien "
- 24.04.84 Ausspracheabend
- 08.05.84 Lichtbildervortrag mit der von uns hergestellten Fachserie:

 " Die Wasserentsalzung in Theorie und Praxis "
- 22.05.84 Ausspracheabend
- 05.06.84 Lichtbildervortragvom Aquarienverein Schwandorf:
 " Vielfalt der Aquaristik "
- 19.06.84 Ausspracheabend
- 03.07.84 Lichtbildervortrag vom Aquarienverein Schwandorf: "Vereinsbeckenschau 1980 "
- 17.07.84 Ausspracheabend
- 11.09.84 Lichtbildervortrag von der VDA-Bildstelle Nord:

 " Der Urwald im Wohnzimmer Bau und Betrieb eines l'aludariums "
- 25.09.84 Lichtbildervortrag von Der VDA-Bildstelle Nord: " Das Tier im Bild "
- 09.10.84 Lichtbildervortrag von der VDA-Bildstelle Süd:
 " Karibische Plauderei "
- 23.10.84 Ausspracheabend
- 06.11.84 Lichtbildervortrag von Vereinsfreund Fojtu:
 " Zauber der Wasserwelt "
- 20.11.84 Ausspracheabend
- O4.12.84 Lichtbildervortrag von der VDA-Zentralbildstelle:

 " Korallengärten der Südsee "
 Für 20-jährige Vereinszugehörigkeit wurden mit der
 Silbernen Ehrennadel des VDA ausgezeichnet:
 Frau Maria Riedmann, Herr Heinz Länger, Herr Walter
 Nosek und Herr Georg Paulus

Fritz Holzmann

e) Ornithologische Arbeitsgruppe

Die Treffen der Ornithologischen Arbeitsgruppe fanden wie bisher an jedem 2, Mittwoch im Monat im Wirsberg-Gymnasium statt. Sie dienten einerseits dem Austausch von Beobachtungen andererseits der Planung der weiteren Arbeit wie auch von Schutzmaßnahmen. Im Laufe des Jahres wurden unter Leitung von StDir. Hermann Kneitz und Emil Götz mehrere vogelkundliche Exkursionen durchgeführt. Ebenso sorgte StDir. Dr. Hilmar Beck für die traditionellen Vogelstimmenexkursionen.
Das über einen längeren Zeitraum laufende Kartierungsprogramm der Brutvögel im Landkreis Würzburg wird von den Mitarbeitern der Arbeitsgruppe weitergeführt.

f) Arbeitskreis Botanik und Ökologie in Unterfranken: Kartierung gefährdeter Arten der "Roten Liste" als Grundlage der praktischen Naturschutzarbeit.

Angesichts der zunehmenden Verschlechterung der ökologischen Situation in Unterfranken erscheinen Kontrollen der Effektivität bisheriger Strategien des Naturschutzes dringend notwendig.

Um Erfolge bzw. Mißerfolge für den Arten- und Biotopschutz nachzuweisen, werden Zeigerarten für ausgewählte schutzwürdige Lebensräume kartiert. Die Entwicklung der Vegetation anthropogener Lebensräume bei unterschiedlichen Pflegemaßnahmen wird nach Anlage von Dauerbeobachtungsflächen langfristig dokumentiert. Schwerpunktmäßig werden ausgewählte Lebensräume in Naturschutzgebieten der Landkreise Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und Main-Spessart beobachtet. Die Kartierungsergebnisse haben Bedeutung als Grundlage für die zukünftige praktische Naturschutzarbeit in Unterfranken.

Gabriele Ritschel-Kandel

3.) Kassenbericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg e.V.

für das Kalenderjahr 1984

Salden per 1.1.1984 :		Ausgaben 1984 :		
hasse	110,30 DM	Programmdruck	565,44	DM
Postscheck-Konto	3.473,12 DM	Plakatdruck	1.004,92	DM
Girokto.Bayer.Vereinsbk.	9.688,24 DM	Kosten für Referenten	1.875,20	DM
⊃parkto.Städt.Sparkasse	866,21 DM	Hörsaal - Miete	440,	DM
Pfandbriefe	20.000, DM	Kosten für Abhandlungen	17.632,11	DM
	34.137,87 DM	Porto - Kosten	543,15	DM
		Telefon - Kosten	42,	DM
Einnahmen 1984:		Kosten für Verwaltung	158,88	DM
Mitgliedsbeiträge	8.250, DM	Bankspesen für Giro-, Spa	.r-,	
Zinsen für Pfandbriefe	1.700, DM	Postsch.Kto., Pfandbrie	fe 170,55	DM
Zinsen für Sparkonto	25,96 DM	Kosten für Ehrungen und	107.00	D 14
Zuschuß Bez. Unterfranken	1.100, DM	Ufr.Naturschutzpreis	427,20	
Zuschuß Bayer.Kultus-		Kosten für Aquarienabteil	- ,-	
Ministerium	1.000, DM	Beitrag Unfall-Versicher.	95,	DM
Spenden	6.162, DM		23.593,35	DM_
Eintritt für Vorträge	190, DM	Salden per 31.12.1984 :		
Beteiligung Frankenbund		Kasse	393,32	DM
an Vortragskosten	100, DM	Postscheck-Konto	4.603,54	DM
Einnahmen für Abhandlung		Girokto. Bayer. Vereinabk.	5.431,05	DM
	20.765,56 DM	Sparkto.Städt.Sparkasse	882,17	DM
		Pfandbriefe	20.000,	DM
			31.310.08	DM_

54.903,43 DM 54.903,43 DM

Würzburg, 28. Januar 1985

hassenprüfer : Heinz Kaßner Fritz Holzmann

Karl-Hermann Kleinschnitz, Kassenwar

4. Jahresmitgliederversammlung am 1.2.1985

 a) Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden Prof. Dr. Gerhard Kneitz über das Jahr 1984.

Die unterschiedlichen Themenkreise, welche Vorträge, Ex= kursionen und Besichtigungen ansprachen, fanden überwiegend großes Interesse. Somit behält der NWV als traditionelle Vereinigung, welche naturwissenschaftliche Erkenntnisse sammelt und in die Bevölkerung trägt, gleichbleibende Be= deutung. -

Im Berichtsjahr wurde der Doppelband 21/22 (1980/81) der Abhandlungen erstmals in veränderter äußerer Aufmachung und in reicher Ausstattung mit Abbildungen herausgegeben. Einen mutigen Schritt tat der NWV mit der Übernahme der Trägerschaft des "Rhön-Projektes", eines Auftrages des Landkreises Rhön/Grabfeld. Hierfür sind im Bereich des Na=turschutzgebietes "Lange Rhön" in großem Umfang vegetations=kundliche und faunistische Erhebungen durchzuführen, auf deren Grundlage biotoplenkende Maßnahmen, bzw. ein Pflege=plan für die Region erarbeitet werden sollen.

Der 1. Vorsitzende spricht Frau Dr. Gabriele Ritschel-Kandel besonderen Dank für die großen Verdienste aus, welche sie

Der Unterfränkische Naturschutzpreis wurde am 14.12.1984 an Prof. Dr. Hans Zeidler, Würzburg, vergeben.

sich mit der Herausgabe der Abhandlungen sowie um das Zu=

standekommen des "Rhön-Projektes" erworben hat.

Während des Jahres verstarben 5 Mitglieder: Julius Hain, Ekkehard Klopsch, Margarethe Marstaller, Kilian Schneider und Margarethe Weigert.

b) Kassenbericht und Entlastung.

Karl-Hermann Kleinschnitz erläutert den Kassenbericht.

Als wesentlicher Ausgaben-Posten hat der Druck des Doppel=
bandes der Abhandlungen die Finanzen des NWV stark belastet.

Glücklicherweise wurde dies durch verschiedenen Zuschüsse
und eine erfreuliche Zahl von Spenden aufgewogen. Auch der

Verkauf der Abhandlungen trug zu einem guten Abschluß bei. -

Die Versammlung erteilt dem Vorstand Entlastung.

c) Wahl des Vorstands und der Kassenprüfer. Nach Ablauf der 2-jährigen Wahlperiode muß der Vorstand neu gewählt werden. Der bisherige 2. Vorsitzende, Prof.

Paul Seus, scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem

Vorstand aus.

Bei der folgenden Wahl werden wiedergewählt, bzw. neu hin= zugewählt: 1. Vorsitzender: Prof. Dr. Gerhard Kneitz, 2. VS: Dr. Walter Füchtbauer, 3. VS: Dr. Wolfgang Trapp, (neu hin= zugewählt), Schrift- und Geschäftsführer: Diethild Uhlich, Stellv. Schriftführer: Dr. Maria Grünsfelder (neu hinzu= gewählt), Kassenwart: Hermann Kleinschnitz, Schriftleiter: Dr. Gabriele Ritschel-Kandel. Als Kassenprüfer werden Heinz Kaßner und Fritz Holzmann wiedergewählt.

d) Verschiedenes.

Der 1. Vorsitzende dankt Prof. Paul Seus für sein lang= jähriges Engagement für den NWV und für seine 18-jährige Vorstandstätigkeit. Des weiteren weist Prof. Kneitz auf den im Juni 1986 in Würzburg geplanten Deutschen Umwelttag hin. Hierzu soll der NWV nach seinen Möglichkeiten auch einen Beitrag liefern.





Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg e. V.

Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Würzburg

Band 2, H. 1 (1961) - 30. - DM

Faunistische und floristische Untersuchungen in der Rhön.

- a) G. Kneitz: Geographische Charakteristik der Rhön.
- b) G. KNEITZ und G. Voss: Die Vegetationsgliederung der Rhönhochmoore.
- c) G. Hanusch: Zur zoologischen Erforschung der Rhön.
- d) K. Gösswald und W. Halberstadt: Zur Ameisenfauna der Rhön.
- e) P. Ehrhardt, W. Kloft und H. Kunkel: Zur Aphidenfauna der Hochrhön.
- f) G. SCHMIDT und E. SCHULZE: Ökologische Untersuchungen zur Orthopterenfauna des Rhöngebirges.
- g) W. Berwig: Einige Bemerkungen zur Käferfauna der Hochrhön.
- h) A. Schug: Bemerkungen zur Odonatenfauna der Rhön.
- W. KIRCHNER: Einige Bemerkungen zur Ökologie der Araneiden im Roten und Schwarzen Moor.
- k) A. RIEDL: Ökologische Untersuchungen über terrestrische Milben aus Rhönmooren.
 - H. STADLER: Von der Vogelwelt des Spessarts.
 - H. HÄUSNER und M. OKRUSCH: Das kristalline Grundgebirge des Vorspessarts.

Band 3, H. 1 (1962) - 20. - DM

HALTENHOF, M.: Lithologische Untersuchungen im Unteren Muschelkalk von Unterfranken (Stratinomie und Geochemie).

Band 3, H. 2 (1962) - 20. - DM

Weise, R.: Vegetation und Witterungsverlauf 1961 im Würzburger Raum.

MATHEIS, P.: Ein seltener Pilzfund in Würzburg.

STADLER, H.: Die Mollusken des Naturschutzgebietes Romberg-See von Sendelbach.

STADLER, H.: Die unbekannte Larve eines bekannten Ameisengastes.

KROMA, J.: Karstmorphologische Beobachtungen im westlichen Unterfranken.

HARZ, K.: Seltsame Schmetterlingsnahrung.

AUVERA, H.: Die Flora des Klosterforstes und seiner Randgebiete.

RUTTE, E.: Der Hauptmuschelkalk am Maintalhange von Köhler.

SANDER, K.: Beobachtungen über die Fortpflanzung der Kleinzikade Aphrodes bicinctus SCHRK.

HOFFMANN, U.: Zur Geologie des Maintales bei Marktbreit.

Band 4 (1963) - 20.— DM

PRASHNOWSKY, A. A.: Ursprung und Entwicklung des Lebens auf der Erde.

Weise, R.: Vegetation und Witterungsverlauf 1962 im Würzburger Raum.

OKRUSCH, M.: Die Anfänge der mineralogisch-petrographischen Erforschung des Vorspessarts.

KRUMBEIN, W.: Über Riffbildungen von *Placunopsis ostracina* im Muschelkalk von Tiefenstockheim bei Marktbreit in Unterfranken.

WEISS, J.: Die "Würzburger Lügensteine".

Band 5/6 (1964/65) - 30. - DM

HOFMANN, W.: Laubwaldgesellschaften der Fränkischen Platte.

Band 7 (1966) - 23.- DM

AUVERA, H.: Die Rebhügel des mittleren Maingebietes, ihre Flora und Fauna.

WEISE, R.: Vegetation und Witterungsverlauf im Würzburger Raum 1964-1965.

Weise, R.: Bodenwasserhaushalt 1964-1965 im Würzburger Talkessel

HEROLD, A.: Naturgeographische Grenzsäume und altertümliche Anbautraditionen.

MATHEIS, P.: Der weiße oder Frühlingsknollenblätterpilz.

Band 8 (1967) - 20.- DM

RUTTE, E.: Die Cromer-Wirbeltierfundstelle Würzburg-Schalksberg.

GROSSMANN, A.: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in der Rhön und im Fuldaer Gebiet.

BUSCH, K.: Der Keuper im Steigerwald bei Gerolzhofen.

KNEITZ, G. und KNEITZ, H.: Beobachtungen zum Vorkommen von Enten- und Rallenvögel auf dem unterfränkischen Main unter Berücksichtigung des extremen Winters 1962/63.

Band 9 (1968) - 20.- DM

SCHUA, L.: Siebzehn Jahre Gewässergüteuntersuchungen am Main im Regierungsbezirk Unterfranken/Bayern.

Band 10 (1969) - 20.- DM

AUST, H.: Lithologie und Paläontologie des Grenzbereiches Muschelkalk-Keuper in Franken.

Band 11 (1970) - 20.- DM

KNEITZ, G.: 50 Jahre Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg e. V.

DIPPOLD, Gegenwartsprobleme der Forstwirtschaft in Unterfranken.

SCHNEEBERGER, J.: Landschaft und Flurbereinigung - Widerspruch oder Synthese?

GROSSMANN, A.: Neue Beiträge zur Flora der Rhön und des Fuldaer Landes.

VOSSMERBÄUMER, H.: Zur bathymetrischen Entwicklung des Muschelkalkmeeres in Mainfranken.

MALKMUS, R.: Die Verbreitung der Larve des Feuersalamanders (Salamandra salamandra salamandra und terrestris) im Spessart.

KNEITZ, G.: Dr. Hermann Zillig, der Begründer des Naturwissenschaftlichen Vereins e. V. 1919 und Initiator des Fränkischen Museums für Naturkunde.

MATHEIS, P.: Zum Gedenken an Dr. Heinrich Zeuner.

HOFMANN, W.: Eine Übersichtskarte der natürlichen Vegetationsgebiete von Bayern und ihre Bedeutung für die geobotanische und geographische Forschung in Mainfranken.

Band 12 (1971) - 15.- DM

MALKMUS, R.: Die Verbreitung der Molche im Spessart.

Malkmus, R.: Die Verbreitung der Larve des Feuersalamanders (Salamandra salamandra salamandra und terrestris) im Spessart (1. Ergänzung).

KNEITZ, G.: Max Schultze und das Gelehrtenleben um die Jahrhundertwende in Würzburg

Band 13 (1972) - 30.- DM

ULLMANN, I.: Das Zeubelrieder Moor. – Pflanzensoziologische und vegetationskundliche Untersuchungen des Naturschutzgebietes.

KNEITZ, G.: Otto Appel und die Botanische Vereinigung Würzburg.

Band 14 (1973) - 20.- DM

Weise, R.: Der Einfluß der Staustufen und der Baggerseen auf das Bestandsklima der Weinberge am Main.

SCHUA, L.: Geheimnisvolles Wasservogelsterben im Schönbuschsee bei Aschaffenburg – eine Folge der Umweltverschmutzung.

MALKMUS, R.: Verbreitung der Schlingnatter (Coronilla austriaca) im Spessart.

MALKMUS, R.: Die Laichplätze der Amphibien des Spessarts.

MALKMUS, R.: Die Verbreitung der Molche im Spessart.

Band 15 (1974) - 20.- DM

BROD, W. M.: Eine Beobachtung über den Zug der Fische im Main aus dem Jahre 1812.

RITSCHEL, G.: Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung xero- und basiphiler Erdflechten in Mainfranken.

SCHMIDT, G. H. UND BAUMGARTEN, M.: Untersuchungen zur räumlichen Verteilung, Eiablage und Stridulation der Saltatorien am Sperbersee im Naturpark Steigerwald.

KNEITZ, G.: Haferl, der Prediger oder über die Kunst trotzdem zu leben.

Band 16 (1975) - 20.- DM

TRUSHEIM, F.: Die Fundstelle pleistozäner Säugetiere im Karst von Karlstadt am Main.

BETHGE, E.: Eulen im Würzburger Raum und ihre Ernährung, vor allem im Hinblick auf das Vorkommen von Kleinsäugern.

LINK, O.: Wildstand und Jagd im Bereich des Forstamtes Neuwirtshaus - einst und heute.

MALKMUS, R.: Zur Biologie und Verbreitung der Kröten im Spessart.

Band 19 (1978) - 20.- DM

KNEITZ, G.: Karten zur Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten im Lebensraum Unterfranken. I. Floristischer Teil.

Band 20 (1979) - 20.- DM

KNEITZ, G.: Karten zur Verbreitung von Pflanzen- und Tierarten im Lebensraum Unterfranken. II. Faunistischer Teil.

Band 21/22 (1980/81) - 40.- DM

VAUPEL, A.: Das Klima in Mainfranken - prägender Bestandteil seiner Umwelt.

RUTTE, E.: Bemerkungen zu einer geologischen Karte des Landkreises Würzburg.

KARL, H.: Unterfränkische Aspekte zur Entwicklung des Naturschutzes bis zum Ende des 2. Weltkrieges.

BUSCHBOM, U.: Der Botanische Garten der Universität Würzburg.

LÖSCH, R.: Die Ökologie der mainfränkischen Kalktrockenrasen.

 $\label{eq:Ritschel-Kandel} \textbf{Ritschel-Kandel}, \ G.: \ \textbf{Naturschutzkartierung im Regierungsbezirk Unterfranken - Ein Aufruf zur Mitarbeit.}$

MICHEL, V.: Über die Entstehung und Erhaltung der Kulturlandschaft im Würzburger Raum. Schua, L.: Die Reaktivierung biologisch-ökologischer Systeme zur Stärkung der Selbstreini-

gung im Main, als Ausgleich für die ökologischen Schäden des Ausbaues zur Schiffahrtsstraße. Ullmann, I.: Die Vegetation in den unterfränkischen Regionen 1 und 2.

GÖSSWALD, K.: Unsere Ameisen im mittleren Maingebiet.

GRÜNSFELDER, M.: Arzneipflanzen in Mainfranken.

MEIEROTT, L.: Verlust und Gefährdung des Bestandes an höheren Pflanzen in Unterfranken.

REIF, A.: Die Hecken in Mainfranken.

Kraus, K.: Die Cladoceren (Wasserflöhe) der Main-Altwässer zwischen Würzburg und Randersacker.

ZIEGLER, R.: Beobachtungen zum unauffälligen Leben der Moose im fränkischen Muschelkalkgebiet.

WITTMANN, O.: Die Böden der Weinberge in Franken.

FALKENHAN, H.-H.: 25 Jahre Pilzberatung auf dem Marktplatz in Würzburg.

Band 23/24 (1982/83) - 35.- DM

GRÜNSFELDER, M.: Zum Gedenken an Paul Matheis.

MALKMUS, R.: Soziale Thermoregulation bei Larven des Grasfrosches (Rana temporaria L.).

LÖSCH, R.: Helianthemum x sulphureum Willd. und die Blüh-Phänologie der unterfränkischen Helianthemum-Arten.

RITSCHEL-KANDEL, G., KIMMEL, C. und SCHÄFER, E.: Die Wuchsorte von Blysmus compressus (Zusammengedrücktes Quellried) in Unterfranken.

RITSCHEL-KANDEL, G.: Lebensräume in Unterfranken: Der Getreideacker.

RITSCHEL-KANDEL, G., KIMMEL, C. und SCHÄFER, E.: Der Gute Heinrich (Chenopodium bonushenricus) in der Rhön.

BAUCHHENSS, E. und SCHOLL, G.: Bodenspinnen einer Weinbergsbrache in Maintal (Steinbach, Krs. Haßberge). Ein Beitrag zur Spinnenfaunistik Unterfrankens.

MÜHLENBERG, M. und LINSENMAIR, K. E.: Aus der Arbeit der Ökologischen Station Fabrikschleichach der Universität Würzburg.

ULLRICH, E.: Voltaires Raumfahrterzählung "Micromegas" und die Astronomie von damals und heute.

Band 25 (1984) - 25.- DM

RITSCHEL-KANDEL, G.: Hilfsprogramm für Spinnen und Insekten – Ungedüngte Altgrasstreifen.

ZUR STRASSEN, R.: Phänologie und Dominanz von Fransenflüglern (Insecta: Thysanoptera) im Muschelkalkgebiet des Kalbensteins bei Karlstadt Main in Unterfranken.

SERGEL, R.: Ein weiterer Nachweis der Cixiide Hyalesthes absoletus SIGNORET in Franken (Homoptera: Auchenorrhyncha: Fulgoroidea).

SERGEL, R.: Der Europäische Laternenträger (Dictyophara europaea) in Unterfranken.

Band 26 (1985) - 25.- DM

TÜRK WINFRIED: Waldgesellschaften im Schweinfurter Becken.

Malkmus Rudolf: Witterungsbedingte Verhaltensänderungen der Erdkröte (Bufo bufo L.) während des Laichzuges (Frühjahr 1984).

RITSCHEL-KANDEL GABRIELE, KORNELIA MARZINI UND SIGRUN HAPPEL: Die Bedeutung des Ackerrandstreifenprogrammes für den Artenschutz seltener Ackerunkräuter in Unterfranken.

Broschüren DM 3.-

Heft 1: Lebensräume in Unterfranken - Der Getreideacker.

Heft 2: Hilfsprogramm für Spinnen und Insekten – Ungedüngte Altgrasstreifen.

Heft 3: Die Ökologische Station der Universität Würzburg

in Fabrikschleichach.

Bestellungen an:

Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg

Dr. G. Ritschel-Kandel,

Albrecht-Dürer-Str. 138, Tel. 0931/400962,

0931/380504

404 409 440 442 444 446 448
105 to 7 to 100 10 111 112 113 115 15 17 17 10 19 127 138 171 142 118 115 128 119 132 122 138 171 142 118 115 128 119 132 122 150 40 - 75 20 70 60 25 70 80 30 70 50 85 - 55 60 85 30 80 15 65 70 40 30 70 45 70 30 80 55 - 55 60 58 80 15 65 75 40 53 07 70 45 70 30 80 75 56 70 80 30 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
2 3 . 4 2 2 4 4 2 5 3 3 3 4 1 1 1 3 3 4 2 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4 4 4 4 1 1 1 1

RANDIEDU MENADA TCOMUS COLL. ARIEMONE RANUNCULOIDES GEUM URBANUM VIOLA MIRABILIS LATHYRUS VERNUS VIOLA MIRABILIS LATHYRUS VERNUS CAMPANULA TRACHELIUM PRIMULA ELATIOR PRIMULA ELATIOR HERACLEUM SPHONDYLIUM GLECHOMA HEDERACEA GALIUM APARIME LAMIUM G.GALEOBOLON LAMIUM G.GALEOBOLON LAMIUM G.GALEOBOLON LAMIUM G.GALEOBOLON PUBLIS CARESIUS CARES SYLVATICA SENECIO FUCHSII GERANIUM ROBERTIANUM PULMONARIA OBSCURIS PARTIS QUADRIFOLIA PRATIS QUADRIFOLIA PRATIS QUADRIFOLIA PRATIS QUADRIFOLIA PRATIS QUADRIFOLIA HELANDRIUM DIOICUM BROWUS BENEKENII LAMIUM G.MONTANUM MELICA UNIFLORA	2-22-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2	1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2222	2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12.22.11.11.24214	2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 + 2 + 2 + 2 + 1 1 1 + 7 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 2	21	* 2	1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1	2	1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	221	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2121++11++2222-11+++2222-11+++	222222222222222222222222222222222222222	v v 2 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2124 + 11 1 2 1 1 1 2 2 2	222111 * 1	1	1 2 2221 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	222 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 + 1	1	· 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 1 2 2	2 2	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2	2 2 1 + + 2 2 1 1 1 - 1 1 2	2 2 + 1 - 2 - 1 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	211	2 1 1 1	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARUM MACULATUM SCILLA BIFOLIA GAGEA LUTEA ALLIARIA PETIOLATA LAMIUM MACULATUM ARCTIUM NEMOROSUM MUSCARI BOTRYOIDES ALLIUM CIERACEUM ALLIUM URSINUM CORYDALIS CAVA CORYDALIS CAVA CORYDALIS SOLIDA STACHYS SYLVATICA ELYMUS CANINUS - TANGERE CITCHEAS STACHYS SYLVATICA ELYMUS CANINUS - TANGERE CITCHEAS UTETIANA RAMUNICULUS LANUGINIOSUS COLCHICUM OFFICINALE ACONITUM VULPARIA ACONITUM VULPARIA FILIPENDULA ULMARIA CAREX ACUTTIFIAN SCREPIS PALUDOSA LYSIMACHIA VULGARIS ANGELICA SYLVESTRIS CORYDALIS INTERMEDIA GAGEA MINIMA OMPHALODES SCORPIOIDES SERRATULA TINCTORIA CALAMAGROSTIS ARUNDINACEA ROSA GALLICIA SRUNDINACEA STACHYS OFFICINALIS INULA SALICINA HEBACIUM SABAUDUM HIERACIUM STANALIS INULA SALICINA HIERACIUM SABAUDUM HIERACIUM STANALIS INULA SALICINA HIERACIUM SABAUDUM HIERACIUM SORDINACEA STACHYS OFFICINALIS INULA VERISE POLYTRICHUM FORMOSUM LATHYNEL SINIFOLIUS DESCHAMPSIA FLEXUOSA	3 4 5 5 3	1 . 2	1 5 3 4	2 4 2	4 4 2 2 2 2	1 1 1 2 2	5 5 4 2 1 2	3 5 2	2 2 .	11 1 1	1 121 + 2 +	+ 1	* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 + 4	1 2 + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2	+ 1 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 1 2 1	1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1	1 +	2 2	22	2		1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .	22	2 2	V 1 + + V	1	222	1						1	± 5	* + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DICTAMNUS ALBUS CAMPANULA PERSICIFOLIA BRACHYPODIUM PINNATUM VIOLA HIRTA PERSICIFOLIA VIOLA HIRTA HIRUNDINARIA VIOLA HIRTA HIRUNDINARIA CALAMINTHA CLINOPODIUM SEDUM TELEPHIUM ARTEN DER FAGETALIA UND QUEI ANEMONE NEMOROSA POLYGONATUM MULTIFLORUM POA NEMORALIS BRACHYPODIUM SYLVATICUM EURHYNCHIUM STRIATUM HILLA REICHEMBACHIANA CARDAMINE P. NEMOROSA PLAGIOMNIUM UNDULATUM SCROPHULARIA NODOSA EURHYNCHIUM SWARTZII CAREX DIGITATA AQUILEGIA VULGARIS LUZULA PILIOSA NEPATICA MOBILIS NEMOROSA LERINOPERIORE NEMOROSA PLAGIOMNIUM UNDULATUM CARREX DIGITATA AQUILEGIA VULGARIS LUZULA PILOSA NEPATICA MOBILIS NEMOROSCHATELLINA	RCO-FAGETEA: 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 3 1 1 1 + + + + + + + + + + + + + + +	2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 1 1 1 1 1 + + - 1 1 + - 1 1 1 1 1 1 1 1	2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22 * * * 12 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2 4 1 2 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 1 2 4 4 4 4	2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 + 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2	22 11	1 21 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1	2 2 2 4 1	2 2 2 2 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 + 1	22211 + + + + + + + + + + + + + + + + +	222211 + + + 1 1 1 1 + + 1 1 1 + + 1 1 1 + + 1 1 1 + + 1 1 1 + + 1 1 1 + + 1 1 1 + + 1 1 1 + + 1 1 1 1 + + 1	i :	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4	i :	Y 2 2 1 1 1 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	2 2 Y 1 1 1 7 + 1 + 1 + 2 1 1 1 2 2 + + + + + + + + +	v v 21 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 1 + + 2 2 1 1 + + 2 1 1 1 1 1 1 1	22 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2	2 v + 1 1 1 3 2 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 Y 2 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	* F	2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2	2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 3 3 3 1 1 1 2 3 3 3 3	2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	+ 2 V + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	2 2 2 2 1 1 + + + + + + + + + + + + + +	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Y V 2 1 1 2 1 1 1 2	2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2	22 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1	v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 2 2 2	22+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
HOLCUS MOLLIS HIERACIUM LAEVIGATUM CYPRIPEDIUM LAEVIGATUM CYPRIPEDIUM LAEVIGATUM SONSTIGE ARTEN: MELICA NUTANS DESCHAMPSIA CESPITOSA GALEOPSIS TETRAHIT FRAGARIA VESCA AJUGA REPTANS HIERACIUM HIRSTUM HIPACHUM HI	LUM BULBOSUM:		: : : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: : :	: :	: : :	: :	: :	: : :	: :	: : :		: : :	: :	: : :	: :	: : :	: : :	: : :	: :	: : :	: :	: : :	: : :	: : :	÷ : :	: : :	: :	: : :	: : :	: : :	: :	* : :	: : :	: : :	: :	: : :	: : : :	: :
ANTHRISCUS SYLVESTRIS LITHOSPERMUM OFFICINALE URTICA DIOICA JE EINMAL IN 26: CHAEROPHYL GALIUM PALUSTRE:+; IN 59: L AS:+; IN 74: EQUISETUM AFVE	LUM BULBOSUM:;; 1	IN 29: MENT	HA AQUATICA	:+; IN 30:	: IMPATIEN	PARVIFLOR	A:+; IN	32: ATHY	RIUM FIL	LIX-FEMIN	. 1 	: :	: : :		: : :	: :	: : :	: :		i :		: : :		: :	: :			: : :		: : :	: : ;	: :											:

JE EINMAL IN JEC CHAEMOPHYLLUM BULBOSHIT; IN 27: HEN HA AQUALICA** IN 30: IMPAILED PARTICULARS* IN 39: ADTRIBUTE PARTICULARS* IN 39: ADTRIBUTE PARTICULARS* IN 39: ADTRIBUTE PARTICULARS* IN 37: EQUISETUM ARVENSET; IN 37: EQUISETUM ARVENSET; IN 37: EQUISETUM ARVENSET; IN 37: EQUISETUM ARVENSET; IN 38: CHEPTS ARVENSET; IN 39: RACHATIS RECTA:*/IN 84: CREPTS M. SUCCISIFICATE VICIA CREACH PARTICULAR PARTICULAR

WALDGESELLSCHAFTEN IM SCHWEINFURTER-BECKEN (SOMMER 1986) TABELLE 2: GALIO-CARPINETUM TYPICUM AUFNAHMEN 1-3: DESCHAMPSIA CESPITOSA-VARIANTE, TRENNARTENFREIE AUSBILDUNG	WALDGESELLSCHAFTEN IM SCHWEINFURTER-BECKEN (SOMMER 1986) TABELLE 3: WALDGESELLSCHAFTEN MITTLERER BIS ARMER STANDORTE: AUFNAHMEN 1-5: GALIO-CARPINETUM POTENTILLETOSUM ALBAE AUFNAHMEN 6-48: " LUZULETOSUM LUZULOIDIS , TRENNARTENFREIE AUSBILDUNG (NACH RECHTS FRISCHEZEIGER ABNEHMEND) AUFNAHME 49: " " PTERIDIUM AQUILINUM " " PTERIDIUM AQUILINUM " AUFNAHME 49: " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
AUFNAHMEN 4-6: " " , ASARUM EUROPAEUM- " AUFNAHMEN 7-8: TRENNARTENFREIE VARIANTE, ASARUM EUROPAEUM- " AUFNAHMEN 10-15: " , TRENNARTENFREIE "	AUFNAHME 50: " " " " " MOLÏNIĀ ĀRUNDĪNĀCĒA- " AUFNAHMEN 51-52: LUZULO-GUERCĒTUM MOLĪNĪĒCOSUM ARUNDĪNĀCĒĀ, VACCĪNĪŪM PYRTĪLĪLŪS- AUSBĪLDUNG AUFNAHME 53: " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
LAUFENDE NUMMER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AUFNAHMENUMMER: 172 176 178 182 179 181 185 187	AUFNAHME 56: " " " CAREX BRIZOIDES- " TRENNARTENFREIE TRENDARTENFREIE TRENDARTEN
DECKUNG BI (%): 60 90 70 50 60 65 75 75 75 30 60 75 60 80 60 DECKUNG BII (%): 40 30 70 60 60 50 30 30 20 70 70 50 5 - 30 DECKUNG S (%): 10 5 10 10 5 10 30 1 5 10 10 - 50 - 25 DECKUNG K (%): 60 65 55 60 40 40 65 45 75 30 35 25 80 75 60	AUFNAHME 64: " " " , DICTAMMUS ALBUS- " AUFNAHME 65: " " , PEUCEDANUM OREOSELINUM- " AUFNAHME 66: TRENNARTENFREIER KIEFERNFORST , PEUCEDANUM OREOSELINUM- " AUFNAHME 67: " " , RUBUS IDAEUS- " AUFNAHME 68: " " , TRENNARTENFREIE "
SCHLUSSGRAD: 85 90 90 85 90 90 90 85 95 75 80 75 GEOLOGIE: S F/GS F/TF/TS S F/TF/GS S F F NEIGUNG (GRAD): - 2 - 2 - 1 3 - 1 1 3 2 - 2 3 EXPOSITION: - SW - N - NE NW - E E SE SW - SW E BODENART (OBERBODEN): US US SU UL SU SU SU SU SU US SU US SU SU	LAUFENDE NUMMER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 21 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 248 247 251 253 247 213 195 200 226 228 238 243 227 213 195 200 226 228 248 247 251 253 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251
HUMUSFORM: MO	DECKUNG K (%): 75 85 80 77 65 93 04 53 55 50 75 33 30 55 25 40 60 55 40 25 35 30 55 50 60 05 50 50 25 13 30 55 50 60 40 80 85 70 50 60 40 80 85 70 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 85 80 77 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
BAUMARTEN: QUERCUS ROBUR BI 4 4 4 3 3 3 5 2 2 3 3 4 3 5 4 V	BÖDÉNÁRT TÓBERBODEN): ÜS ŠU ÜË LS ŠU ŠU ÜË LS ŠU
BII . 1 2 1 2 1 . 1 III	BAUMARTEN: QUERCUS ROBUR BI
BII 3 . 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 IV	QUERCUS ROBUR BI 3 2 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4
TILIA CORDATA BI	TILIA CORDATA BII 2:2:2 4 2 2 4 2 3 2 4 2 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 : 3 3 3 2 1 3 1 1 3 4 1 2 2 2 2 3 1 3 2 : : : : : : : : : : : : : : : : : :
FRAXINUS EXCELSIOR K r . + + r 1 + 1	TILIA CORDATA
PRUNUS AVIUM K r r + + III QUERCUS PETRAEA BI	FRAXINUS EXCELSION BII
ACER CAMPESTRE BII	SORBUS TORMINALIS BII + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POPULUS TREMULA K + +	BETULA PENDULA BIT
BETULA PENDULA BII	PRUNUS SEROTINA S +
SORBUS AUCUPARIA K	BETULA PUBESCENS
STRAUCHARTEN:	PINUS SYLVESTRIS 81
CORYLUS AVELLANA S 1 1 1 + 2 2 3 . 3 . 2 III	ACER CAMPESTRE FRUNUS AVIUM
CRATAEGUS SPEC. S 2 + I SAMBUCUS NIGRA K	PRUNUS S S S S S S S S S S S S S S S S S S
FRANGULA ALNUS S	PYRUS PYRASTER S +
EUONYMUS EUROPAEUS K +	
KRAUTIGE ARTEN:	FRANGULA ALNUS S + 2 1
TRENNARTEN DES GALIO-CARPINETUM:	CRATAEGUS SPEC.
CONVALLARIA MAJALIS 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 V FESTUCA HETEROPHYLLA 1 2 . + + . 1 II CAREX MONTANA . + + . 1 r . +	SAMBUCUS NIGRA S
KENNARTEN DES CARPINION:	KRAUTIGE ARTEN: TRENNARTEN DES GALIO-CARPINETUM:
STELLARIA HOLOSTEA 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 4 V DACTYLIS POLYGAMA 2 2 1 1 1 1 1 r + 1 + 1 1 1 2 2 V GALIUM SYLVATICUM 1 + r + + r + . 1 III CAREX UMBROSA . r +	CONVALLARIA MAJALIS FESTUCA HETEROPHYLLA 1 2 2 1 1 7 + 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 4 1 4 1 2 3 3 1 4 4 4 4 4 4 5 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 5 1 4 1 4
TRENNARTEN DER LOKALEN RASSE DES CARPINION:	STELLARIA HOLOSTEA 2 2 2 2 2 3 2 2 1 + 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 . 2 2 1 1 + 2 2 2 2 2 2 1 3 1 . 2 2 2 1 1 2 2 + + 2 2 2 + 3 2 1 1 DACTYLIS POLYGAMA . 1 + + 1 2 1 1 + 1 2 1 2 1 7 1 . 1 1 1 1 7 + . 1 2 + 1 1 2 + 1 1 7 7 2 + 1 2 + 1 1
MELICA PICTA . 1 + 3 + . r II PHYTEUMA NIGRUM + . r +	TRENNARTEN DER LOKALEN RASSE DES CARPINION:
TRENNARTEN DER AUSBILDUNGEN:	MELICA PICTA + 3 1
DESCHAMPSIA CESPITOSA 2 2 1 2 1 1	ARTEN DER FAGETALIA UND QUERCO-FAGETEA: POA NEMORALIS 1 3 2 1 1 . + + 1 + 1 1 1 + 1 + 1 1 1 + 1 + 1
ASARUM EUROPAEUM + 1 +	CARDAMINE P.NEMOROSA 1 1 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
KENNARTEN DER FAGETALIA UND QUERCO-FAGETEA:	BRACHTY-UD LUM STLVATILOUM ASARUM EUROPAEUM ASARUM STLVATILOUM ASARUM STLVATILOUM ASARUM FUROPAEUM F
	TOENN ADTEN NED ANCENTI NIMCEN .

```
TABELLE oldsymbol{\mathcal{J}}: WALDGESELLSCHAFTEN MITTLERER BIS ARMER STANDORTE:
 TABELLE 2: GALIO-CARPINETUM TYPICUM
                                                                                                                                                                                                                                                                        TRENNARTENFREIE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AUSBILDUNG (NACH RECHTS FRISCHEZEIGER ABNEHMEND)
                                      1-3: DESCHAMPSIA CESPITOSA-VARIANTE, TRENNARTENFREIE
4-6: " , ASARUM EUROPAEUM-
7-8: TRENNARTENFREIE VARIANTE, ASARUM EUROPAEUM-
 ALIENAHMEN
                                                                                                                                                                                                                               AUSBILDUNG
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4-6: "
7-8: TRENNARTENFREIE
 AUFNAHMEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  LUZULO-QUERCETUM MOLINIETOSUM ARUNDINACEAE,
 AUFNAHMEN
 AUFNAHMEN 10-15:
                                                                                              1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
172 176 178 182 179 181 185 187
173 174 177 183 180 184 186
60 90 70 50 60 65 75 75 75 30 60 75 60 80 60
40 30 70 60 60 50 30 30 20 70 70 50 5 - 30
10 5 10 10 5 10 30 1 5 10 10 - 50 - 25
60 65 55 60 40 40 65 45 75 30 35 25 80 75 60
85 90 90 85 90 90 90 85 90 85 95 75 80 75
S S F/GS F/TF/TS S F/TF/GS S S F F
- 2 - 2 - 2 - 1 3 - 1 1 3 2 - 2 3
- SW - N - NE NW - E E SE SW - SW F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CAREX BRIZOIDES-
TRENNARTENFREIE
 LAUFENDE NUMMER:
 AUFNAHMENUMMER:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TYPICUM
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       RUBUS IDAEUS- AUS
DICTANNUS ALBUS-
PEUCEDANUM OREOSELINUM-
PEUCEDANUM OREOSELINUM-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        AUSBILDUNG
 DECKUNG BI
DECKUNG BII (%):
DECKUNG S (%):
DECKUNG K (%):
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               51 52 53 54 55 56 57 58 59
238 243 240 241 242 25
237 239 244 242 245
237 60 65 75 50 70 70 70
80 75 75 25 30 5 45 - 40
5 20 5 10 10 5 5 1 5
85 70 70 80 65 95 65 85 80
80 75 75 75 75 75 80 70 75
F Q S Q S F S S
1 1 - - - SW S S
1 1 - - - SW S US US
SU SUS US SUS US US
R R H M D R R H R H M M M M O MO
12 20 20 10 6 21 23 19 12 9
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    61 62 63 64 65 66 67 68
248 27 257 252 254
35 50 30 - 70 60 35 20 15
15 30 80 50 20 10 50 15
10 55 30 10 5 5 6
35 50 30 75 70 60 60 60
55 70 80 75 70 60 60 60
55 70 80 75 70 60 80 80
55 75 80 80 80 80 80
55 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 80
80 80 80 80 
 SCHLUSSGRAD:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1 2 3 4 5
191 193 190
- 192 194 -
- 70 75 60 60 80
1 20 - 5 1
75 85 80 70 65
70 80 80 75 75
 GEOLOGIE:
                                                                                                                                                                                                                                                                         DECKUNG BI (%):
DECKUNG BI (%):
DECKUNG S (%):
DECKUNG S (%):
SCHLUSSGRAD (%):
GEOLOGIE:
NE IGUNG (GRAD):
EXPOSITION:
BODENART (OBERBODEN):
HUMUSFORM:
ARTENZAHL:
NEIGUNG (GRAD):
EXPOSITION:
                                                                                                  BODENART (OBERBODEN):
 HUMUSFORM:
 ARTENZAHL:
 BAUMARTEN:
 QUERCUS ROBUR
                                                                                                                                                                                                              4
2
+
                                                                      BI
BII
                                                                                                                               3 3 3 5 2 2
                                                                                                                                                                                                                                  5
                                                                                                                                                                                                                                                                           BAUMARTEN:
                                                                                                                                                                                                                                                     ĬΙ
                                                                     K
BI
BII
                                                                                                                                                                                                                                                                           QUERCUS ROBUR
 CARPINUS BETULUS
                                                                                                                                                            1 3
                                                                                                                                                                                4
                                                                                                                                                                                          4 3
                                                                                                                                                                                                                                                                           CARPINUS BETULUS
                                                                      K
B I
 TILIA CORDATA

      6
      7
      1
      1
      7
      1
      7
      1
      7
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1
      1

                                                                     BII
                                                                                                                                                                                                                                                                         TILIA CORDATA
                                                                                                                                                                                                                                                      III
II
II
 FRAXINUS EXCELSIOR
                                                                                                                                                                                                                                                                         QUERCUS PETRAEA
ACER PSEUDOPLATANUS
PRUNUS AVIUM
                                                                                                                                                                                                                                                                           FRAXINUS EXCELSIOR
                                                                                                                                                                                                               . ż
 QUERCUS PETRAEA
                                                                                                                                                                                                                                                                           SORBUS TORMINALIS
 ACER CAMPESTRE
                                                                                                                                                                                                                                                                           SORBUS AUCUPARIA
 POPULUS TREMULA
 ACER PLATANOIDES
                                                                                                                                                                                                                                                                         BETULA PENDULA
 PRUNUS PADUS
 BETULA PENDULA
SORBUS AUCUPARIA
                                                                                                                                                                                                                                                                         PRUNUS SEROTINA
                                                                                                                                                                                                                                                                           RETULA PURESCENS
 PRUNUS SEROTINA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ::::::
 SORBUS TORMINALIS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 3 4 3
                                                                                                                                                                                                                                                                         PINUS SYLVESTRIS
 STRAUCHARTEN:
                                                                                                                                                                                                                                                                         POPULUS TREMULA
                                                                                                                                                                                                                                                                         ACER CAMPESTRE
PRUNUS AVIUM
PRUNUS PADUS
 CORYLUS AVELLANA
 CRATAEGUS SPEC.
                                                                                                                                                                                                                                                                        ACER PLATANOIDES
ACER PSEUDOPLATANUS
PYRUS PYRASTER
 SAMBUCUS NIGRA
                                                                                                                                                                                                                                             żi
 FRANGULA ALNUS
                                                                                                                                                                                                                                                                         MALUS SYLVESTRIS
 EUONYMUS EUROPAEUS
ROSA SPEC.
PRUNUS SPINOSA
                                                                                                                                                                                                                                                                        STRAUCHARTEN:
                                                                                                                                                                                                                                                                         FRANGULA ALNUS
                                                                                                                                                                                                                                                                         CORYLUS AVELLANA
 KRAUTIGE ARTEN:
                                                                                                                                                                                                                                                                         CRATAEGUS SPEC.
TRENNARTEN DES GALIO-CARPINETUM:
                                                                                                                                                                                                                                                                         PRUNUS SPINOSA
SAMBUCUS NIGRA
CONVALLARIA MAJALIS
FESTUCA HETEROPHYLLA
CAREX MONTANA
                                                                                                                                                                                                                                                                         EUONYMUS EUROPAEUS
ROSA ARVENSIS
                                                                                                                                                                                                                                                                           KRAUTIGE ARTEN:
 KENNARTEN DES CARPINION:
                                                                                                                                                                                                                                                                           TRENNARTEN DES GALIO-CARPINETUM:
STELLARIA HOLOSTEA
DACTYLIS POLYGAMA
GALIUM SYLVATICUM
                                                                                                                                                                      2 3 1 2 2 3 + 1 + 1 1 1
                                                                                                                                                                                                                                                                         CONVALLARIA MAJALIS
FESTUCA HETEROPHYLLA
CAREX MONTANA
CHRYSANTHEMUM CORYMBOSUM
LATHYRUS NIGER
                                                                                                                                                                                                                                2 4 V
2 2 V
                                                                                                                                                                     . . r + . 1 . . iII
 CAREX UMBROSA
 VINCA MINOR
                                                                                                                                                                                                                                                                           KENNARTEN DES CARPINION
                                                                                                                                                                                                                                                                           STELLARIA HOLOSTEA
DACTYLIS POLYGAMA
GALIUM SYLVATICUM
 TRENNARTEN DER LOKALEN RASSE DES CARPINION:
 MELICA PICTA
                                                                                                                                                                                                                                                                           TRENNARTEN DER LOKALEN RASSE DES CARPINION:
 PHYTEUMA NIGRUM
                                                                                                                                                                                                                                                                           MELICA PICTA
PHYTEUMA NIGRUM
 TRENNARTEN DER AUSBILDUNGEN:
                                                                                                                                                                                                                                                                           ARTEN DER FAGETALIA UND QUERCO-FAGETEA:
 DESCHAMPSIA CESPITOSA
                                                                                                                                                                                                                                                                        POA NEMORALIS
ANEMONE NEMOROSA
MILIUM EFFUSUM
POLYGOMATUM MULTIFLORUM
EURHYNCHIUM STRIATUM
CARDAMINE P. NEMOROSA
FICARIA VERNA
VIOLA REICHENBACHIANA
SCROPHULARIA NODOSA
BRACHYPODIUM STLVATICUM
ASARUM EUROPAEUM
LATHYRUS VERNUS
PULMONARIA OBSCURA
CARDAMINE P.NEMOROSA
PLAGIOMNIUM UNDULATUM
 THUIDIUM TAMARISCINUM
  ASARUM EUROPAEUM
 LATHYRUS VERNUS
LILIUM MARTAGON
 KENNARTEN DER FAGETALIA UND QUERCO-FAGETEA:
```

WALDGESELLSCHAFTEN IM SCHWEINFURTER-BECKEN (SOMMER 1986)

WALDGESELLSCHAFTEN IM SCHWEINFURTER-BECKEN (SOMMER 1986)

ANEMUNE NEMURUSA	y 5 T y 1 Z y y 2 T Z V V V	INCHE ARTER DE	A ACODIEDONGENI														
POA NEMORALIS MILIUM EFFUSUM POLYGONATUM MULTIFLORUM VIOLA REICHENBACHIANA BRACHYPODIUM SYLVATICUM	1 2 . 2 1 + 1 1 1 . 1 . 3 3 2 IV 1 2 . 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 IV 1 . r 1 . 2 1 1 1 1 . 1 1 IV + + 1 1 + + r . + 1 III	MOLINIA ARUNDINACEA VACCINIUM MYRTILLUS SPHAGNUM PALUSTRE CAREX BRIZOIDES POLYTRICHUM COMMUNE AGROSTIS CANINA	2 . 2 . 1							1			2 3 4 5 5 5 + 3	4 4 3 3 4	4 .	3	
EURHYNCHIUM STRIATUM PRIMULA ELATIOR LUZULA LUZULOIDES FICARIA VERNA		LYSIMACHIA VULGARIS CALAMAGROSTIS CANESCENS GALIUM PALUSTRE JUNCUS CONGLOMERATUS PTERIDIUM AQUILINUM															
CAREX SYLVATICA SCROPHULARIA NODOSA CAMPANULA TRACHELIUM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SERRATULA TINCTORIA STACHYS OFFICINALIS POTENTILLA ALBA	1 1 1 2 1 + 1 1 2 1	+ · r · + ·	† : : :			: : : : :	: : : : :	:::::		: : : : :	2		: :		: : :
SONSTIGE ARTEN:		BRACHYPODIUM PINNATUM ROSA GALLICA PEUCEDANUM OFFICINALE	1 1	# 1 : : : :													
GALEOPSIS TETRAHIT MELICA NUTANS MOEHRINGIA TRINERVIA POLYGONUM DUMETORUM FRAGARIA VESCA CALAMAGROSTIS ARUNDINACEA VIOLA RIVINIANA HIERACIUM SYLVATICUM AJUGA REPTANS ARRHENATHERUM ELATIUS		GENISTA TINCTORIA POTENTILLA ERECTA SUCCISA PRATENSIS PEUCEDANUM CERVARIA CALAMINTHA CLINOPODIUM VICIA CASSUBICA EUPHORBIA CYPARISSIAS GENISTA SERMANICA GALIUM BOREALE DIANTHUS SUPERBUS ACHILLEA PTARMICA VIOLA HIRTA LATHYRUS SYLVESTRIS SEDUM TELEPHIUM	2 · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	* 1													
AEGOPODIUM PODAGRARIA VICIA SEPIUM		DICTAMNUS ALBUS PEUCEDANUM OREOSELINUM JASIONE MONTANA	:::::													2 .	2
GEUM URBANUM SENECIO FUCHSII MAIANTHEMUM BIFOLIUM		SILENE NUTANS RUBUS IDAEUS MOEHRINGIA TRINERVIA															1
MOLINIA ARUNDINACEA DRYOPTERIS CARTHUSIANA CAREX DIGITATA POLYTRICHUM FORMOSUM	1 +	POLYGONUM DUMETORUM RUBUS FRUTICOSUS COLL. ARTEN BODENSAURER STANDORTE:							г .							2	
IN 2: LATHYRUS LINIFOLIUS:1; LUZULA PILOSA:+; IN 7: ASTRA HIERACIUM LACHENALII:r; IN 10 NIUM ROBERTIANUM:r, SOLIDAGO PARISSIAS:1, LAPSANA COMUNIS	. + . 1	DESCHAMPSIA FLEXUOSA LUZULA LUZULOIDES POLYTRICHUM FORMOSUM MELAMPYRUM PRATEMSE HIERACIUM SABAUDUM - PLEUROZIUM SCHREBERI HIERACIUM SYLVATICUM LUZULA PILOSA HIERACIUM LACHENALII AGROSTIS TENUIS FESTUCA OYINA SCLEROPODIUM PURUM VERONICA OFFICINALIS HOLCUS MOLLIS LATHYRUS LINIFOLIUS DICRANUM POLYSETUM HIERACIUM LAVIGATUM LEUCOBRYUM GLAUCUM DICRANUM SCOPARIUM RUMEX ACETOSELLA HIERACIUM PILOSELLA VIOLA CAMINA ANTHONANTUM OODRATUM HYLOCOMIUM SPLENDENS LUZULA MULTIFLORA HIERACIUM UMBELLATUM CAREX DETINEA SONSTIGE ARTEN:	2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	+ + + 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1	2 + 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1		2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1	22112112122	4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21 2211	2 2 2 2 1 1 2 2 2	+ + 2	2 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 . 4
		GALEOPSIS TETRAHIT MELICA NUTANS AJUGA REPTANS DRYOPTERIS CARTHUSIANA VIOLA RIVINIANA FRAGARIA VESCA CAMPANULA PERSICIFOLIA DESCHAMPSIA CESPITOSA CALAMAGROSTIS EPIGEJOS ARRHENATHERUM ELATIUS EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM VERONICA CHAMAEDRYS MYCELIS MURALIS ATRICHUM UNDULATUM PLAGIOMNIUM AFFINE THUIDIUM TAMARISCINUM RHYTIDIADELPHUS TRIQUETRUS MAIANTHENUM BIFOLIUM TARAXACUM OFFICINALE COLL. HYPERICUM PERFORATUM VICIA SEPIUM GALIUM APARINE SENECIO SYLVATICUS PLATANTHERA BIFOLIA IMPATIENS PARVIFLORA GERANIUM ROBERTIANUM HYPERICUM IRSUTUM HYPERICUM INTRUITUS CHAMPATENS SENECIO SYLVATICUS PLATANTHERA BIFOLIA IMPATIENS PARVIFLORA GERANIUM ROBERTIANUM HYPERICUM INTRUITUM MYOSOTIS STLVATICA CALLUMA VULGARIS URTICA DIOIGA SANGUISORBA OFFICINALIS		+ + + + F + F + F + F + F + F + F + F +			1 1							1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2	
		JE EINMAL IN 2: VALERIANA OFFICI BRACHYTECIUM RUTABULUM:1; IN 11: ZII:+, RANUNCULUS AURICOMUS COLL NUS CATHARTICUS S:+; IN 25: AEGO	NALIS COLL:1, ROSA SI LONICERA XYLOSTEUM: :r; IN 13: ELYMUS CAI PODIUM PODAGRARIA:+;	I, CORNUS SANGUINE INUS: PIMPINELLA	ENIDIUM MOLLUSC A:+, HERACLEUM GRANDIFLORA:r; SAXIFRAGA:r, CA	UM:r; IN 9: ALN SPHONDYLIUM:r; IN 22: HYPERIC MPANULA ROTUNDI	US GLUTINOSA BI IN 12: EURHYNCH UM MONTANUM:r; FOLIA:r;	II:1;IN 10: HIUM SWART- IN 24: RHAM-	IN 29: DICRAN 37: MELICA UN LIX CINEREA B CUM:+; IN 64:	NELLA HETEROMA NIFLORA:1; IN BII:1; IN 56: : POLYGONUM BI	41: PICEA ABI SENECIO FUCHS STORTA:1, VER	HEDERA HELIX K ES S:+; IN 42: I II:1; IN 57: RII BASCUM NIGRUM:+	II, MERCURIALIS AMIUM MACULATUN BES RUBRUM S:r; IN 66: ROBINIA	PEKENNIS:+; IN ir; IN 49: LAM IN 63: HUMULUS PSEUDACACIA S	IUM G. GALE LUPULUS K: :+ IN 67: D	OBDOLON:+; IN +, MELANDRIUM PRYOPTERIS FILI	53: SA- DIOI- IX-MAS:+

TABELLE 4 : QUERCO-ULMETUM

TABELLE 4 : QUERCO-ULMETU	JM																					
AUFNAHMEN 1-16: TRENNART AUFNAHMEN 17-20: STELLARI			- A	AUS	BIL	.DUN	IG															
LAUFENDE NUMMER: AUFNAHMENUMMER: DECKUNG BI (%): DECKUNG BII (%): DECKUNG K (%): SCHLUSSGRAD (%): GEOLOGIE: NEIGUNG (GRAD): EXPOSITION: BODENART (OBERBODEN): HUMUSFORM: ARTENZAHL:	A HOL	1 1 80 15 30 85 A 1 W	2275 10560 845 WU MU	A -	20 75 80 A - Lu	80 A 1 NW	A 2 S Ut	7 10 80 5 70 8 1 W SU 17	10 5 80 80 A Ut	85 A 1 W Ut	A 1 N Ut	50 85 80 A	A -	A 5 SE Ls	80 A 1 S Ut	15 18 70 55 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	- 60 40	5 75 85 A 2 N Ut	15 70 75 A 1 S Ut MU	A - Ut	20 20 70 30 2 75 85 A2 NUMU 34	
BAUMARTEN:																						
FRAXINUS EXCELSIOR	ВІ	3	4	3	3	4	2	4	2	5	2	4	4		4	3	3	1	3	3	2	
QUERCUS ROBUR PRUNUS PADUS	BII S K BI K BII S	2 3 + 1 2	: 4 + 1 +	: 2 1		2 3	2 2 4	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: 2 1	21+12 221	÷ 3 1 3 ·	· 2 1 3	2+41	1 : 2 : 2	÷ 4 1 3 .	· ÷ 3 · 2 1	: 1 2	2	13122	22+ :4+ :1	
ALNUS GLUTINOSA	BI			3 1		+			3	2	2		+	+	+		2	+		+	• .	
ULMUS LAEVIS	BII BI			1 2 3			ż	0		0					0					1		
ACER CAMPESTRE	BII	1	+	3			ż				1				2		a a		2	i	2	
POPULUS SPEC. CARPINUS BETULUS PRUNUS AVIUM ULMUS MINOR ACER PSEUDOPLATANUS ULMUS GLABRA TILIA CORDATA	S K BI BII S BII K K BII	2		2 2					3													
STRAUCHARTEN:																						
SAMBUCUS NIGRA	S	1	.1	3	1	1	2			1	1	2	1			2		2	2	+		
CORYLUS AVELLANA EUONYMUS EUROPAEUS CORNUS SANGUINEA	K S K S	2		: 1	1 2 + 1	: 1	i :	ż :	:	:	2 1		1	1	2	÷ i	r	1 .		1 1 1	3	
CRATAEGUS SPEC.	K S	ż							0	+	+	+			:		:	i	+	2	+	
HUMULUS LUPULUS RHAMNUS CATHARTICUS PRUNUS SPINOSA ROSA SPEC.	KSKSKSSSK		. ,	:	:	:		:	2	:	:	2	:	:	:		:	2	:	1		
KRAUTIGE ARTEN:																						
TRENNARTEN DER STELLARIA	HOLOS	TEA	-AU	SBI	LDU	NG:																
STELLARIA HOLOSTEA HEDERA HELIX ANEMONE NEMOROSA			:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2	2	1 1 1	1 2	
ALNO-ULMION-ARTEN:																						
STACHYS SYLVATICA GAGEA LUTEA FESTUCA GIGANTEA EURHYNCHIUM SWARTZII CIRCAEA LUTETIANA IMPATIENS NOLI-TANGERE		1 2	2	12+	+	12+2	3	÷ r · · · · ·	21	1	1	2	2	÷ : :		÷	2 : 1 :	2	1 2	2	1	
FAGETALIA- UND QUERCO-FA	GETEA-	ART	EN:																			
CORYDALIS CAVA SCILLA BIFOLIA ADOXA MOSCHATELLINA CORYDALIS SOLIDA LAMIUM G. MONTANUM FICARIA VERNA ARUM MACULATUM PULMONARIA OBSCURA ANEMONE RANUNCULOIDES ALLIUM URSINUM BRACHYPODIUM SYLVATICUM EURHYNCHIUM STRIATUM POA NEMORALIS LILIUM MARTAGON MILIUM EFFUSUM CAMPANULA TRACHELIUM CAREX SYLVATICA FISSIDENS TAXIFOLIUS ASARUM EUROPAEUM PRIMULA ELATIOR POLYGONATUM MULTIFLORUM RANUNCULUS AURICOMUS DACTYLIS POLYGAMA EPIPACTIS HELLEBORINE VIOLA REICHENBACHIANA		32++23111 2	222222+1+3 :1 :2+ · · · · · · · · ·	++22121 :1 :1 :+	21+ · · + + 1 . 41 · · · · + · · · · · · · · · · · · · ·	3 .2221 .11 +	222222 +2	1 +	411 .43111	2+ 3	222222211 3	3222 312+ 1 + . +	3+2222 .21 .+ .+	. 121 .2	2222224 : 21 .3	312222+121 :1	1+ 4+ + . + 4	3221 .211	312232112+11	222222122 1 1	1222 11+3	
LAMIUM MACULATUM GALIUM APARINE		2	2 2 3	2	2	2	3	2	1	2 2 2	3 1 3	2	†	2	2 2 3	3	†	3	3	2 2 3	2 2 3	
AEGOPODIUM PODAGRARIA URTICA DIOICA		2231212	3	222321	2	224221	32312	222+	2 2 3	2	3	2232211	4			3	;	3221	i		3	
VERONICA H.LUCORUM GEUM URBANUM		2	1		1	2	2					2	2	1	ż			1	1+	2 1 2 2		
GERANIUM ROBERTIANUM ELYMUS CANINUS			i	2	1	i				1	+	1	i	2		ż	1	2122+	1	2	+	
GALEOPSIS TETRAHIT GLECHOMA HEDERACEA		r		2		1	+					1	+	+		1	÷	+	2	i	1	
RUBUS CAESIUS VIOLA ODORATA			i	+	1	÷	1					1		+			r	ż		÷	1	
CHAEROPHYLLUM BULBOSUM HERACLEUM SPHONDYLIUM		+	r	+	r	r +			1			+	1	0				222		i		
ALLIARIA PETIOLATA			•	ż		r				•		•		ż				_	•	+		
IN 2: ANTHRISCUS SYLVESTE PHYLLUM TEMULUM:+, CIRSIU	RIS:1; JM OLE	RAC	3: EUM	AN:	THR	ISCI 5:	MO	SYL	VES	TRI	S:1	NER	JSCU	JTA	AN	ROP	AEA	:1,	SYL	AER VES	0- T-	

IN 2: ANTHRISCUS SYLVESTRIS:1; IN 3: ANTHRISCUS SYLVESTRIS:1, CUSCUTA EUROPAEA:1, CHAERO-PHYLLUM TEMULUM:+, CIRSIUM OLÉRACEUM:r; IN 5: MOEHRINGIA TRINERVIA:+, ANTHRISCUS SYLVEST-RIS:+, MELANDRIUM DIOICUM:+; IN 11: FILIPENDULA ULMARIA:r; IN 13: CUSCUTA EUROPAEA:+, CHAEROPHYLUM TEMULUM:1; IN 17: MELANDRIUM DIOICUM:+; IN 18: CHAEROPHYLLUM TEMULUM:+; IN 19: MELICA NUTANS:1; IN 20: MOEHRINGIA TRINERVIA:+, ALLIUM OLERACEUM:+

WALDGESELLSCHAFTEN IM SCHWEINFURTER-BECKEN (SOMMER 1986)

TABELLE 5 : ERLENREICHE WA AUFNAHME 1 : SALICETUM AUFNAHMEN 2-3 : CARICI EL AUFNAHMEN 4-6 : "	CINE	ELL	SCH.		EN		INOS	SAE,	COM TRE CAL	NNA	RTEI	VFRI	EIE	1		BIL	DUNG							
AUFNAHME 7 : " AUFNAHMEN 8-14 : PRUNO-FRA AUFNAHMEN 15-18: " AUFNAHMEN 19-29: "	XINET	UM		н			.11		GRO CAR TRE ALL	SSE EX NNA	GGEI ACU RTEI	NFRI TIFO NFRI	EIE ORM: EIE		AUSI	BIL	UNI	3						
LAUFENDE NUMMER: AUFRAHMENUMMER: DECKUNG BI (%): DECKUNG S (%): DECKUNG S (%): DECKUNG S (%): SCHLUSSGRAD (%): GEOLOGIE: NEIGUNG (GRAD): EXPOSITION: BODEWART (OBERBODEN): HUMUSFORM: ARTENZAHL: BAUMARTEN:		1 21 60 30 70 70 N - Hs MO	2 222 10 75 70 N - Ht MO 13	3 23 75 70 70 N Ht MO 22	4 24 85 1 85 85 N SW 1 Hu 24	5 60 45 1 50 85 K - Lt MU 20	6 70 10 65 75 N - Hu MO 33	7 27 80 1 90 80 N - Hu MU 14	8 28 70 50 10 80 85 K	70 10 90 75 K	85 K - st	11 75 25 95 85 K 1 SE Ut MU 27	12 32 40 60 10 80 80 K 1 E Ut MU 37	13 33 85 2 80 85 K - - Ut MU 25	14 30 70 2 90 85 N 2 Hu 29	15 36 70 5 85 75 A 1 S UMU 30	10 80 80 A	17 38 85 290 85 K - Ut MU 25	18 39 80 30 20 90 85 A 1 NW Ut MU 26	19 35 70 30 5 80 85 K - SNU 25	20 40 70 60 585 K - Ut MU	21 40 30 15 75 90 1 NW UMU 30	22 42 60 15 85 80 1 NW Ut MU 18	M
ALNUS GLUTINOSA	BI	i	:	3	5	3	3	5	43	4	3	4	ż	ż	3	2	ż	ż	3	3	2	:	1 .	2
BETULA PUBESCENS	K BII S	1	:	323	:	:	3	:	:	:	i	i	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
SALIX CINEREA FRAXINUS EXCELSIOR	BII S Bİ	3	2	ż	:	:	÷	:		÷	:	:	•	:	:	•	;	:			· 3	:	:	:
	BII	:	:	1	:	2 1	+		221	2	4	2	3	3	3	2	4	ż	3	1	+	3	3112	1
PRUNUS PADUS	K BII S	:	:	:	:	2	+	i	1	:	ż	ż .	:	ż	2	i i	÷ 2	:	322	3+	ż	÷ 22		42112211
ULMUS LAEVIS	K BI BII	:	:	:		+		:	2	:	*	:	:	:	:		3	:	2	:	+	2 1 2	223+	
SALIX ALBA ACER CAMPESTRE	K BII BII	:		:	:		:	ì	:	:	:	:	:	:	:	:	:	3	:	:	: 1	: 1	:	÷
ACER PLATANOIDES	K K	:	:	1	:	:	:	:	r		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	+	:	÷
ACER PSEUDOPLATANUS QUERCUS ROBUR	BII K BI	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	2	:	:
CARPINUS BETULUS TILIA CORDATA	K BII BII	:	:	+	:	1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		ż	:	i
POPULUS HYBRIDA STRAUCHARTEN:	BI	٠	j.		1,			:	:		:	:	:	:	:	4	:	:	:	:	:	;	:	:
HUMULUS LUPULUS	S	×			2			+	2	2	2	2		+	2					2				
SAMBUCUS NIGRA	S	:		:	:	:	:	÷	i	:	1	:	:	:	:	÷	:	i +	1	:	· 1	:	2	3
CORNUS SANGUINEA CORYLUS AVELLANA	S K S	:	:	:	ŗ	:	:	:	i	2 †	i	:	2	:	:	:	:	:	i	:	ż	i	:	1
VIBURNUM OPULUS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	1	:	+	1	:	:	:	•	+	:	:	
FRANGULA ALNUS RHAMNUS CATHARTICUS RIBES RUBRUM	S	÷	:	:	:	:	1	:	:	1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
CRATAEGUS SPEC. SALIX CAPREA	S	:	:	:	:		:		:	i	:	:	:	:	:	:	÷	:	:	:	÷	:	:	:
KRAUTIGE ARTEN:																								
ARTEN NASSER STANDORTE: CAREX ELATA		1	4	2	1	2	2																	
SOLANUM DULCAMARA PEUCEDANUM PALUSTRE CAREX RIPARIA		2	2	2	1		+ 1	:	:	:	:	:	÷	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
LYTHRUM SALICARIA ACROCLADIUM CUSPIDATUM CAREX ELONGATA		1 2	12+	:	:	:	1	:	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:	:
CAREX ACUTIFORMIS IRIS PSEUDACORUS		;	1	2	3	3	1	ż	3	3	2	2	1	2	2		ì	ì		ì		ì		ì
LYSIMACHIA VULGARIS SCUTELLARIA GALERICULATA		2221	2	i	22	1	1 2	3	i	÷	i	:	÷	:	:	÷	:	:	:	:	:	:	:	:
GALIUM PALUSTRE CALAMAGROSTIS CANESCENS		3	ż	2	•	2			:	•	:	1	:	:	+	:	:	:	:	:	:	:	:	:
CALYSTEGIA SEPIUM SYMPHYTUM OFFICINALE CALTHA PALUSTRIS PHRAGMITES AUSTRALIS		:	:	:	1 + 2 1	1	1 :	1	ż	*	:	2	2	ż	1	:	:	:	:		:	:	:	:
ANGELICA SYLVESTRIS PHALARIS ARUNDINACEA LYCOPUS EUROPAEUS		:	:	:	2	ż	+	:	2	1	r	2	ż	i	1	:	:	:	;	:	:	:	:	:
MENTHA AQUATICA CIRSIUM OLERACEUM		:	:	:	÷		1	3	: 1	3	:	1	i	:	2 1	:	:	:	:	ŗ	:	ì	:	:
EUPATORIUM CANNABINUM SPHAGNUM PALUSTRE		2					1		1			1			1	•								
COMARUM PALUSTRE TRENNARTEN DER ALLIUM URSI	NUM-A		ILD	UNG	DE:	s PI	RUNG	• O-FR	AXIN	ETU	M:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ALLIUM URSINUM ARUM MACULATUM		:	:	:	:	:	:	:	:	:	÷	:	:	:	:	:	r	:	:	++	4	4	5	212
CORYDALIS CAVA ALNO-ULMION-ARTEN:			•	•			•			٠	•	٠		*	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	+	+	2
STACHYS SYLVATICA IMPATIENS NOLI-TANGERE									1	2	2	1	1	2	1	2 2 1	1	1 4	2	2		2	2	3
CIRCAEA LUTETIANA EURHYNCHIUM SWARTZII		:	:	:	i		ŗ	:	2 1 +	3	2231	ż	ż	23222	ż		:	+ 3 +	2223	:	ż	•	:	•
FESTUCA GIGANTEA GAGEA LUTEA RUMEX SANGUINEUS		:	:	:		:	:	:	:	:	Ÿ	Ÿ	Ÿ		:		ż	:	Ÿ	:	:	:	:	1
CAREX REMOTA FAGETALIA- UND QUERCO-FAGE	TEA-A	NRTE	N:	•	•	•	•			•	+		•		•	•	•	•	•	•	٠		٠	•
FICARIA VERNA EURHYNCHIUM STRIATUM		:	:	;	:	:	:	:	ĭ	٧	3	ž	2	¥	¥3	2	3	¥	×33	2	i	123	÷	MININ
LAMIUM G.MONTANUM BRACHYPODIUM SYLVATICUM ANEMONE RANUNCULOIDES		:	:	:	:		i	:	*	:	ŗ	:	i	:	÷	2 1	2	+	3 v	:	2	3	4	1
PARIS QUADRIFOLIA ASARUM EUROPAEUM ANEMONE NEMOROSA		:	:	i	:	:	:	:		÷	:	i	2	:	:	:	:	ż		:	1 2		:	1
PRIMULA ELATIOR POLYGONATUM MULTIFLORUM RANUNCULUS AURICOMUS COLL.		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	2	:	:	:	:	:	:	ŗ			:	1
DACTYLIS POLYGAMA SCROPHULARIA NODOSA PULMONARIA OBSCURA		:	:	į	:		:	:	:	;		:	:	ŗ	:	· 2	i		:	:	•	:	r	
MILIUM EFFUSUM ADOXA MOSCHATELLINA		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		:	:	i	:	:	÷	:	•
CONVALLARIA MAJALIS CAREX SYLVATICA SCILLA BIFOLIA		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	•	:	:	:	i	:	:	:	:	:	:	:
SONSTIGE ARTEN:							•	_				•	•		,					•				
RUBUS CAESIUS URTICA DIOICA GLECHOMA HEDERACEA		:	:	1	2	:	2	3	2	1222	1	2	2	1	4	1	4 2	+242	2 1	2 + 2			ż	. 7 14
AEGOPODIUM PODARARIA LAMIUM MACULATUM GALIUM APARINE		:	:	:	÷	:	:	:	:	2	:		•	1	i :	2232	2 2	1	3 2	22222	2	+	:	AINININIA
FILIPENDULA ULMARIA ELYMUS CANINUS GFUM URRANUM		:	:	:	1		:	:	3		1	2	2	+	2	i	· 2	1	÷	2 + +	:	:	:	;
RANUNCULUS REPENS DESCHAMPSIA CESPITOSA ALLIARIA PETIOLATA		:	:	:	:	:	ŗ		ż	1	ż		:	ż	i	3	:	+	:	1	:		i ;	4
GALEOPSIS TETRAHIT VERONICA H.LUCORUM		:	:		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	2	:	1 2	+	:	:		
MYOSOTON AQUATICUM MELANDRIUM DIOICUM GERANIUM ROBERTIANUM		:	:	r •	:	:	ż	:	:	:	ż	:	:	ŗ	:	:	÷	:	:	÷	:			
CREPIS PALUDOSA AGROSTIS STOLONIFERA DRYOPTERIS CARTHUSIANA		:	ì	:	:	1	:	:	2	:	•	1	ż :	i		:	:	i	:	:	:	:	:	
GALIUM A.MOLLUGO VALERIANA OFFICINALIS COLL HERACLEUM SPHONDYLIUM RUBUS FRUTICOSUS COLL.		:		:	:	+	:	:	+	:	+	•		:	2	:	:	:	:	:	:	:	:	-
STACHYS PALUSTRIS CARDAMINE P.NEMOROSA			:	:	:		ż	:	i	÷	+	:	÷	:	:		:	:	:	:	:	:	:	
MELICA PICTA VIGLA ODORATA AJUGA REPTANS		:	:	:	:	+	:	:	:	:	:		+	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	-
EQUISETUM ARVENSE CHAEROPHYLLUM BULBOSUM		:	:	:	:	•	:	:	;	:	÷	:		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
IN 3. EPILORIUM PALUSTRE:	CHI	ENO	nn i	1 104	POI	VCD	EDM	10 104 - 4	1 5	ONCI	21115	ACE	ED.		TM	4.	CLV	CED	ATA	MAY	TMA	- 1	TA	4D/

IN 3: EPILOBIUM PALUSTREIF, CHENOPODIUM POLYSPERMUM:1, SONCHUS ASPERIF; IN 4: GLYCERIA MAXIMA:1, IMP1
RA:2, AJUGA REPTANS:+; IN 5: EUPHORBIA PALUSTRIS:2, CRSIUM PALUSTREIF, MELICA PICTA:+ IN 6: RUBUS II
PALUSTRIS:2: IN 7: MENTHA ARVENSIS:1; IN 8: EPIPACTIS HELLEBORINEIF, CARDAMINE P.NEMOROSA:1; IN 9: SI
IN 10: EGUISETUM ARVENSE:+; IN 12: SERRATULA TINCTORIA:+, CARRX UMBROSA:+; IN 15: POA TRIVIALIS:F, C.
ROSA:1, MELICA PICTA:+, EGUISETUM ARVENSE:F; IN 26: DIPSACUS PILOSUS:+; IN 25: POA NEMORALIS:F, CHAEL
SUM:+: IN 26: CHAEROPHYLLUM BULBOSUM:-: IN 28: MORRHINGIA TRINERVIA:+; IN 29: AJUGA REPTANS:+

\$ 24 25 26 27 28 29 \$ 44 45 46 47 48 49 \$ 06 70 50 60 85 40 \$ 25 5 10 5 20 \$ 90 90 85 80 90 80 \$ 80 85 80 85 85 85 \$ 4	WALDGESELLSCHAFTEN IM SCHWEINFURTER-BECKEN (SOMMER 1986) STETIGKEITSTABELLE F:	B.) MENIGER ANSPRUCHSVOLLE: BRACHYPODIUM SYLVATICUM
23 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 15: LUZULO-QUERCETUM MOLINIETOSUM - 16:	ATRICHUM UNDULATUM
	ANGELICA SYLVESTRIS PHALARIS ARUNDINACEA II IV	CLEMATIS RECTA
32 + + 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	DACTYLIS POLYGAMA	SONSTIGE ARTEN: ANSRUCHSVOLLE: RUBUS CAESIUS GLECHOMA HEDERACEA I III 4 IV II III 2 III II I I I I I I I I I I
1	A.) ANSRUCHSVOLLE; ASARUM EUROPAEUM FICARIA VERMA RAHUMCULUS AURICOMUS COLL. I III 1 II	DESCHAMPSIA CESPITOSA I III 1 . III 2 II III II I I I

Naturwissenschaftlicher Verein Würzburg

Geschäftsstelle:

D. Uhlich, Crevennastraße 10, 8700 Würzburg

Vorstand:

- 1. Vorsitzender: Prof. Dr. G. Kneitz
- 2. Vorsitzender: Dr. W. Füchtbauer
- 3. Vorsitzender: Dr. W. Trapp

Schriftführer: D. Uhlich

Stellvertretender Schriftführer: Dr. M. Grünsfelder

Kassier: K.-H. Kleinschnitz

Schriftleiter: Dr. G. Ritschel-Kandel

Inhalt

Türk Winfried: Waldgesellschaften im Schweinfurter Becken	1
Malkmus Rudolf: Witterungsbedingte Verhaltensänderungen der Erdkröte (Bufo bufo L.) während des Laichzuges (Frühjahr 1984)	107
Ritschel-Kandel Gabriele, Kornelia Marzini und Sigrun Happel: Die Bedeutung des Ackerrandstreifenprogrammes für den Artenschutz seltener Ackerunkräuter in Unterfranken	117
Vereinsnachrichten über das Jahr 1984	141